

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Племенное дело

Направление подготовки: «ЗООТЕХНИЯ»

Профиль подготовки: "Кормление животных и технология кормов. Диетология"

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Нормативный срок обучения: 4

Форма обучения: очная

СОДЕРЖАНИЕ

1. Конспекты лекции.....	3
1.1 Лекция 1 (Л-1) Понятие о селекции и значение селекции в повышении	
продуктивности животных.....	3
1.2 Лекция 2 (Л-2) Теоретические основы селекционного отбора.....	21
1.3 Лекция 3 (Л-3) Подбор и его использование в племенной работе.....	33
1.4 Лекция 4 (Л-4) Планирование племенной работы на станциях по племенной	
работе и искусственного осеменения.....	42
1.5 Лекция 5 (Л-5) Племенное животноводство России.....	51
1.6 Лекция 6 (Л-6) Использование мирового генофонда для совершенствования	
отечественных пород.....	62
1.7 Лекция 7 (Л-7) Использование мирового генофонда для совершенствования	
отечественных пород.....	79
1.8 Лекция 8 (Л-8) Научные достижения крупномасштабной селекции.....	89
2. Методические указания по проведению Лабораторных занятий.....	102
2.1 Лабораторная работа №ЛР-1 Особенности бонитировки.....	102
2.2 Лабораторная работа №ЛР-2 Особенности бонитировки свиней и овец.....	116
2.3 Лабораторная работа №ЛР- 3 Организация племенной работы в России.....	122
2.4 Лабораторная работа №ЛР-4 Деятельность организаций по племенному	
животноводству. Перспективные планы селекционно-племенной работы.....	127
2.5 Лабораторная работа №ЛР-5 Определение племенной ценности животных.	
Оценка и эффективное использование производителей.....	131
2.6 Лабораторная работа №ЛР-6 Основные формы зоотехнического и племенного	
учета в животноводстве. Система мечения сельскохозяйственных животных.....	137
2.7 Лабораторная работа №ЛР-7 Контроль воспроизводства	
сельскохозяйственных животных.....	148
2.8 Лабораторная работа №ЛР- 8 Сохранение генофонда сельскохозяйственных	
пород и применение иммуногенетики в селекции животных.....	151
2.9 Лабораторная работа №ЛР-9 Апробация селекционных достижений.....	152
2.10 Лабораторная работа №ЛР-10 О проектах отраслевых программ «Развитие	
мясного скотоводства» и «Развитие молочного скотоводства и стимулирование	
производства молока» О проектах отраслевых программ «Развитие свиноводство»,	
«Развитие овцеводства», «Развитие коневодства».....	156
2.11 Лабораторная работа №ЛР-11 Разработка и оптимизация программ селекции	
по породе.....	176

1. Конспекты лекции

1.1 Лекция 1 (Л-1) Понятие о селекции и значение селекции в повышении продуктивности животных. (в интерактивной форме)

1.1.1 Вопросы лекции:

1. Понятие о селекции и значение селекции в повышении продуктивности животных. 2. Роль племенной работы в качественном улучшении с.-х. животных и развитие племенного дела.
3. Основные направления НТП в селекции.
4. Законодательство в племенной работе.

1.1.2 Краткое содержание вопросов:

1. Понятие о селекции и значение селекции в повышении продуктивности животных.

Современное состояние отечественного животноводства характеризуется развитием рыночных отношений, возросшей потребностью в освоении научно-технического прогресса и повышении эффективности производства, в восстановлении продовольственной и экономической независимости, углублении межрегиональных и международных интеграционных связей. Для животноводства в настоящее время характерны следующие основные особенности: дальнейшее увеличение масштабов производства продукции, развитие и углубление интеграционных связей, усиление селекционно-племенной работы, углубленная переработка животноводческой продукции, максимальное использование резервов повышения эффективности производства животноводства.

Градация генетических характеристик в соответствии с их потенциальной полезностью необходима для успешного создания и применения селекционных программ, в которых предусматривается поддержание экономически значимых качеств и параметры условий, необходимых для эффективного производства продукции животноводства. При этом особое значение приобретает определяющие направления селекционно-племенной работы в животноводстве.

Реализация генетического потенциала животных и птицы в условиях конкретной рыночной ситуации и оптимизация условий содержания, кормления, переработки и сбыта конечной продукции, развитой материально-технической базы производства в конечном итоге проявляется в результатах финансового состояния системы племенных животноводческих предприятий.

Вместе с тем результаты работы ряда племенных предприятий России и Оренбургской области еще не отвечают возросшим требованиям рыночной экономики и мировой селекционной работы, вследствие чего генетический потенциал животных и птицы не проявляется в полной мере.

Производственные и экономические показатели остаются на низком уровне, финансовая устойчивость предприятий вызывает большие опасения, а возможности мировой интеграции не получают практического проявления в материальном уровне жизни населения.

Для выхода из сложной экономической ситуации племенным и товарным животноводческим предприятиям необходим постоянный поиск нетрадиционных решений в ведении животноводства, реформирование всей системы воспроизводственных отношений, организация селекционно - племенной работы на уровне мировых требований, выявление и реализация всех резервов повышения эффективности системы производства животноводческой продукции. Работа в условиях рыночной экономики потребовала от всех сельскохозяйственных предприятий осуществления комплекса мер по повышению эффективности производства на основе достижений мирового научно-технического прогресса, прогрессивных форм хозяйствования и интеграции, проявления инициативы и предпринимчивости со стороны руководителей и специалистов.

Успешное увеличение производства продуктов животноводства в нашей стране будет осуществляться за счет укрепления кормовой базы, улучшения племенной работы и внедрения интенсивных технологий во всех отраслях животноводства. В связи с этим одной из важных задач является повышение уровня селекционной работы по совершенствованию племенных и продуктивных качеств животных, создание новых высокопродуктивных пород, типов, отвечающих возрастающим требованиям промышленной технологии. Современные селекционные методы направлены на реализацию генетического потенциала животных в условиях технического роста производства продуктов животноводства.

Цель- Значительное внимание уделяется племенному прогнозированию для разных видов животных. Основные разделы по дисциплине "Племенное дело в животноводстве", освоения студентами теоретических и практических навыков, методических подходов к понятию любого из методов отбора, подбора, направленного выращивания молодняка, выбора метода и техники разведения, а также общей организации племенного дела в Российской Федерации. Значительное внимание уделено новым направлениям – современным способам воспроизведения сельскохозяйственных животных, совершенствованию методов индивидуальной селекции в животноводстве, в частности, при оценке самцов и самок по происхождению, по качеству потомства, при анализе подбора, типов спариваний и их действий на качество потомства, что повышает эффективность отбора, подбора, методов разведения. Показана методика поэтапной селекционно-генетической оценки производителей, включающей определение характера наследования селекционных признаков, возрастной генетически обусловленной изменчивости продуктивности предков, анализа методов подбора при получении самих производителей и потомства от них.

Основой содержания данного курса является:

I. Рассмотрение созданных в течение длительного времени и проверенных практикой методов совершенствования продуктивных и племенных качеств животных.

1. отбор лучших животных, путем их комплексной оценки
2. подбор маток и производителей для спаривания на основе генетической сочетаемости генотипов
3. направленное выращивание молодняка
4. рациональное использование взрослых животных

II . Сейчас от ученых и селекционеров наряду с использованием традиционных методов селекции требуется освоение и широкое применение таких методов, как моделирование селекционного процесса, использование современных достижений в идентификации и информатике. Необходимо в ближайшее время в большей мере овладеть генетическими законами наследственной передачи важнейших хозяйствственно-полезных признаков, дать современную генетическую характеристику пород и племенных стад, разработать эффективные методы возможно ранней оценки наследственных качеств животных, очистить наши породы и стада от генетического брака.

Селекция – это совокупность методов, используемых для создания и совершенствования существующих пород и линий животных. Теоретической базой селекции является генетика. Развитие генетики уже давно создало общую теоретическую базу для практических методов селекции.

Значительные результаты получены в последние годы в процессе дальнейшей разработки генетических основ селекции животных.

Селекция – одна из древнейших прикладных биологических дисциплин. Методы и приемы селекции формировались постепенно и зависели от способа производства и уровня развития биологических наук в целом. В переводе с английского слово «селекция» - это отбор. Безусловно, в племенной работе отбор играет очень важную роль, но является лишь составляющим элементом комплекса мероприятий по качественному совершенствованию животных.

Следовательно, термин «селекция» следует понимать не в узком значении дословного перевода, а в широком, включая все элементы комплекса мероприятий племенной работы. Вместе с тем основа селекции – отбор и подбор животных. В процессе прежде всего учитываются общие закономерности наследственности и изменчивости живых организмов, изучение которых занимается генетика.

За долгие годы в стране выведено 12 пород крупного рогатого скота, 16 пород свиней, 29 пород овец, 7 пород кроликов, 1 порода пушных зверей. На сегодняшний день в мире существует 217 линий и пород кур, 66 линий и пород японских перепелок и 14 линий и пород индеек, 1 порода тутового шелкопряда, 1 порода буйволов, 2 породы коз и 12 пород лошадей.

Мировая популяция сельскохозяйственных животных уже насчитывает 2737 пород и породных групп, отличающихся по своим хозяйствственно-полезным признакам, экстерьеру, типу, организации и биологическим особенностям.

Сельским производителям России и всему миру хорошо известны отечественные высокоурожайные сорта растений и породы животных, не уступающих мировым стандартам по своим продуктивным качествам.

Любая селекционная программа должна включать стратегию, направленную на создание генотипов, способных более эффективно использовать корма на производство продукции.

Ожидается, что в перспективе комплекс биотехнологических приемов даст возможность получать межвидовые гибриды и выводить новые формы сельскохозяйственных животных, сочетающих полезные признаки домашних и диких животных, окажет влияние на регуляцию пола, а также создание генетически идентичных особей с отцовским и материнским генотипом путем пересадки ядер соматических клеток в яйцеклетки и ускорит получение однояйцовых близнецов путем разделения бластомеров, что в итоге ускорит репродукцию животных и позволит в 2-3 раза ускорить темпы селекции.

В современных условиях наука должна стать пятой властью в обществе, обеспечивая разработку и экспертизу всех принимаемых решений и практических мер по управлению страной.

Одомашнивание животных. Одним из важнейших достижений человека на заре его становления и развития (10—12 тыс. лет назад) было создание постоянного и достаточно надежного источника продуктов питания путем одомашнивания диких животных. Главным фактором одомашнивания служит искусственный отбор организмов, отвечающих требованиям человека. У домашних животных весьма развиты отдельные признаки, часто бесполезные или даже вредные для их существования в естественных условиях, но полезные для человека. Например, способность некоторых пород кур давать более 300 яиц в год лишена биологического смысла, поскольку такое количество яиц курица не сможет высиживать. Поэтому в естественных условиях одомашненные формы существовать не могут.

Одомашнивание привело к ослаблению действия стабилизирующего отбора, что резко повысило уровень изменчивости и расширило его спектр. При этом одомашнивание сопровождалось отбором, вначале бессознательным (отбор тех особей, которые лучше выглядели, имели более спокойный нрав, обладали другими ценными для человека качествами), затем осознанным, или методическим. Широкое использование методического отбора направлено на формирование у животных определенных качеств, удовлетворяющих человека.

Процесс одомашнивания новых животных для удовлетворения потребностей человека продолжается и в наше время. Например, для получения модной и высококачественной пушнины создана новая отрасль животноводства — пушное звероводство.

Отбор и типы скрещивания. Отбор родительских форм и типы скрещивания животных проводятся с учетом цели, поставленной селекционером. Это может быть целенаправленное получение определенного экстерьера, повышение молочности, жирности молока, качества мяса и т. д.

Разводимые животные оцениваются не только по внешним признакам, но и по происхождению и качеству потомства. Поэтому необходимо хорошо знать их родословную. В племенных хозяйствах при подборе производителей всегда ведется учет родословных, в которых оцениваются экстерьерные особенности и продуктивность родительских форм в течение ряда поколений. По признакам предков, особенно по материнской линии, можно судить с известной вероятностью о генотипе производителей.

В селекционной работе с животными применяют в основном два способа скрещивания: аутбридинг и инбридинг.

Аутбридинг, или неродственное скрещивание между особями одной породы или разных пород животных, при дальнейшем строгом отборе приводит к поддержанию полезных качеств и к усилению их в ряду следующих поколений.

При инбридинге в качестве исходных форм используются братья и сестры или родители и потомство (отец — дочь, мать — сын, двоюродные братья — сестры и т. д.). Такое скрещивание в определенной степени аналогично самоопылению у растений, которое также приводит к повышению гомозиготности и, как следствие, к закреплению хозяйствственно ценных признаков у потомков. При этом гомозиготизация по генам, контролирующим изучаемый признак, происходит тем быстрее, чем

более близкородственное скрещивание используют при инбридинге. Однако гомозиготизация при инбридинге, как и в случае растений, ведет к ослаблению животных, снижает их устойчивость к воздействию среды, повышает заболеваемость. Во избежание этого необходимо проводить строгий отбор особей, обладающих ценными хозяйственными признаками.

В селекции инбридинг обычно является лишь одним из этапов улучшения породы. За ним следует скрещивание разных межлинейных гибридов, в результате которого нежелательные рецессивные аллелы переводятся в гетерозиготное состояние и вредные последствия близкородственного скрещивания заметно снижаются.

У домашних животных, как и у растений, наблюдается явление гетерозиса: при межпородных или межвидовых скрещиваниях у гибридов первого поколения происходит особенно мощное развитие и повышение жизнеспособности. Классическим примером проявления гетерозиса является мул — гибрид кобылы и осла. Это сильное, выносливое животное, которое может использоваться в значительно более трудных условиях, чем родительские формы.

Гетерозис широко применяют в промышленном птицеводстве (пример — бройлерные цыплята) и свиноводстве, так как первое поколение гибридов непосредственно используют в хозяйственных целях.

Отдаленная гибридизация. Отдаленная гибридизация домашних животных менее эффективна, чем растений. Межвидовые гибриды животных часто бывают бесплодными. При этом восстановление плодовитости у животных представляет более сложную задачу, поскольку получение полиплоидов на основе умножения числа хромосом у них невозможно. Правда, в некоторых случаях отдаленная гибридизация сопровождается нормальным слиянием гамет, обычным мейозом и дальнейшим развитием зародыша, что позволило получить некоторые породы, сочетающие ценные признаки обоих использованных в гибридизации видов. Например, в Казахстане на основе гибридизации тонкорунных овец с диким горным бараном архаром создана новая порода тонкорунных архамериносов, которые, как и архары, пасутся на высокогорных пастбищах, недоступных для тонкорунных мериносов. Улучшены породы местного крупного рогатого скота путем скрещивания его с зебу и яками.

Достижения белорусских и российских селекционеров-животноводов. Селекционерами России достигнуты значительные успехи в создании новых и улучшении уже существующих пород животных. Так, костромская порода крупного рогатого скота отличается высокой молочной продуктивностью — более 10 тыс. кг молока в год. Сибирский тин российской мясошерстной породы овец характеризуется высокой мясной и шерстной продуктивностью. Средняя масса племенных баранов составляет 110—130 кг, а средний настриг шерсти в чистом волокне — 6—8 кг. Немалые достижения имеются также в селекции свиней, лошадей, кур и других животных.

В результате длительной и целенаправленной селекционно-племенной работы учеными и практиками Беларуси выведен черно-пестрый тип крупного рогатого скота. Коровы этой породы в хороших условиях кормления и содержания обеспечивают удои по 4—5 тыс. кг молока жирностью 3,6—3,8% в год. Генетический же потенциал молочной продуктивности черно-пестрой породы составляет 6,0—7,5 тыс. кг молока за лактацию. В хозяйствах Беларуси насчитывается около 300 тыс. голов скота этого типа.

Породы белорусских черно-пестрых и крупных белых свиней созданы специалистами селекционного центра БелНИИ животноводства. Эти породы свиней отличаются тем, что животные достигают живой массы 100 кг.

178—182 дня на контролльном откорме при среднесуточном приросте свыше 700 г, а приплод составляет 9—12 поросят за опорос.

Различные кроссы кур (например, Беларусь-9) характеризуются высокой яйценоскостью: за 72 недели жизни — 239—269 яиц при средней массе каждого 60 г, что соответствует показателям высокопродуктивных кроссов на международных конкурсах.

Продолжается селекционная работа по укрупнению, повышению скороспелости и работоспособности лошадей белорусской упряжной группы, улучшению продуктивного потенциала

овец по настригу шерсти, живой массе и плодовитости, по созданию линий и кроссов мясных уток, гусей, высокопродуктивной породы карпа и др.

2. Роль племенной работы в качественном улучшении с.-х. животных и развитие племенного дела.

Успешное увеличение производства продуктов животноводства в нашей стране будет осуществляться за счет укрепления кормовой базы, улучшения племенной работы и внедрения интенсивных технологий во всех отраслях животноводства. В связи с этим одной из важных задач является повышение уровня селекционной работы по совершенствованию племенных и продуктивных качеств животных, создание новых высокопродуктивных пород, типов, отвечающих возрастающим требованиям промышленной технологии. Современные селекционные методы направлены на реализацию генетического потенциала животных в условиях технического роста производства продуктов животноводства.

При разведении сельскохозяйственных животных человек стремится получить от них разнообразную продукцию высокого качества при наименьших затратах труда и средств. Это возможно лишь в том случае, если в хозяйствах будут непрерывно вести племенную работу.

Племенная работа в хозяйстве представляет собой комплекс мероприятий, проводимых в хозяйствах для улучшения племенных и продуктивных качеств животных существующих пород, а также создания новых, более ценных для данных условий форм. К таким мероприятиям следует отнести:

- творческий отбор, сохранение и максимальное использование наиболее ценных животных, выбраковку худших, непригодных для дальнейшего племенного использования;
- целеустремленный подбор животных для спаривания;
- правильный выбор методов и техники разведения;
- создание для животных наилучших условий кормления и содержания во все периоды их жизни в целях проявления и максимального развития тех ценных качеств, по которым проводится отбор и подбор.

Если из этого комплекса выпадает хотя бы одно из звеньев, то вся остальная работа, как бы образцово она ни была поставлена, не даст должного результата.

Племенное дело – это единый комплекс мероприятий, неразрывно связанных друг с другом.

Многообразие и сложность задач племенной работы требует применения различных методов разведения. Современная зоотехния вооружена знаниями и значительным опытом в управлении процессом породообразования. Неизмеримо выросли возможности селекционеров в этой отрасли, широко использующих результаты труда предшествующих поколений животноводов.

Известным с давних времен, проверенным практикой приемом улучшения племенных и продуктивных качеств животных является отбор. Отбирая животных с определенными качествами, например обильно-молочных коров, и выбраковывая особей менее ценных, можно развить желательные для человека свойства животных. При этом результаты отбора будут зависеть и от условий, в которых находятся животные. Значит отбор представляет собой комплекс мероприятий, направленных на сохранение в стаде лучших животных для воспроизводства, и удаление из стада худших. Различают массовый отбор и индивидуальный. Массовый отбор применяют в стадах коров мясного скота, в больших отарах овец, когда неизвестно происхождение животных и приходится ограничиваться оценкой коров по экстерьеру и овец по настригу шерсти.

Индивидуальный отбор является оценкой животных по комплексу признаков, включающих продуктивность, конституцию, определяемую по экстерьеру и интерьери, способность передавать потомству качество предков.

Отбор начинают с оценки животного по происхождению (родословной). Он производится с целью определения продуктивности родителей и их способности передавать потомкам свои качества. Одновременно учитывают аналогичные качества дедов, бабок, прадедов и прабабок. Причем установлено, что ближайшие предки (отец, мать) оказывают на наследственные свойства потомков больше влияния, чем дальние. Данные оценки заносятся в родословные животных, которые составляются на 4-5 поколений предков с указаниями продуктивности и других племенных качеств. Отбор животных по конституции и экстерьеру предусматривает выраженность типа породы. При этом обращается внимание на такие признаки, как прочный костяк, правильно поставленные крепкие ноги. Животные с порочным телосложением, недоразвитые для целей воспроизводства, не отбираются.

Подбор, или целенаправленное составление родительских пар для получения потомства желательного качества, - один из приемов совершенствования породы. Подбор как бы продолжает отбор, усиливает его действие. Он в животноводстве применяется индивидуальный (предусматривающий прикрепление производителя к отдельным маткам – в племенных хозяйствах), групповой (при котором производитель прикрепляется к группе маток с учетом их средних качеств – в товарных хозяйствах). Подбор должен преследовать цель полного использования лучших и особенно выдающихся животных, соответственно подобранных по комплексу признаков и отличающихся свойством передачи своих качеств потомству.

Методы разведения животных – это система подбора животных с учетом их родственных связей, степени сходства или несходства, породной или видовой принадлежности для решения определенных зоотехнических задач.

К методам разведения сельскохозяйственных животных относятся чистопородное разведение животных (когда спаривают животных, относящихся к одной породе), скрещивание (когда спаривают животных разных пород или их помесей), гибридизация – когда спаривают животных разных видов и линий (межлинейная гибридизация).

Классификация методов разведения:

Чистопородное разведение:

- неродственное разведение (аутбридинг);
- спаривание маток аутбредного происхождения с инбредными производителями (топкроссинг);
- родственное разведение (инбридинг).

Чистопородное разведение

Чистопородное разведение сельскохозяйственных животных дает возможность увеличить поголовье наследственно устойчивых высокопродуктивных животных.

Главная задача чистопородного разведения – сохранение и совершенствование породных качеств. Такое разведение считается обязательным, иначе порода не может существовать и развиваться.

Основу чистопородного разведения составляют:

- отбор на племя животных с ярко выраженными желательными признаками (молочность, мясность, яйценоскость, шерстность и др.);
- целенаправленный подбор пар, с целью усиления и закрепления этих признаков;
- рациональное выращивание и использование животных в условиях, способствующих развитию тех качеств, ради которых эту породу разводят.

При чистопородном разведении спаривают между собой чаще всего неродственных животных. При этом для каждого стада подбирают высокооцененных производителей, происходящих из известных линий и семейств. С целью сохранения и усиления в потомстве наследственных признаков выдающихся по продуктивности предков на определенном этапе работы прибегают к родственному спариванию (инбридингу), например, отца с дочерью, матери с сыном, братьев с сестрами и более далеких

родственников между собой. Однако из-за нежелательных последствий (снижение плодовитости, жизнеспособности, продуктивности, появление уродств), применять инбридинг, особенно тесный, следует осторожно.

К средствам массового улучшения породного поголовья относится также разведение животных по линиям и семействам.

Формы племенной работы. Углубленную работу по улучшению породного состава животных ведут специальные хозяйства: племенные совхозы, племзаводы, станции по племенной работе и искусенному осеменению. Здесь сосредоточена лучшая часть животных всех пород. Основное назначение этих хозяйств – совершенствование имеющихся и создание новых пород. Предназначены они для быстрого повышения продуктивности животных всех видов путем широкого использования выдающихся животных-производителей.

Выставка животных. Значительная роль в популяризации передовых методов работы в животноводстве играют выставки. Выставки проводят для показа достижений хозяйств по улучшению племенных и продуктивных качеств животных. Выставки могут быть специализированы по одному виду или породе животных и общие – с показом животных всех видов. На выставке проводят комплексную оценку животных, присваивают им установленные племенные категории, выдают на лучших животных соответствующие свидетельства. Результаты выставок используют для разработке мероприятий по племенной работе.

Бонитировка животных. Бонитировка животных – это комплексная оценка животных с отнесением их к определенному классу. Ее проводят чаще всего в конце года для определения племенной ценности животных и дальнейшего их использования.

Бонитировку же овец проводят весной до стрижки. Для проведения бонитировки создаются соответствующие комиссии. Перед началом бонитировки проверяют инвентарный номер у животных, обобщают данные о их кормлении и содержании, заполняют бонитировочные ведомости проводят другую подготовительную работу.

Животных оценивают по комплексу признаков в соответствии с требованиями специальных инструкций по бонитировке. На основании данных всесторонней оценки каждое животное относят к определенному классу. Высшим классом для овец, свиней и лошадей считается элита, а для крупного рогатого скота – элита-рекорд. Низшими являются 2-ой и 3-й. Промежуточное значение занимает 1-й класс.

3. Основные направления НТП в селекции.

Научно-технический прогресс (НТП) в любой социально-экономической системе – это сложный и динамичный процесс технического, технологического и социально-экономического совершенствования производственных механизмов. Этот процесс имеет множество определений.

Таким образом, НТП предусматривает, в первую очередь, качественное совершенствование производства продукции, основных фондов, техники и т.д., а его результат выступает в виде роста конкурентоспособности и экономической эффективности производства (повышение производительности труда, экономия сырья и материалов, совершенствование технико-экономического уровня производства, улучшение качества продукции, увеличение рентабельности производства и т.д.).

Научно-технический прогресс является результатом инновационной деятельности. Некоторые авторы рассматривают инновацию как процесс или деятельность, в ходе которой осуществляется стратегия прорыва на базе реализации идеи, открытия или технического изобретения, доведенных до коммерческого использования и получения экономического эффекта.

Развитие инновационных процессов определяется рядом факторов: политической обстановкой; экономической конъюнктурой и инновационным климатом в стране;

развитостью рыночной инфраструктуры; национальной научной, инновационной и структурно-технологической политикой .

Применительно к агропромышленному производству инновационную деятельность следует понимать как совокупность последовательно осуществляемых действий по созданию новой или улучшенной сельскохозяйственной продукции или усовершенствованной технологии и организации их производства на основе использования результатов научных исследований и разработок, а также передового производственного опыта.

Постоянное и непрерывное осуществление инновационной деятельности в сельском хозяйстве предопределяет формирование инновационного процесса, который выступает как закономерно и последовательно чередуемая система конкретных мероприятий по проведению научных исследований и разработок в данной сфере, созданию инноваций и освоению их непосредственно в производстве.

Инновационный процесс в аграрной сфере следует понимать как систему мероприятий по проведению комплекса научных исследований и разработок, созданию инноваций, их освоению с целью максимизации доходов и обеспечения конкурентоспособных параметров производства сельскохозяйственной продукции на основе роста производительности труда, снижения удельных издержек и повышения качества продукции как условий расширенного воспроизводства отрасли.

Необходимо отметить, что «инновационная деятельность» и «инновационный процесс» – это различные дефиниции, которые отличает степень вмешательства человека.

Инновационный процесс невозможен без инновационной деятельности. Для конкретного хозяйствующего субъекта к понятию «научно-технический прогресс» может относиться освоение техники, технологий и т.п., которые в других предприятиях или хозяйствах отрасли уже внедрены.

В то же время, освоение определенного нововведения в отдельном хозяйствующем субъекте еще не будет означать научно-технический прогресс в этой отрасли и станет критерием лишь после того, как это нововведение найдет массовое применение в однотипных предприятиях, т.е. качественно изменится сам уровень производственно-технического потенциала рассматриваемой отрасли общественного производства.

Инновационное развитие АПК и, в частности, отрасли животноводства, имеет специфические отраслевые, функциональные, технико-технологические и организационные особенности, связанные с зависимостью аграрного сектора экономики от природно-климатических условий, биологических факторов (генетический потенциал, обмен веществ в процессе питания животных), наличия квалифицированных кадров, степени адаптивности инновационной деятельности, производственно-финансовых рисков и т.д. Важно отметить, что инновационное развитие в отрасли выражается не только в создании и массовом освоении новой техники, обеспечивающей механизацию производства, но также в разработке и широком распространении научноемких технологий, инновационных методов организации производства и труда.

Характерной чертой отрасли является то, что принципиальные изменения техники и технологий будут эффективны только в том случае, если налажена органическая связь биологических (почва, растение, животное и т.д.) и механических (рабочие машины и оборудование) элементов производственного процесса, которые образуют единую биоиндустриальную систему. Отличительной особенностью биоиндустриальных систем является технологическая схема производства определенного продукта в рассматриваемой отрасли. Например, в животноводстве эта схема выглядит как «человек – механические средства – биологический объект», то есть между работником и биологическим объектом (животным) присутствует механический или автоматический посредник. Это сводит труд в сфере животноводства во все большей степени к функциям регулирования, контроля и управления техникой.

Ускорение НТП предполагает быстрый рост производства высококачественной продукции, применение эффективных технологий, более прогрессивных форм организации труда и управления на основе принципиальной новизны научно-технических разработок, что связано с эффективным использованием научно-технического потенциала сельского хозяйства

Условия и факторы эффективного использования научно-технического потенциала сельского хозяйства можно классифицировать по комплексу основных признаков, характерных для научно-исследовательской и научно-технической деятельности. Они делятся на экономические, организационные, юридические, социальные, психологические и политические факторы. Экономические условия охватывают финансовое, материально-техническое и ресурсное обеспечение науки, организационные – ее организационные формы и особенности их функционирования. Правовые условия характеризуют наличие определенных законов и подзаконных актов для нормального функционирования научных организаций. Социальные условия характеризуют комплекс материально-жизненных возможностей работника науки, определяющих его благополучие и положение в обществе. На этой основе формируется психология работника, его преданность своему делу, профессиональный патриотизм. Одним из важнейших экономических условий эффективного использования научно-технического потенциала, как и организации любого высокоеффективного производства, является ресурсная, техническая и технологическая обеспеченность всех функционирующих научных формирований.

Анализ современного состояния научно-технического потенциала сельского хозяйства показывает, что так же, как и весь агропромышленный комплекс, аграрная наука находится в глубоком кризисе. В то же время, результаты научно-технической деятельности, в частности, в животноводстве свидетельствуют о том, что, несмотря на неблагоприятные условия работы, научные организации ведут активные исследования по актуальным фундаментальным прикладным проблемам, имеющим важное народнохозяйственное значение. Основными причинами относительно медленных темпов развития отрасли сельского хозяйства являются:

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;
- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего, неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;
- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, накопленной декапитализацией, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции;
- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

4. Законодательство в племенной работе.

Закон РФ "О племенном животноводстве" № 123-ФЗ от 3 августа 1995 г. (с поправками на текущий год)

Принят Государственной Думой 12 июля 1995 года Настоящий Федеральный закон устанавливает правовую основу деятельности по разведению племенных животных, производству и использованию племенной продукции (материала), определяет полномочия государственной племенной службы по регулированию указанной

деятельности, а также права и обязанности граждан и юридических лиц в области племенного животноводства.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Задачи племенного животноводства Племенное животноводство призвано обеспечить процесс воспроизведения племенных животных в целях улучшения продуктивных качеств сельскохозяйственных животных и разведения высокопродуктивных сельскохозяйственных животных, сохранения генофонда малочисленных и исчезающих пород сельскохозяйственных животных, полезных для селекционных целей.

Статья 2. Основные понятия В настоящем Федеральном законе применяются следующие основные понятия:

племенное животноводство - разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) в селекционных целях;

племенное животное - сельскохозяйственное животное, имеющее документально подтвержденное происхождение, используемое для воспроизводства определенной породы и зарегистрированное в установленном порядке;

племенная продукция (материал) - племенное животное, его семя и эмбрионы;

организация по племенному животноводству - юридическое лицо, осуществляющее разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) в селекционных целях, а также оказание услуг в области племенного животноводства;

бонитировка - оценка племенных и продуктивных качеств племенного животного, а также качеств иной племенной продукции (материала) в целях их дальнейшего использования;

племенная ценность - уровень генетического потенциала племенного животного и влияние данного генетического потенциала на хозяйствственно полезные признаки потомства;

продуктивность племенных животных - совокупность хозяйственно полезных признаков племенных животных, в том числе качество получаемой от них продукции;

чистопородное разведение племенных животных - разведение племенных животных одной породы в целях консолидации и типизации присущих этой породе признаков;

малочисленная (генофондная) порода - группа редко встречающихся животных определенной породы, отличающихся генетико - селекционными особенностями и находящихся под угрозой исчезновения;

государственная регистрация племенных животных и племенных стад - учет сведений о племенных животных и племенных стадах соответственно в государственной книге племенных животных и государственном племенном регистре в целях идентификации, определения происхождения и установления продуктивности племенных животных и племенных стад;

Статья 3. Правовое регулирование в области племенного животноводства Правовое регулирование в области племенного животноводства осуществляется настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, касающиеся племенного животноводства, являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации в области племенного животноводства, применяются правила международного договора.

Статья 4. Отношения, регулируемые законодательством Российской Федерации в области племенного животноводства Законодательство Российской Федерации в области племенного животноводства регулирует отношения в области разведения племенных животных, производства и использования племенной продукции (материала) во всех отраслях животноводства, включая птицеводство, звероводство, рыбоводство и пчеловодство.

Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в процессе разведения племенных животных, производства и использования племенной продукции (материала), регулируются гражданским законодательством. Нормы гражданского права, содержащиеся в законодательстве Российской Федерации в области племенного животноводства, должны соответствовать гражданскому законодательству Российской Федерации.

Отношения в области разведения и использования диких животных и домашних животных, не являющихся сельскохозяйственными племенными животными, регулируются иным законодательством Российской Федерации.

Глава II. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

Статья 5. Племенная продукция (материал) как объект гражданских прав Племенная продукция (материал) в имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношениях может выступать объектом гражданских прав.

К племенной продукции (материалу) применяются общие правила, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации об имуществе постольку, поскольку настоящим Федеральным законом и иными правовыми актами не установлено иное.

Статья 6. Право собственности на племенную продукцию (материал) Племенная продукция (материал) может находиться в собственности Российской Федерации (федеральная собственность), в собственности субъектов Российской Федерации (собственность субъектов Российской Федерации), в собственности муниципальных образований (муниципальная собственность), в собственности граждан (крестьянских (фермерских) хозяйств) и юридических лиц, осуществляющих разведение и использование племенных животных.

Отнесение находящейся в государственной собственности племенной продукции (материала) к федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Использование племенной продукции (материала) как объекта исключительных прав (интеллектуальной собственности) Использование племенной продукции (материала) как объекта исключительных прав (интеллектуальной собственности) допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о селекционных достижениях.

Статья 8. Оборотоспособность племенной продукции (материала) Племенная продукция (материал) может принадлежать лишь участникам оборота - гражданам и юридическим лицам, осуществляющим разведение и использование племенных животных.

Реализация племенной продукции (материала) возможна только гражданам и юридическим лицам, осуществляющим сельскохозяйственное производство.

Отчуждение или иной переход прав собственности на племенную продукцию (материал) разрешаются при наличии сертификата (свидетельства), выдаваемого в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

Статья 9. Особенности экономической деятельности организаций по племенному животноводству Организации по племенному животноводству создаются и

функционируют на основе многообразия форм собственности при условии единства экономического пространства Российской Федерации.

Перепрофилирование деятельности организации по племенному животноводству допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Использование земель и водных объектов для нужд племенного животноводства

Земельные участки, предоставленные гражданам (крестьянским (фермерским) хозяйствам) и юридическим лицам для осуществления разведения и использования племенных животных, относятся к землям сельскохозяйственного назначения (использования).

Права на земельные участки, порядок предоставления и режим использования земельных участков, установление охранных зон на указанных участках определяются законодательством Российской Федерации.

Граждане и юридические лица, указанные в части первой настоящей статьи, вправе в установленном порядке осуществлять прогон скота, проводить и отводить воду через земельный участок, принадлежащий другому лицу, производить забор воды и организовывать водопой из водного объекта, принадлежащего другому лицу, а также осуществлять иные сервитуты, установленные законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Экспорт и импорт племенной продукции (материала)

Экспорт и импорт племенной продукции (материала) осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, при наличии разрешения специально уполномоченного Правительством Российской Федерации государственного органа по управлению племенным животноводством.

Разрешение на импорт племенной продукции (материала) выдается при условии, если племенная ценность импортируемой племенной продукции (материала) подтверждена признаваемым Российской Федерацией сертификатом (свидетельством). Для получения указанного разрешения заинтересованное лицо обязано представить в специально уполномоченный Правительством Российской Федерации государственный орган по управлению племенным животноводством документы о качестве племенной продукции (материала).

Глава III. УПРАВЛЕНИЕ ПЛЕМЕННЫМ ЖИВОТНОВОДСТВОМ

Статья 12. Государственная племенная служба

Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, непосредственно осуществляющие управление в области племенного животноводства, образуют единую систему органов исполнительной власти (государственную племенную службу).

Статья 13. Основные направления деятельности государственной племенной

службы Государственная племенная служба в соответствии с настоящим Федеральным законом:

проводит единую научно - техническую политику в области племенного животноводства;

организует разработку и реализацию федеральных программ развития племенного животноводства и соответствующих территориальных (региональных) программ; обеспечивает надлежащую экспертизу племенной продукции (материала);

утверждает стандарты, нормы и правила в области племенного животноводства; регистрирует племенных животных и племенные стада соответственно в

государственной книге племенных животных и государственном племенном регистре; выдает сертификаты (свидетельства);

определяет условия применения селекционных и биотехнологических методов в области племенного животноводства;

устанавливает перечень видов животных, особи которых используются в качестве племенных животных;
определяет виды организаций по племенному животноводству;
разрабатывает предложения о мерах по государственному стимулированию племенного животноводства, в том числе по сохранению генофонда малочисленных и исчезающих пород сельскохозяйственных животных, полезных для селекционных целей;
координирует международное сотрудничество Российской Федерации в области племенного животноводства.

Статья 14. Специально уполномоченный Правительством Российской Федерации государственный орган по управлению племенным животноводством Государственную политику и координацию деятельности в области племенного животноводства осуществляет специально уполномоченный Правительством Российской Федерации государственный орган по управлению племенным животноводством, входящий в состав федерального органа исполнительной власти, осуществляющего управление сельским хозяйством.

Статья 15. Государственные органы по управлению племенным животноводством субъектов Российской Федерации Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации создают государственные органы по управлению племенным животноводством на соответствующей территории.

Статья 16. Главные государственные инспектора в области племенного животноводства Руководитель специально уполномоченного Правительством Российской Федерации государственного органа по управлению племенным животноводством и руководители соответствующих органов по управлению племенным животноводством субъектов Российской Федерации одновременно являются главными государственными инспекторами в области племенного животноводства.

Главные государственные инспекторы в области племенного животноводства в пределах своей компетенции имеют право:

беспрепятственно посещать организации по племенному животноводству и получать от них безвозмездно необходимую информацию;
давать организациям по племенному животноводству предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации в области племенного животноводства и осуществлять контроль за выполнением указанных предписаний;
приостанавливать реализацию племенной продукции (материала) при условии, если выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области племенного животноводства;
осуществлять государственный надзор за применением в области селекции и воспроизводства племенной продукции (материала) новых технологий, инструментов, оборудования, материалов и биотехнологических методов;
не допускать реализацию и иное использование племенной продукции (материала) без сертификата (свидетельства);
давать заключения по спорам, возникающим между гражданами (крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), юридическими лицами при осуществлении деятельности в области племенного животноводства;
привлекать к административной ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в области племенного животноводства.

Порядок деятельности главных государственных инспекторов в области племенного животноводства устанавливается положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Глава IV. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

Статья 17. Лицензирование отдельных видов деятельности в области племенного животноводства

Отдельные виды деятельности в области племенного животноводства подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 18. Государственная регистрация племенных животных и племенных стад

Объектами государственной регистрации являются племенные животные и племенные стада.

Государственная регистрация племенных животных и племенных стад осуществляется посредством внесения записей соответственно в государственную книгу племенных животных и государственный племенной регистр.

В государственную книгу племенных животных и государственный племенной регистр заносятся данные о племенных и продуктивных качествах племенных животных, племенных стадах, а также другие данные, необходимые для идентификации племенных животных, племенных стад, определения их происхождения и хозяйственной ценности. Указанные данные должны быть доступными для заинтересованных лиц.

Государственная книга племенных животных и государственный племенной регистр ведутся соответствующими органами государственной племенной службы.

Положение о государственной книге племенных животных и положение о государственном племенном регистре утверждаются специально уполномоченным Правительством Российской Федерации государственным органом по управлению племенным животноводством.

Статья 19. Сертификация племенной продукции (материала)

Племенная продукция (материал) подлежит обязательной сертификации на соответствие установленным стандартам, нормам и правилам в области племенного животноводства.

Сертификация племенной продукции (материала) проводится в целях определения и документального подтверждения происхождения, продуктивности племенных животных, отсутствия у них генетических пороков, а также происхождения и качества семени или эмбрионов. Документ о результатах сертификации - сертификат (свидетельство) - является основанием для признания конкретного животного племенным и гарантирует определенный уровень эффективности его использования при соблюдении пользователем племенной продукции (материала) технологии ведения племенного животноводства.

Сертификация племенной продукции (материала) осуществляется соответствующими органами государственной племенной службы при участии контрольно - испытательных станций животноводства, ипподромов, лабораторий селекционного контроля качества молока, шерсти и лабораторий иммуногенетической экспертизы.

Порядок проведения сертификации племенной продукции (материала) устанавливается законодательством Российской Федерации, регулирующим эти вопросы.

Статья 20. Государственное стимулирование племенного животноводства

Финансирование племенного животноводства осуществляется на основании федеральных программ развития племенного животноводства, предусматривающих меры государственной поддержки племенного животноводства.

Финансирование племенного животноводства осуществляется за счет средств федерального бюджета, направляемых на развитие сельского хозяйства, и предусматривается в федеральном бюджете отдельной строкой.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральными программами развития племенного животноводства разрабатывают территориальные (региональные) программы развития племенного животноводства применительно к местным условиям и осуществляют их финансирование за счет средств соответствующих бюджетов.

Организациям по племенному животноводству могут в установленном порядке предоставляться гарантии, льготные кредиты, налоговые и иные льготы. Финансирование мероприятий по сохранению генофонда отечественных малочисленных и исчезающих пород сельскохозяйственных животных, полезных для селекционных целей, осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Статья 21. Научные исследования в области племенного животноводства

Научные исследования в области племенного животноводства осуществляют научно - исследовательские организации Российской Федерации сельскохозяйственного профиля. Совместно с соответствующими органами государственной племенной службы указанные организации осуществляют разработку:

государственных научно - технических программ в области племенного животноводства; методов и приемов совершенствования процесса воспроизводства племенных животных; методик и технических средств для оценки и генетического контроля племенной продукции (материала);

систем информационного обеспечения в области племенного животноводства.

Глава V. ПРИЗНАНИЕ ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (МАТЕРИАЛА) И ЕЕ БОНИТИРОВКА

Статья 22. Условия использования племенного животного в целях воспроизводства породы Племенное животное используется в целях воспроизводства породы в случаях, если:

племенное животное подвергнуто мечению или обозначено каким-либо иным способом, позволяющим точно идентифицировать это животное;

племенное животное зарегистрировано и (или) на него имеется сертификат (свидетельство).

Статья 23. Условия использования семени племенных животных в целях их разведения Семя племенных животных, произведенное для реализации, используется в целях их разведения в случаях, если:

оно получено в организациях по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;

оно получено от племенных животных, зарегистрированных в установленном порядке;

оно четко обозначено в целях идентификации;

на него имеется сертификат (свидетельство).

Семя племенных животных может быть реализовано или передано другим лицам исключительно организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.

Статья 24. Условия использования эмбрионов племенных животных в целях разведения племенных животных Эмбрионы племенных животных в целях разведения племенных животных используются в случаях, если:

они получены в организациях по трансплантации эмбрионов;

они получены от племенных животных, зарегистрированных в установленном порядке;

они четко обозначены в целях их идентификации (в случае нахождения эмбриона в животном оно должно быть подвергнуто мечению);

на них имеются сертификаты (свидетельства).

Эмбрионы племенных животных могут быть реализованы или переданы другим лицам исключительно организациями по трансплантации эмбрионов.

Статья 25. Бонитировка племенной продукции (материала)

Порядок и условия проведения бонитировки племенной продукции (материала) устанавливает специально уполномоченный Правительством Российской Федерации государственный орган по управлению племенным животноводством.

Бонитировка племенной продукции (материала) проводится ежегодно во всех организациях, имеющих указанную продукцию (материал).

Статья 26. Оценка племенных животных - производителей

Племенные животные - производители, отобранные для воспроизведения породы, подлежат проверке и оценке по качеству потомства и (или) собственной продуктивности. Проверка племенных животных - производителей проводится в организациях по племенному животноводству, где достигнут установленный уровень продуктивности племенных животных.

Статья 27. Доступность данных о бонитировке

Государственная племенная служба обобщает данные о бонитировке и информирует заинтересованных лиц о ее результатах в целях стимулирования эффективного использования высокоценных племенных животных.

Глава VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

Статья 28. Основные принципы организации деятельности в области племенного животноводства

Деятельность в области племенного животноводства основывается на принципах: повышения эффективности и конкурентоспособности животноводства; обеспечения сохранения породы при чистопородном разведении племенных животных; обеспечения надлежащего учета данных в области племенного животноводства; оперативной обработки информации в области племенного животноводства и передачи ее гражданам и юридическим лицам, осуществляющим разведение и использование

Статья 29. Организации по племенному животноводству

Деятельность в области племенного животноводства осуществляется организациями по племенному животноводству и гражданами (крестьянскими (фермерскими) хозяйствами).

К гражданам (крестьянским (фермерским) хозяйствам), осуществляющим деятельность в области племенного животноводства без образования юридического лица, соответственно применяются положения настоящего Федерального закона, которые регулируют деятельность организаций по племенному животноводству, если иное не вытекает из законодательства Российской Федерации или из существа правоотношения. Организации по племенному животноводству ведут учет данных в области племенного животноводства по формам, установленным специально уполномоченным Правительством Российской Федерации государственным органом по управлению племенным животноводством.

Статья 30. Виды организаций по племенному животноводству

В зависимости от направления деятельности организации по племенному животноводству могут быть следующих видов: племенной завод; племенной репродуктор; организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных; организация по трансплантации эмбрионов; организация по племенной работе, организации по учету, контролю, оценке уровня продуктивности и качества продукции, племенной ценности животных (контрольно - испытательная станция животноводства, ипподром, лаборатория селекционного контроля качества молока, шерсти, лаборатория иммуногенетической экспертизы, центр информационного обеспечения) и другие организации по племенному животноводству.

В учредительных документах организации по племенному животноводству указываются организационно - правовая форма, вид, а также предмет и цель деятельности данной организации.

Статья 31. Племенной завод

Племенной завод - организация по племенному животноводству, располагающая стадом высокопродуктивных племенных животных определенной породы и использующая чистопородное разведение племенных животных (скрещивание племенных животных допускается только по согласованию со специально уполномоченным Правительством

Российской Федерации государственным органом по управлению племенным животноводством). Племенной завод производит племенных животных, как правило, для племенных репродукторов.

Статья 32. Племенной репродуктор

Племенной репродуктор - организация по племенному животноводству, которая осуществляет разведение племенных животных в целях обеспечения потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Статья 33. Организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных Организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных содержит племенных животных - производителей, которые используются для получения семени. Указанная организация проводит работы по получению, обработке, контролю качества, хранению и поставке семени для проведения искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, регистрируя все технологические процессы.

Организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных создается по согласованию со специально уполномоченным Правительством Российской Федерации государственным органом по управлению племенным животноводством.

Руководителем организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных может быть только специалист, имеющий высшее зоотехническое или высшее ветеринарное образование.

Статья 34. Организация по трансплантации эмбрионов Организация по трансплантации эмбрионов проводит работы по получению, обработке, контролю качества эмбрионов племенных животных, трансплантации и (или) передаче эмбрионов племенных животных другим сельскохозяйственным товаропроизводителям, регистрируя все технологические процессы.

Организация по трансплантации эмбрионов создается по согласованию со специально уполномоченным Правительством Российской Федерации государственным органом по управлению племенным животноводством.

Руководителем организации по трансплантации эмбрионов может быть только специалист, имеющий высшее зоотехническое или высшее ветеринарное образование.

Статья 35. Организация по племенной работе, организации по учету, контролю, оценке уровня продуктивности и качества продукции, племенной ценности животных Организация по племенной работе, организации по учету, контролю, оценке уровня продуктивности и качества продукции, племенной ценности животных (контрольно - испытательная станция животноводства, ипподром, лаборатория селекционного контроля качества молока, шерсти, лаборатория иммуногенетической экспертизы, центр информационного обеспечения) осуществляют учет генотипических и фенотипических признаков племенных животных для использования указанных признаков в селекции животных.

Глава VII. ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЭМБРИОНОВ

Статья 36. Использование семени племенных животных - производителей и эмбрионов для разведения сельскохозяйственных животных

Семя племенных животных - производителей и эмбрионы, полученные в организациях по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, а также эмбрионы, полученные в организациях по трансплантации эмбрионов, используются для разведения сельскохозяйственных животных.

Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных и (или) трансплантацию эмбрионов выполняет специалист, допущенный к проведению указанных работ в

порядке, установленном специально уполномоченным Правительством Российской Федерации государственным органом по управлению племенным животноводством.

Статья 37. Заявка на проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных

Заявка на проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных подается гражданами и юридическими лицами, осуществляющими разведение и использование сельскохозяйственных животных, в соответствующий орган государственной племенной службы.

В этой заявке должны указываться:

наименование и место нахождения заявителя;

территория деятельности, установленная по согласованию с соответствующим органом государственной власти.

При необходимости изменения территории деятельности подается новая заявка на проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных.

Статья 38. Разрешение на проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных

Разрешение на проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных выдается соответствующим органом государственной племенной службы.

Разрешение на проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных предоставляется гражданам и юридическим лицам, осуществляющим разведение и использование сельскохозяйственных животных, при наличии работников, имеющих определенную квалификацию, и специального оборудования, а также необходимых противоэпизоотических, санитарно - гигиенических и зооветеринарных условий для проведения работ по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.

Статья 39. Заявка на проведение трансплантации эмбрионов

Заявка на проведение трансплантации эмбрионов подается руководителем организации по трансплантации эмбрионов в соответствующий орган государственной племенной службы. В этой заявке должны указываться:

наименование и место нахождения заявителя;

территория деятельности, установленная по согласованию с соответствующим органом государственной власти.

При необходимости изменения территории деятельности руководитель организации по трансплантации эмбрионов обязан подать новую заявку на проведение трансплантации эмбрионов.

Статья 40. Разрешение на проведение трансплантации эмбрионов

Разрешение на проведение трансплантации эмбрионов выдается соответствующим органом государственной племенной службы.

Разрешение на проведение трансплантации эмбрионов предоставляется организации по трансплантации эмбрионов при наличии работников, имеющих определенную квалификацию, и специального оборудования, а также зооветеринарных и санитарно - гигиенических условий для проведения работ по трансплантации эмбрионов.

Статья 41. Порядок подачи заявок и выдачи разрешений на проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и трансплантации эмбрионов

Порядок подачи заявок и выдачи разрешений на проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и трансплантации эмбрионов устанавливается специально уполномоченным Правительством Российской Федерации государственным органом по управлению племенным животноводством.

Глава VIII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

Статья 42. Разрешение споров при осуществлении деятельности в области племенного животноводства Споры, возникающие между гражданами, юридическими лицами при осуществлении деятельности в области племенного животноводства, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 43. Разрешение споров при использовании отечественного и зарубежного генофонда племенных животных Споры, возникающие при использовании отечественного и зарубежного генофонда племенных животных между организациями по племенному животноводству, расположенными на территории Российской Федерации, и организациями по племенному животноводству, расположенными на территориях иностранных государств, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Статья 44. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в области племенного животноводства Нарушение законодательства Российской Федерации в области племенного животноводства влечет административную или иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава IX. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

Статья 45. Международное сотрудничество Российской Федерации в области племенного животноводства Российская Федерация содействует развитию международного сотрудничества в области племенного животноводства.

Международное сотрудничество Российской Федерации в области племенного животноводства осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.

На территории Российской Федерации иностранные граждане или иностранные юридические лица осуществляют деятельность в области племенного животноводства в той мере, в какой указанный режим предоставляет соответствующим иностранным государством гражданам и юридическим лицам Российской Федерации.

Статья 46. Право на сотрудничество с иностранным участием в области племенного животноводства Граждане и (или) юридические лица Российской Федерации, принимающие участие в осуществлении проектов с иностранным участием в области племенного животноводства, заключают договоры с иностранными гражданами и (или) иностранными юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 47. Вступление настоящего Федерального закона в силу

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 48. Приведение правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации приводятся в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение трех месяцев со дня его вступления в силу.

1.2 Лекция 2 (Л-2) Теоретические основы селекционного отбора (в интерактивной форме)

1.2.1 Вопросы лекции:

1. Сущность отбора и генетические предпосылки отбора.

2. Методы селекции.

3. Организация и принципы бонитировки у разных видов сельскохозяйственных животных

1.2.2 Краткое содержание вопросов:

1. Сущность отбора и генетические предпосылки отбора.

Селекция (лат. *selectio* — выбор, отбор, от *seligo* — выбираю, отбираю):

- 1) наука о методах создания сортов и гибридов растений, пород животных.
- 2) Отрасль с.-х. производства, занимающаяся выведением сортов и гибридов с.-х. культур, пород животных, разрабатывает способы воздействия на растения и животных с целью изменения их наследственных качеств в нужном для человека направлении.

Она является одной из форм эволюции растительного и животного мира, которая подчиняется тем же законам, что и эволюция видов в природе, но естественный отбор здесь частично заменен искусственным отбором. Селекция играла и играет большую роль в обеспечении населения земного шара продовольствием. Благодаря одомашниванию и примитивной селекции человечество уже в эпоху неолита имело почти все современные продовольственные культуры, многие виды домашнего скота. С развитием промышленной и научной селекции значительно возросла продуктивность растений и животных. Сорт растений и порода стали средствами с.-х. производства, важными факторами интенсификации растениеводства и животноводства, способствующими переводу их на промышленную основу (например, создание короткостебельных неполегающих сортов зерновых культур, хорошо приспособленных к уборке комбайном; сортов овощных культур для выращивания в теплицах; винограда, томата, приспособленных к машинной уборке; групп крупного рогатого скота — к условиям содержания в животноводческих комплексах).

Выведение новых и совершенствование старых пород животных в нашей стране основаны на отборе лучших животных, обладающих желательными признаками продуктивности, и создание условий для развития тех признаков, по которым осуществляется отбор.

Т.о. в ускорении селекции пород большое значение имеет отбор. Генетические основы отбора были разработаны в трудах Чарльза Дарвина.

Его «эволюционная теория» о естественном отборе позволила научно обосновать происхождение многочисленных видов животных. Дарвин установил, что отбор имеет прогрессивно усиливающееся действие, если он осуществляется в одном и том же направлении в ряде поколений, а условия жизни благоприятствуют развитию признака, по которому осуществляется отбор. Рассматривая изменчивость, наследственность и отбор в единстве, Дарвин показал исторический процесс развития органического мира. Изменчивость организмов создает материал для отбора под влиянием приспособления значительного числа родившихся животных к данным условиям жизни. Этот отбор называется **естественным**.

В отличие от естественного отбора **искусственный** отбор осуществляется при разведении домашних животных путем создания условий кормления и содержания, соответствующих продуктивности, а также, соответствующих продуктивности, а также развития полезных для человека качеств.

Ч.Дарвин подчеркивал сходство естественного и искусственного отбора. Для нас же не менее важным является и различия между ними, заключающиеся в том, что первый действует непрерывно и на всех стадиях онтогенеза, а второй — лишь в определенное время (при выбраковке из стада нежелательных животных). В животноводстве творческая роль отбора заключается, в частности, в усилении изменчивости под действием отбора.

Успеху отбора, по Дарвину, благоприятствуют такие условия, как:

1. разведения большого числа особей,
2. высокая их плодовитость и способность размножаться в раннем возрасте,
3. большая изменчивость животных по интересующим человека признакам,
4. соответствие условий внешней среды направленного отбора,
5. характер соотносительной изменчивости,
6. умение селекционера подмечать мелкие, порой едва уловимые различия в

признаках, по которым ведется отбор и т.д.

Основное действие отбора, по Дарвину, состоит в накоплении индивидуальных изменений, в создании новых форм и в их расхождении.

Каждое наследственное изменение, возникшее под действием измененных условий жизни, является звеном в цепи жизненного единого процесса. Оно будет не только поддерживаться отбором в последующих поколениях, но и усиливаться, изменяется, в том же направлении, если этому благоприятствуют условия среды. Большую роль при этом играет так называемая **длящаяся изменчивость**, заключающаяся в том, что организм передает, потомству способность изменяться в начатом направлении. Начавшееся изменение будет усиливаться в последующих поколениях (при сохранении благоприятствующих условий) в силу наследственной связи между поколениями. Наследственная связь между поколениями создает предпосылку не повторять все с начала, а продолжать под действием отбора начавшееся изменение в том же направлении. Без длящейся изменчивости невозможна творческая роль отбора. Наследственность в этом случае содействует изменчивости и по мере повторения онтогенезов сама становится более сильной, консервативной; из фактора стимулирующего она переходит в фактор закрепляющий. Длящаяся изменчивость усиливается, накапливается и закрепляется. Так создается относительно устойчивые виды, породы.

Отбор направляет изменчивость организмов в определенное русло, в каком направлении идет отбор, в таком же направлении совершенствуется порода, при условии, что внешняя среда благоприятствует развитию признаков и свойств, по которым ведется отбор. Но отбор начинается лишь тогда, когда уже появилось уклонение (хотя бы в зачаточном виде).

Ч.Дарвин указывал, что отбор, проводимый человеком, основывается на отклонениях, поставляемых природой независимо от воли отбирающего. Причиной же появления этих уклонений могут быть и изменения в условиях существования, а мелкие случайные наследственные изменения типа мутаций, и новые сочетания наследственных признаков при спаривании генетически несходных особей и т.д. Человек, познавая закономерности наследственной изменчивости, начинает сознательно управлять ею. Постепенно совершенствуя методы распознавания мельчайших наследственных различий, разводя достаточно большие целостные группы животных, подбирая наиболее ценные родительские пары, создавая условия, необходимые для развития нужных свойств разводимых животных, и, наконец, сознательно вызывая определенные наследственные изменения внешними воздействиями, человек начинает все более совершенно управлять процессом эволюции животных.

Для прогрессивной эволюции более благоприятны большие популяции со значительным наследственным разнообразием и с большим ареалом. В однородных, мало меняющихся условиях среды, в небольших популяциях наследственность организмов устойчивее и консервативнее, а наследственные уклонения более редки. В этих условиях происходит быстрое устранение уклонений и распространение преимущественно менее изменчивых форм с устойчивой наследственностью и с меньшими приспособительными возможностями к меняющимся условиям среды. В разнообразных и благоприятных условиях существования больших популяций, наоборот, наследственность часто оказывается податливее, наследственные изменения более часты, устранения уклонений не столь остро, а возможности повышения изменчивости и сохранения более изменчивых форм увеличиваются. Чем интенсивнее в процессе отбора происходит устранение уклоняющихся форм, тем медленнее идет накопление новых изменений, менее значительны индивидуальные различия в популяции и менее пластична и податлива на всякие изменения популяция.

При отборе по нескольким **качественным признакам**, каждый из которых

наследуется по простой моногибридной форме, эффективность отбора снижается для каждой отдельной пары аллелеморфных признаков. Эффективность отбора по **полимерным (количественным) признакам** (при допущении одинакового аддитивного действия каждой пары аллелеморфных наследственных факторов) зависит от числа пар наследственных факторов (n) и частоты гамет q и r каждой пары: при q равном или близком к 0,5, эффективность отбора будет максимальной; чем большим число факторов наследственно обусловлен данный признак, тем менее эффективным будет отбор по этому признаку (с увеличением n эффективность отбора падает пропорционально \sqrt{n}). Результат отбора (по количественному признаку), проводимый в течение одного поколения, может быть выражен **сдвигом генетической средней**, характеризующей популяцию. Величина этого сдвига зависит от интенсивности отбора: чем большая часть стада используется для воспроизведения, тем меньше сдвиг генетической средней, и наоборот.

Отбор поддерживает и стабилизирует благоприятный в данных условиях генетический гомеостаз популяции, т.к. последний защищает организм от меняющихся условий среды. При этом чем меньше в фенотипе реализован генотип, тем меньше возможное действие отбора.

Отбор, влияя на особь через фенотипические проявления всего генотипа, входит в определенное взаимодействие с данным генотипом. Сложное взаимоотношение различных генов в генотипе не только определяют те или иные признаки, но и влияют на онтогенез клеток, тканей, организма в целом.

Естественный отбор оказывает влияние на популяцию не через ген, а через особь, в которой проявляется комплекс всего генотипа в виде фенотипического состояния тех или иных признаков. Один и тот же генотип, в одинаковых условиях среды реагирует по-разному, поэтому его эволюционная роль на фоне искусственного и естественного отбора будет несходной. В нормальных условиях генотип обычно полностью не реализуется. Потенциальные возможности генотипа полнее проявляются в экстремальных условиях. Отбор упорядочивает генетическую изменчивость, возникшую под влиянием мутаций и других факторов, имеющих случайный характер и вызывающих генетическую изменчивость. Находясь в единстве с факторами, вызывающими изменчивость, отбор оказывает направленное влияние на структуру популяции.

Необходимо подчеркнуть: чем меньше ген влияет на фенотип, что особенно характерно для рецессивного состояния аллели, тем меньше этот аллель подвержен отбору, пока он находится в гетерозиготе, а генотипы AA и Aa по численности равны. Выщепление рецессивного аллеля и в поле деятельности отбора. На фоне сложного взаимодействия в генотипе формируется фенотипическое состояние тех или иных свойств организма, которое и служит объектом отбора.

Особенности индивидуальных качеств генов и их интегрированного состояния в геноме влияют на эффект и результативность отбора. Естественный отбор, способствуя выживанию более приспособленных особей соответствующего генотипа, отражает популяцию от действия вредных мутаций и сохраняет ее структуру, благоприятствующую большей приспособленности входящих в нее особей.

Давление отбора на тот или иной аллель локуса выражается коэффициентом селекции (S), которым измеряется преимущественное воспроизведение наследственного признака в следующем поколении.

2. Методы селекции.

Отбор на доминантный и рецессивный ген.

Оказать давление и изменить генную популяцию отбор может на уровне гамет и зигот.

В начале **отбора на доминантную аллель**, пока частота его низкая, эффект селекции бывает высок. По мере повышения концентрации доминантного аллеля в

последующих поколениях эффективность отбора снижается. Если отбор направлен против **рецессивных аллелей**, эффект отбора увеличивается при высоких уровнях частот такого аллеля. При этом естественный отбор, устранив одни генотипы, может поддерживать другие. В результате доля одних генотипов в потомстве снижается, других же увеличивается, а структура популяции изменяется.

Естественный отбор в популяциях сельскохозяйственных животных и птицы дополняется действием искусственного отбора. В популяциях при большей возможности оказывать давление на генную частоту искусственным отбором и получать сдвиг в частоте генов эффект отбора выявляется уже в ближайших поколениях потомков. В результате изменяется в ходе микроэволюции генных частот популяция (порода, стадо, отара, гурт) распадается на ряд генетических групп, что свидетельствует о ее смещение по генотипам и изменении структуры.

Изменение структуры популяции под действием отбора зависит от того, какой тип наследования проявляется у нежелательных аллелей в генотипе (доминирования, рецессивность, сверхдоминирование). Если **отбор направлен против нежелательного рецессивного аллеля**, то его частота в первых поколениях уменьшается быстро, а в последующих медленнее и может оказаться нулевой, т.е. отбор устраняет из популяции рецессивную аллель. В этом случае из-за малой частоты рецессивного аллеля **a** быстро уменьшается доля гетерозигот **Aa**. В результате снижается возможность их встречи для размножения и тем самым устраняется источник выщепления гомогенных рецессивных генотипов **aa**. В случае, когда **отбор направлен против нежелательных доминантных аллелей**, эффективного действия на популяцию бывает и выше и результат выявляется быстрее, чем при отборе, направленном против рецессивных аллелей.

Естественный отбор при частичном или полном доминировании нежелательных аллелей, направленный против них, действует до полного исчезновения в популяциях тех аллелей, которые формируют у организмов меньшую выживаемость и пониженную воспроизводительную способность.

Отбор включает в себя дифференциальную жизнеспособность различных генотипов и дифференциальное многоплодие и более строго определяется как процесс, направленный к повышению или понижению вероятности сохранности потомства одной формой организма по сравнению с другими формами. К изменению частот генов может привести отбор среди генотипов, хотя в действительности процесс отбора идет на уровне особей (генотипов), а не на уровне аллелей, и адаптационная ценность каждого генотипа зависит от действия и взаимодействия всех генотипов, имеющихся у данной особи.

В популяциях сельскохозяйственных животных, где действует естественный и искусственный отборы, можно оказывать давление на генную частоту искусственным отбором и получать сдвиги в частоте генов, чтобы эффект отбора выявлялся в ближайших поколениях. Особый интерес представляет случаи, когда самый редкий ген имеет наибольшую приспособленность.

Отбор бессознательный и методический

Отбор «бессознательный» и методический И. Дарвин выделил два основных вида отбора «бессознательный» и методический.

При «бессознательном» отборе сохраняют красивых животных и не оставят задачи изменения породы или создания новой. Такой отбор, применяемый в течении длительного периода, постепенно привел к большим изменениям одомашненных животных. Теперь это прошедший исторический этап.

При методическом отборе ставится задача изменить породу в сторону заранее намеченных целей, т. е. изменить популяцию животных или породу в определённом направлении или даже создать новую породу с желательными качествами.

При методическом отборе ведется целенаправленная работа по отбору из поколения в поколения на племя тех животных, которые в наибольшей мере приближаются к

желательному типу. С помощью этого метода намечая со второй половины XVIII века было создано много специализированных пород с-Х животных.

Отбор по фенотипу и отбор по генотипу.

Применяют следующие методы оценки племенных качеств животных при отборе: по фенотипу (индивидуальным качествам или собственной продуктивности) и по генотипу (по происхождению, по сибсам, пот качеству потомства).

Оценка и отбор по фенотипу (массовый). Оценка по собственной продуктивности является часто единственным источником информации для выявления племенной ценности сельскохозяйственных животных. Выявление фактических и потенциальных возможностей животных при отборе и для дальнейшего племенного воспроизводства.

Такой отбор дает хорошие результаты только при высокой наследуемости признака, при низко же наследуемости он мало эффективен.

Отбор животных по технологическим признакам.

Отбор по интенсивности роста (скороспелости) скороспелость определяется по среднесуточным приростам. Скороспелые животные раньше оканчивают рост и приобретают желаемые для породы пропорции тела. Таких животных можно раньше начать использовать по хозяйственному назначению.

Отбор по живой массе. Величина живой массы имеет важное значение при отборе животных, дающих продукцию, являющаяся конечным результатом оценки и отборе. Получение от более крупных животных- более высокой продуктивности. Повышенная молочность коров путем увеличения их живой массы. Отбор по молочной продуктивности в конечном итоге приведет к увеличению живой массы коров.

Отбор по затратам корма. Этот показатель определяется количеством кормовых единиц, затраченных на получение определенного количества продукции. Исследованиями установлено, что эффективность использования кормов животными разных пород неодинакова, что обусловлено генетически и объясняется неодинаковой способностью животных усваивать питательные вещества корма. У животных, которые хорошо оплачивают корма продукцией, расход питательных веществ на поддержание жизни находится на пониженном уровне, а в теле содержится сравнительно мало липидов.

Эффективность использования кормов в пределах одной генетической популяции значительно колеблется, что позволяет применять этот признак в селекционной работе с целью повышения использования как отдельных питательных веществ, так и корма в целом. Результаты селекции на повышение эффективности использования кормов различными видами животных указывают на ее перспективность. За 2—4 поколения использование кормов у животных улучшалось на 10 % и более.

Между продуктивностью и эффективностью использования кормов существует высокая положительная корреляция . Методы оценки эффективности использования кормов сводятся к определению индивидуальных затрат кормов на продукцию. В структуре себестоимости животноводческой продукции затраты на корм составляют 60—70 %. Поэтому селекция животных на повышение оплаты корма продукцией очень важна. Эффективность отбора по оплате корма подтверждают многочисленные научные данные.

Из приведенных данных видно, что отбор животных по повышению эффективности использования корма является перспективным. Подтверждением служит также достаточно высокий коэффициент наследуемости этого признака. Поскольку между оплатой корма и показателями продуктивности существует высокая положительная корреляция, селекция на повышение этих показателей способствует снижению затрат кормов.

В опытах на молочном скоте красной степной породы были определены существенные индивидуальные различия в оплате корма. В частности, в группе коров с

годовым надоем 2500 кг 29 % животных на 1 кг молока с 4 % жира затрачивали 1,09 корм, ед., 37% коров—1,17 корм. ед. и 34% — 1,2 корм. ед.

Установлены также половые различия в использовании кормов: при одинаковой живой массе курочки затрачивают больше кормов, чем петушки.

Доказано, что эффективность использования кормов зависит и от живой массы животных. Например, коровы красной степной породы с живой массой от 450 до 600 кг дают на 1 корм. ед. 0,98—1,05 молока, а с живой массой от 601 до 750 кг —0,88—0,99 кг молока.

Таким образом, в настоящее время выявлены породные и линейные генетически обусловленные различия у животных в потребности по многим питательным веществам. Значительная изменчивость способности усвоения кормов организмом в пределах одной генетической популяции позволяет использовать этот признак в селекционной работе для отбора особей с повышенной эффективностью усвоения как отдельных питательных веществ, так и корма в целом.

Оценка животных по воспроизводительной способности. Осуществление намеченных программ селекции в животноводстве возможно без повышения плодовитости животных. Отбираемые на племя животные должны отличаться не только высокими племенными качествами, но и хорошими воспроизводительными способностями. Высокая продуктивность и регулярное воспроизводство животных определяют рентабельность племенных хозяйств. В связи с этим возникает необходимость интенсификации методов повышения воспроизводства стад.

Плодовитость рассматривается как один из наиболее сложных признаков в физиологическом и генетическом аспекте. Различают плодовитость мужских и женских особей, отдельных особей и стад. За меру плодовитости самок у многоплодных животных принята величина помета. Размножаться животные могут только при достижении ими половой зрелости. Половая зрелость, как правило, наступает в возрасте, когда организм еще не полностью сформирован, поэтому различают половую и племенную зрелость. Время достижения половой и племенной зрелости варьирует в больших пределах не только у отдельных видов, но и внутри вида и породы. Раннее наступление половой зрелости животных и возможность раннего их использования в разведении имеет большое экономическое значение.

Оценивать быков по воспроизводительной способности необходимо в самом начале их племенного использования, а в дальнейшем делать это ежегодно одновременно с комплексной оценкой.

Оценка по экстерьеру и конституции. Экстерьер и конституция являются необходимыми элементами комплексной оценки сельскохозяйственных животных, так как между формой и функцией существует неразрывная связь. Внешние формы животного (экстерьер) дают представление об анатомо-морфологической структуре организма, которая обуславливает физиологические особенности животного, определяющие направление и в известной мере уровень продуктивности.

Несовершенство экстерьерных шкал явилось причиной больших различий в оценке роли экстерьера в селекции животных по продуктивным качествам. Известно, что отбор животных только по продуктивности приводит к появлению серьезных экстерьерных дефектов и резкому ослаблению конституции. Поэтому для обеспечения возрастания из поколения в поколение продуктивности наряду с отбором животных по этому главному качеству необходимо постоянно вести корректирующий отбор и по конституциальному типу.

По экстерьеру и конституции судят о выраженности у животного признаков породы, гармоничности развития и соответствия конституционального типа направлению продуктивности с учетом породных особенностей, о здоровье животного и отсутствии или наличии у него экстерьерных недостатков, препятствующих нормальной

физиологической деятельности. В нашей стране принята балльная оценка экстерьера животных. Число баллов зависит от вида и назначения животных. Например, 50 % баллов при оценке молочных и молочно-мясных пород скота отводится на развитие и форму вымени.

Производителям при оценке по экстерьеру предъявляют более жесткие требования, чем маточному поголовью. Во многих странах мира с развитым животноводством улучшение популяции по экстерьеру осуществляется главным образом путем племенного использования производителей с отличным телосложением.

В связи с переводом молочного скотоводства на промышленную основу важное значение приобрела фенотипическая оценка коров **на пригодность к машинному доению**.

Наши исследования показали, что примерно 40 %, первотелок непригодны к использованию в условиях промышленной особенностью вымени, общей выраженнойностью молочного типа коров и их фактической молочной продуктивностью также имеется положительная корреляция. Следовательно, улучшение качества вымени коров и повышение его пригодности к машинному доению способствует увеличению молочной продуктивности.

В заключение необходимо отметить, что каждой породе сельскохозяйственных животных присущи свои экстерьерно-конституциональные особенности. При широком ареале пород в различных природных и экономических зонах складываются свои внутрипородные типы. Для правильной оценки и отбора животных по экстерьеру селекционер должен знать и породный стандарт, и складывающиеся в породе зональные различия в типе, и направление дальнейшей племенной работы по совершенствованию породы.

Оценка по интерьеру. Наряду с экстерьером и конституцией важное значение при оценке и отборе животных по фенотипу имеет интерьер. В последние годы наряду с традиционными интерьерными признаками стали учитывать биохимические показатели крови, так как была установлена их связь с показателями продуктивности.

Интерьер животных — это совокупность внутренних морфо-физиологических и биохимических особенностей организма, связанных с продуктивными качествами животных. Оценка интерьера животных имеет большое значение в прогнозировании продуктивных и племенных качеств животных в раннем возрасте и повышении эффективности селекционно-племенной работы.

Для ускоренной оценки животных по молочной продуктивности на основе биохимических показателей крови необходимо знать взаимосвязь этих показателей в раннем возрасте с молочной продуктивностью в 1-ю и последующие лактации. В последнее десятилетие этой проблеме уделяется большое внимание. Изучались метаболиты крови, характеризующиеся высокой корреляцией с надоем, содержанием жира и белка в молоке коров. В качестве теста будущей белковомолочности коров предложено использовать содержание аминоазота в крови телок (М. Д. Гельберт, 1974). Установлено, что повышенное его содержание в возрасте 7—8 и 11—12 мес связано с повышенной белковомолочностью за 1-ю лактацию.

Как отмечают Г. А. Бондаренко с соавторами (1976), возможность ускоренной оценки белковомолочности значительно усложняется из-за малой изученности связей метаболитов крови с содержанием белка в молоке. Однако выявлено, что между содержанием в крови телок различного возраста метаболитов липидно-углеводного обмена (триглицеридов, фосфолипидов, холестерина, β -липопротеидов, общих липидов, уксусной кислоты, β -оксимасляной кислоты, ацетона, ацетоуксусной

Оценка и отбор по генотипу (индивидуальный).

Для повышения наследуемости признака большое значение имеет оценка животных по генотипу. Проблема выявления генотипа и зависимости между фено- и генотипом

животных — один из основных вопросов современной селекции. Оценку по генотипу проводят по происхождению, боковым родственникам и качеству потомства.

Оценка по происхождению. Сельскохозяйственных животных по происхождению оценивают на основании данных родословной. Родословная — схематическое расположение всех известных предков изучаемого животного на протяжении нескольких поколений. Родословная служит первым источником информации о возможной племенной ценности животного.

Однако племенные качества животного на основе фенотипа предков можно оценить лишь приблизительно, так как большинство селекционируемых признаков имеет невысокую наследуемость и, кроме того, существует большое число возможных комбинаций генов. Даже в том случае, если коэффициент наследуемости признака равен 1, лишь 25 % изменчивости признака у потомства определяется каждым родителем, а 50 % — вызвано новыми комбинациями генов. Сложность оценки по родословной заключается и в том, что большинство признаков ограничено полом.

В племенные карточки может быть занесена информация по 4 генерациям предков (данные 30 животных). Следовательно, возникают бесконечные возможности комбинаций информации в зависимости от пола, места предка в родословной, возраста и т. д. Поэтому важно установить значимость информации, полученной из различных генераций родословной, чтобы рассчитанный индекс максимально коррелировал с племенной ценностью отобранного животного.

При отборе по происхождению надо учитывать и то, что значение информации для каждого последующего поколения по сравнению с предыдущим уменьшается в 2 раза и что пробанд получает половину генов от отца и половину от матери, поэтому необходимо учитывать две стороны родословной — мужскую и женскую. Однако предки разного пола содержат разную информацию, и, следовательно, они, даже находясь в одном поколении, вносят неодинаковый вклад в племенные качества животного. Значит относительная ценность информации зависит от очень многих факторов.

Оценка молодняка по происхождению почти полностью предопределяет дальнейшее назначение животного и схему выращивания. Лишь после перевода в основное стадо в эту оценку вносятся коррективы в зависимости от оценки по фенотипу и по потомству. Родословная служит основанием предварительного отбора племенных производителей.

Полнота родословной, расширяя возможности анализа, не упрощает его. Разворнутая родословная, вскрывая вероятные источники формирования генотипа потомка, сама ставит ряд вопросов, разрешить может которые лишь дальнейшая работа селекционера.

Оценка генотипа по сибсам. Для ускоренной и более объективной оценки пробанда в практике животноводства используют информацию по сибсам и полусибсам. Считается, что оценка генотипа животного по полусибсам более эффективна, чем по продуктивным качествам ближайших прямых предков. Это положение подтверждают данные Ф. Ф. Эйснера, который установил, что корреляция между оценкой по полусестрам и последующей оценкой тех же производителей по качеству потомства была более высокой (0,5—0,6), чем корреляция, обычно наблюдаемая между оценкой по качеству потомства и продуктивностью женских предков (0,15—0,20).

Если у оцениваемого производителя есть полусестры или полубратья, продуктивность которых учтена, то это означает, что их общий отец оценен по качеству потомства. Следовательно, оценка отца по качеству потомства представляет собой одновременно оценку любого из его сыновей по полусибсам. Этим и объясняется более высокая эффективность отбора животного по полусибсам, ибо в дополнение к обычной родословной, кроме фенотипической оценки предков, в ней существует генотипическая оценка ближайшего мужского предка отцу, Оценку племенной ценности пробанда по продуктивности повышению с увеличением числа полных сибсов и уровня

наследуемости селекционируемого признака.

Следовательно, для точной и быстрой оценки и отбора животных может применяться комбинированная селекция.

Комбинированная селекция — метод отбора, при котором в селекционный критерий включают показатели собственной продуктивности животного и продуктивности родственников. Данные о племенной ценности животного по продуктивности предков и полусибсов являются единственной информацией о генотипе пробанда до проявления его собственной продуктивности или получения дочерей. В птицеводстве и свиноводстве применяется **семейная селекция** — отбор животных, при котором в качестве критерия служит среднее значение селекционируемого признака в семье (полные сестры и полусестры). Эффективность семейного отбора определяется главным образом наследуемостью селекционируемого признака и размером семьи. **Семья** — группа животных, связанных друг с другом родством. В большинстве случаев коэффициент родства в семье варьирует в пределах 0,25-0,50. Как правило семья состоит из полных сибсов и полусибсов.

Семейный отбор. На основании среднего значения признака по семейству отбирают или выбраковывают целые семьи. При этом внутрисемейным отклонениям придается нулевой вес. Семейный отбор предпочтителен при низкой наследуемости признака. Если число членов в семействах достаточно велико, то среднее значение признака по ним более точно соответствует генотипическим значениям. При селекции, например, на устойчивость к лейкозу семейства с высокой частотой заболеваемости должны полностью выбраковываться.

Таким образом, семейному отбору нужно отдавать предпочтение в следующих случаях: 1) при низкой наследуемости признака; 2) при наличии больших семейств; 3) при низкой изменчивости, обусловленной общей для семейства средой. Его эффективность возрастает при высокой степени родства между членами семейства.

Внутрисемейный отбор. Животных отбирают на основании отклонения каждой особи от среднего значения признака по семейству. Особи, которые по селекционируемому признаку превосходят среднее значение для семьи, отбирают на племя. Чем больше величина компоненты средовой изменчивости общей для семейства, тем предпочтительнее использовать этот метод отбора. Например, в значительной части изменчивость предотъемной массы поросят определяется матерью и является общей для всех членов семьи. Поэтому различия по живой массе между поросятами одной семьи в значительной степени определяются их генотипами.

Оценка по качеству потомства. Этот метод широко используется в животноводстве. Критерий отбора особей (производителей и т. д.) — среднее значение признака их потомства.

Стабилизирующий отбор — характеризуется тем, что при благоприятных на протяжении ряда поколений внешних условиях формируются наиболее приспособленные фенотипы, и популяция достигает высокого уровня приспособленности. При этом наступает стабилизация генетической изменчивости и частоты генов приобретают равновесное состояние. Продолжающийся далее отбор стабилизирует структуру популяции. Стабилизирующий отбор способствует сохранению особей с количественными признаками, близкими к среднему значению, и устраняет особей, сильно уклоняющихся от среднего в ту или другую сторону. Что касается альтернативного признака, контролируемого аллелями одного локуса, то стабилизирующий отбор способствует удержанию частот аллелей этого локуса вблизи равновесного значения.

Направляющий отбор — возникает при смене условий среды. В результате этого стабилизация генетической изменчивости нарушается и в популяции повышается численность особей, приближающаяся по количественному признаку к максимальным

или минимальным его значениям. Отбор при этом благоприятствует тем особям, у которых появляется приспособленность к новым (положительным или отрицательным) условиям. В результате направленного отбора происходит постепенный сдвиг среднего значения отбираемого признака в сторону его увеличения или снижения. При искусственном направленном отборе это смещение соответствует целям селекции. Фенотипическая и генотипическая изменчивость уменьшается.

Дизруптивный отбор – благоприятствует нескольким различным фенотипам в популяции, в результате чего устраняются промежуточные формы и образуются популяционные группы, различающиеся между собой по генотипам и фенотипам. Дизруптивный отбор может привести к созданию в популяции полиморфизма, появлению дивергенции и изоляции.

Уравновешивающий отбор – может быть направлен на аллель, что приводит популяцию в состояние равновесия по аллелям данного локуса. Такой отбор на различных стадиях развития может разнонаправлено влиять на аллель: благоприятствовать сохранению аллеля на одной стадии и, наоборот, не благоприятствовать на другой. По-разному он может влиять на аллели, носителями которых являются исходные родительские формы.

В значительной степени эффект отбора зависит от влияния среды. В одних условиях отбор сохраняет в популяции данный аллель, а в других устраниет его. Отбор благоприятствует сохранению редких аллелей и препятствует сохранению аллеля, концентрация которого в популяции высока. Уравновешивающий отбор создает сбалансированный **генетический груз**, действуя на один и тот же аллель неодинаково на разных этапах развития и организмов разного пола, а также в несходных условиях среды.

Эффект селекции в значительной степени зависит от числа признаков, по которым ведется отбор. Различают односторонний и комплексный отбор.

При **одностороннем отборе** селекцию ведут по одному основному продуктивному признаку, а при **комплексном** – по ряду признаков.

Практика показывает, что чем меньше признаков учитывается при отборе, тем быстрее при прочих равных условиях достигается **селекционная граница**, т.е. минимальные фенотипические требования развития селекционируемого признака, или нижний уровень отбора. Однако отбор по ограниченному числу признаков, например, только по экsterьеру или только одному из продуктивных признаков, может привести к нарушению равновесия популяции в отношении взаимодействия между генотипом животного и окружающей средой. В конечном итоге односторонний отбор приводит к **селекционной депрессии**:

- снижению жизнеспособности животных;
- снижению многоплодия и других жизненно важных свойств;
- плохо развиваются;
- проявляют низкую резистентность к неблагоприятным условиям среды и болезням.

Чтобы избежать селекционной депрессии при одностороннем отборе, оценку животных проводят по комплексу признаков. В последнее время число признаков, учитываемых при оценке животных, возрастает в связи с изменением технологии ведения животноводства.

Поэтому для отбора необходимо определить главные селекционируемые признаки.

Комплексная оценка не должна включать большое число признаков в качестве главных и механически уравнивать их значимость. Принцип всесторонней оценки по комплексу признаков требует выявление главных желательных качеств для более быстрого их совершенствования и консолидации путем отбора. Одновременно с этим при оценке необходимо учитывать и другие признаки, но уже в качестве дополняющих, помогающих избежать нежелательных последствий одностороннего отбора, исправить

имеющиеся в популяции или породе недостатки и обеспечивать относительно гармоничное развитие и жизнеспособность племенных животных.

Различают три основных метода отбора по комплексу признаков.

Метод ступенчатой (тандемной) селекции

Тандемная селекция заключается в отборе племенных животных, который проводят в два этапа и более. Сначала селекцию проводят по одному признаку. После достижения удовлетворительного уровня развития первого признака начинают отбор по другому и так далее до тех пор, пока не будут учтены все включенные в программу селекции признаки. Затем снова ведут отбор по первому признаку и т. д. Такой метод селекции часто применяется при отборе племенных производителей. Отбор, например, среди молодых быков проводится на первом этапе по родословной, затем по собственному фенотипу и, наконец,— на основе оценки качества потомства. Эффективность селекции последующих этапов отбора зависит от интенсивности отбора в предыдущих и корреляции критериев селекции между смежными ступенями. В большинстве случаев тандемная селекция ограничивается двумя или тремя ступенями.

Однако такой отбор требует много времени и, кроме того, предполагает, что между отдельными постепенно улучшенными признаками не существует зависимости. Теоретически ожидаемый селекционный эффект при тандемной селекции трудно реализовать на практике, потому что между признаками существует как положительная, так и отрицательная зависимость, в результате чего улучшение одного признака часто влечет за собой снижение другого.

3. Организация и принципы бонитировки у разных видов сельскохозяйственных животных

Метод селекции по независимым границам (уровням)

При селекции **по независимым границам** устанавливают минимальные фенотипические требования для каждого селекционного признака (стандарта), вследствие чего все животные, имеющие показатели ниже этих требований, исключаются из дальнейшего разведения. К дальнейшему воспроизводству не допускаются и такие животные, которые не соответствуют установленным лимитам хотя бы по одному, даже не селекционируемому признаку. Данный метод широко применяется в животноводстве, особенно когда отбор ведется по двум и более признакам. Этот метод более эффективен, чем тандемная селекция.

Метод селекции по зависимым уровням (селекционным индексам)

При этом методе отбор животных ведется на основе селекционного индекса.

Селекционный индекс — показатель племенной ценности животного, основанный на учете нескольких показателей хозяйственных и биологических признаков. т.е. **Индекс** — оптимальный линейный прогноз индивидуальной селекционной ценности и множественная регрессия этой ценности на все используемые данные.

Селекционный индекс включает информацию о нескольких признаках, по которым ведется отбор, каждой особи. По индексу можно предсказать селекционную ценность каждой особи не по одному, а по комплексу отдельных признаков. Для построения индекса нужно определить относительный вес каждого селекционируемого признака, изучить наследуемость, генотипические и фенотипические корреляции между признаками, выбрать оптимальное число (обычно 4—6) наиболее важных признаков с учетом их экономической важности.

Примером селекции по зависимым уровням отбора является бонитировка животных по общей сумме баллов, на основании которой определяется классность животных. Однако способы балльной оценки хотя и просты, но не всегда точны и дифференцированы в зависимости от племенной ценности, так как при бонитировке не учитывается генетическая характеристика животного.

Селекционный индекс учитывает и генетические признаки. Число селекционируемых признаков, включаемых в общий индекс, может быть различным. При этом прогресс по одним признакам может сдерживаться, а по другим усиливаться. Таким образом создается новая система генов, которая обеспечивает лучшую комбинацию признаков.

Селекционный индекс может быть использован для решения ряда задач:

- 1) при отборе по одному признаку селекционный индекс, содержащий данные о животном, его родственниках и потомках, позволяет повысить точность оценки наследственных качеств животного, особенно по признакам с низкой наследуемостью;
- 2) при отборе преимущественно по одному признаку индекс, включая данные о других признаках, позволяет более объективно выявить наследственную ценность животного;
- 3) при отборе по одному признаку иногда возникают нежелательные изменения других признаков. Правильно сконструированный индекс позволяет улучшить этот признак при слабом изменении других признаков;
- 4) индекс позволяет одновременно улучшить несколько признаков.

Эффективность селекции зависит от числа отбираемых признаков. При отборе по n независимым признакам с одинаковой наследуемостью и изменчивостью селекционный ответ будет по каждому из них в $1/n$ раз меньше того эффекта, который мог быть получен при отборе по одному признаку. Если использовать в такой ситуации селекционный индекс, то эффект селекции будет в \sqrt{n} раз больше, чем при использовании тандемного отбора. При отборе по независимым уровням интенсивность селекции уменьшается с увеличением числа признаков. Следовательно, интенсивность селекции равна коэффициенту — , где n — число селекционируемых признаков; p — доля оставляемых на племя животных. Из всех трех методов отбора наиболее эффективен отбор по селекционным индексам. Его эффективность в сравнении с другими методами возрастает с увеличением числа отбираемых признаков.

В ФРГ при селекции англерского скота в селекционный индекс включают 14 признаков. В Канаде при оценке генотипа быков и коров голштинской породы учитывают 26 главных и второстепенных признаков, а также около 60 различных дефектов. При этом селекционеры считают, что один из главных показателей — продолжительность срока испытания коров.

1.3 Лекция 3 (Л-3) Подбор и его использование в племенной работе. (в интерактивной форме)

1.3.1 Вопросы лекции:

1. Понятие о подборе.
2. Методы племенной работы по созданию новых пород и улучшению существующих. (Методы использующие аддитивный эффект генов).
3. Методы использующие эффект гетерозиса.
4. Методы создания синтетических гибридов.

1.3.2 Краткое содержание вопросов:

1. Понятие о подборе.

Отбор животных логически переходит в другую стадию селекции — подбор — целеустремленную систему спаривания животных, соответствующую определенному направлению селекционно-племенной работы. Он складывается из следующих элементов: группировки отобранных маток в связи с их племенной ценностью и составления заказа на племенного производителя. Необходимо спланировать, какие признаки маток следует улучшить, сохранить или поглотить.

По форме практического осуществления подбор может быть индивидуальным и групповым, а по типу — однородным и разнородным.

Индивидуальный подбор. При индивидуальном подборе решается вопрос, каким из имеющихся в хозяйстве или на племенном предприятии производителем осеменить ту

или иную матку, что-бы получить потомство наилучшего качества. При этом всесторонне учитывают количественные и качественные показатели продуктивности матки, ее конституцию, экстерьер, происхождение и другие признаки, а также сочетаемость всех этих особенностей с качеством производителя. Анализ происхождения матки и производителя и знание результатов подбора прошлых лет позволяют лучшим образом использовать при подборе генеалогическую сочетаемость.

Индивидуальный подбор обеспечивает наиболее эффективное развитие наследственных качеств потомства от умело подобранных родителей, и, как правило, при индивидуальном подборе получают ценное потомство. Но он отличается большой сложностью, требует ведения систематического учета всех индивидуальных качеств значительного числа производителей. Поэтому индивидуальный подбор как основной используют в племенных хозяйствах. Но и в товарных хозяйствах следует по отношению к отдельным наиболее ценным по продуктивности и племенным качествам маткам применять индивидуальный подбор, например для закладки и дальнейшего совершенствования семейств.

Степень использования индивидуального подбора при разведении животных разных видов неодинакова. Его применяют в основном при совершенствовании пород крупного рогатого скота и лошадей.

Групповой подбор. Суть его состоит в том, что к группе маток, относительно сходных по общим или отдельным особенностям, подбирают одного или двух производителей определенного качества и происхождения. Например, в табунном коневодстве в косяк маток пускают племенного жеребца, где он находится в течение всего случного периода. К отаре маток подбирают племенного барана соответствующего класса с расчетом получения потомства желательного качества. В овцеводстве групповой подбор называют классным. В молочном и молочно-мясном скотоводстве за всем стадом фермы закрепляют 1—2 производителей, находящихся на племенном предприятии. В птицеводстве используют семено-групповой подбор, когда за группой кур закрепляют несколько петухов-сибсов.

В условиях массового применения искусственного осеменения животных групповой подбор является основным для товарного животноводства. В племенных и товарных хозяйствах при работе с родственными группами (линиями, семействами) наряду с индивидуальными особенностями животных учитывают при подборе групповое, генеалогическое сходство и осуществляют групповой (линейный) подбор. В связи с этим Н. А. Кравченко не без основания предлагает пользоваться термином «индивидуально-групповой подбор».

В начале XIX в. были определены два основных типа подбора: однородный и разнородный.

Гомогенный (однородный) подбор. Суть его заключается в том, что матки и подбираемые к ним производители относительно Водны по главным признакам подбора. Цель гомогенного подбора — усилить или закрепить у потомков ценные качества. Например, за отарой овец тонкорунной породы закреплен племенной баран той же породы. Цель такого закрепления — удержать на определенном уровне селекционный признак — тонину шерсти. Подбор такого типа не только стабилизирует нужные признаки стаде, но и увеличивает в каждом последующем поколении однородность животных по выраженности желательных продуктивных качеств, а также повышает наследуемость, улучшая, следовательно, племенные достоинства их. Такой подбор чаще обеспечивает получение препотентных животных. Значимость гомогенною подбора для совершенствования каждого стала и породы особенно раскрывается в работах П. Н. Кулешова, который писал, что при мим способе скотоводчик не только может сохранить качества наилучших животных, но и имеет шансы получить потомство с большей производительностью, чем у родителей, или потомство с более высоким

заводским достоинством.

Степень сходства между подобранными друг к другу животными может быть различной. Чем она больше, тем в значительной мере оказывается консолидирующее действие гомогенного подбора и выше степень наследования признаков. Недостаток этого типа подбора при длительном применении — нарастание гомозиготности, сужение изменчивости, снижение продуктивности, резистентности и т. д.

Крайним вариантом гомогенного подбора является родственное разведение (инбридинг).

Гетерогенный (разнородный) подбор. Его суть состоит в том, что спариваемые животные заведомо различаются по признакам подбора. Цель гетерогенного подбора — увеличение изменчивости признаков, повышение продуктивности, резистентности, репродуктивных качеств, поглощение недостатков, имеющихся у отдельных животных или групп. Основными признаками подбора служат продуктивные качества животных и связанные с ними экстерьерно-конституциональные особенности, а также породность и происхождение. Кроме того, спариваемые животные могут раз начаться по возрасту.

Степень гетерогенности может быть неодинаковой. Различаясь по одному или нескольким признакам, животные могут быть сходны по другим. Поэтому понятие однородности и разнородности подбора относительно. Например, по одному признаку подбор будет гомогенным, а по другому — гетерогенным. Если стадо коров имеет удой 4500 кг за год и массовую долю жира 3,7 % и за них закреплен племенной бык той же породы с генетическим потенциалом но удою 9000 кг и массовой долей жира 3,8 %, то по удою подбор будет гетерогенный, а по содержанию жира в молоке - гомогенный.

Использование гетерогенного подбора дает возможность получить потомство, в котором удачное сочетание наследственности одного и другого родителя обуславливает развитие наиболее желательных качеств. Такое потомство обладает обогащенной наследственностью. Оно в массе своей характеризуется меньшей однородностью, чем при гомогенном подборе, а повышенная изменчивость лает более богатый материал для отбора.

Степень изменчивости потомства при гетерогенном подборе зависит не столько от величины различий между показателями спариваемых животных, сколько от того, как показатели каждого из родителей отличаются от средних по стаду. Наиболее сильно повышается изменчивость и снижается корреляция между продуктивностью матерей и их дочерей в том случае, если показатели родителей уклоняются в разные стороны от средних но стаду.

Гетерогенный подбор используют и для того, чтобы недостатки, свойственные одному из родителей, не повторялись у потомков. Подбор, преследующий такую цель, называют корректирующим (исправляющим, улучшающим). При этом следует помнить, что один недостаток или порок невозможно исправить подбором такого производителя, который имеет диаметрально противоположный недостаток. Например, к быстроаллюрном коневодстве такой недостаток у маток, как размет конечностей, нельзя исправить, подбрав к ним «косолапых» жеребцов. Не улучшить у потомства и экстерьерно-конституциональные формы, если к маткам с нежной переразвитой конституцией, имеющим запавшую поясницу, подбирать производителей с грубой конституцией, карпообразной спиной и поясницей. Нельзя также к животным, имеющим один недостаток, подбирать для его исправления производителя, улучшающего этот признак, но обладающего другим недостатком. Например, к корове, характеризующейся высокими удоями, но низким содержанием жира в молоке, не следует подбирать производителя, который оценен по качеству потомства как улучшатель жирномолочности, но ухудшатель обильномолочности. Это приведет к потере желательного хозяйствственно полезного признака, которым обладает корова.

При гетерогенном подборе чаще всего проявляется гетерозис. Крайние формы гетерогенного подбора — скрещивание и гибридизация.

В практике селекционно-племенной работы выделяют возрастной подбор. В животноводстве при подборе пар необходимо учитывать возраст родителей, так как от очень молодых и очень старых животных получают потомство низкого качества. Обусловлено это неполной зрелостью, развитием организма молодых животных и увяданием функций строго организма. Потомство лучшего качества получают в том случае, если оба родителя полновозрастные и находятся в расцвете функциональных возможностей организма. Рекомендуется к молодым маткам и маткам старшего возраста подбирать производителей среднего возраста.

2. Методы племенной работы по созданию новых пород и улучшению существующих. (Методы использующие аддитивный эффект генов).

Используемые методы подбора можно разделить на 3 группы: 1. - использующие аддитивный эффект генов; 2 -эффект гетерозиса; 3 - методы создания синтетических гибридов, когда используется аддитивный эффект по одним генам и одновременно при скрещивании у потомков стремятся получить эффект гетерозиса по другим генам (см. схему 1).

Методы подбора, использующие аддитивный эффект генов.

Линейное разведение

Цель линейного разведения - максимальное сохранение генетического сходства с выдающимся родоначальником. При этом применяются те или иные методы родственного спаривания, у сельскохозяйственных животных чаще умеренного. При линейном разведении применяется комбинация отбора и инбридинга, когда отбор проводится по предку, а инбридинг ведется на него.

Без тесного инбридинга сходство потомков с основателем линии будет в поколениях снижаться. Кроме того, генетическая изменчивость в линии ниже, чем в популяции. Значит и возможности отбора в линии ниже, чем в популяции. Последнее означает, что в линии в сравнении со всем массивом племенных животных уровень продуктивности будет расти медленнее. Целесообразно отбор в пределах линии (отбор потомков по предку) вести в 1,2 поколениях. Затем следует выбирать основателей линий из животных следующих поколений отбора, т.е. имеющих племенную ценность выше, чем у основателей старых линий. Если таких выдающихся продолжателей в линии не выявляется, то работа ведется с другими линиями.

Иногда практикуется формальное отнесение животных к линии по наличию в правой части родословной (с отцовской стороны) в любом поколении производителя - основателя линии. Это не отражает ни сходства генотипов, ни степень сходства племенной ценности предка и потомка.

Вводное скрещивание

Целью вводного скрещивания является улучшение существующей породы по отдельным признакам при сохранении основных особенностей породы. Как правило, проводится однократное скрещивание с улучшающей породой. Затем в течение 2-3 поколений помесей скрещивают с особями основной породы. Среди помесей с 25-12,5% генов улучшающей породы ведут отбор

Вначале скрещивают маток местной породы с производителями улучшающей породы. У помесей I поколения в результате такого однократного прилития крови удается заметно усилить требуемое качество (на уровне промежуточного наследования), но при этом в той же степени изменяются другие признаки и тип улучшаемой породы. Полукровок по породности относят к улучшаемой породе, но для этого долю ее крови у помесей необходимо увеличить. Это достигается путем обычно двукратного, иногда трехкратного скрещивания помесей с производителями улучшаемой (материнской) породы. В результате доля крови улучшаемой породы возрастает до $\frac{7}{8}$ — $\frac{15}{16}$ и соответственно восстанавливаются ее основные породные свойства. В дальнейшем

помесей, имеющих преобладающую долю наследственности местной породы, но сохранивших 1/8—1/16 крови улучшающей породы, разводят «в себе».

Поглотительное (преобразовательное) скрещивание

Целью поглотительного скрещивания является полное преобразование разводимой породы, когда она не отвечает поставленным требованиям. После 4—5 поколений скрещивания с улучшающей породой помеси начинают разводить как единый массив с ней. Конечно, в качестве представителей улучшающей породы используют преимущественно самцов, т.к. их требуется в десятки, а при искусственном осеменении в тысячи раз меньше. Это длительный, растягивающийся на многие годы процесс. Иногда постепенное изменение породы за счет, мигрантов дает возможность улучшать условия содержания и кормления на соответствующие требованиям улучшающей породы.

1. Уже среди помесей I поколения можно выделить немало животных, в большой степени унаследовавших признаки улучшающей породы.

2. Во II генерации число животных, сходных по типу с улучшающей породой, составляет значительный процент, хотя это зависит и от того, насколько стойко некоторые признаки аборигенных животных сохраняются в потомстве.

3. В III поколении в условиях хорошего кормления средняя продуктивность помесей обычно близка или практически совпадает с аналогичными показателями улучшающей породы. В результате поглотительного скрещивания признаки местных животных постепенно заменяются более ценными качествами улучшающей породы.

4. В IV поколении обычно помеси приобретают большое сходство с чистопородными животными. Если они по типу телосложения и уровню продуктивности отвечают стандарту улучшающей породы, то помесей V поколения относят к чистопородным.

Воспроизводительное скрещивание

Целью воспроизводительного скрещивания является создание новых пород на основе объединения и совершенствования качеств выбранных для скрещивания пород. Основные этапы этой работы: установление требуемого эталона, выбор исходных пород для скрещивания, размножение особей желательного типа и дальнейший отбор среди них. Этот метод применяют для выведения новой породы из двух или нескольких пород. В зависимости от числа участвующих пород при скрещивании различают простое воспроизводительное скрещивание (две породы) и сложное (три и более). Для скрещивания подбирают породы как мало, так и сильно отличающиеся между собой. Чем больше сходство между породами, тем быстрее достигается желаемый результат и наоборот. Необходимость в заводском скрещивании возникает в тех случаях, когда разводимая в зоне порода не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ней, а имеющиеся заводские породы, отвечающие желательному стандарту по хозяйственным качествам, плохо приспособлены к местным условиям. Среди помесей I, II и III поколений отбирают лучших животных и разводят «в себе».

Воспроизводительное скрещивание условно можно разделить на следующие этапы:

1. селекционный поиск или создание животных желательного типа;
2. закрепление желательного типа в потомстве путем применения родственного спаривания
3. разведение помесей «в себе»;
4. создание структуры породы (закладка неродственных линий и семейств)
5. представление породы к апробации;
6. обоснование зоны ее разведения

Создается новая группа мясных животных по трем основным схемам

Первая схема предусматривает получение помесей (миргородская порода × пьетрен) с последующим скрещиванием их с хряками породы ландрас. По второй схеме получают трехпородных помесей (миргородская × ландрас × пьетрен) и разводят их «в себе», а также скрещивают свиноматок этого сочетания с трехпородными хряками (миргородская × уэссексэдлбен × ландрас).

Третьей схемой предусматривается использовать маток крупной белой породы в скрещиваниях с хряками пьетрен и ландрас. Для обогащения генетической структуры полученных помесей дополнительно участвовали помесные хряки миргородская × уэссекс × пьетрен и миргородская × пьетрен × крупная белая, а также помесные матки сочетания крупная белая × ландрас. Эти сочетания пород являются основными при дальнейшем совершенствовании животных желательного типа и создании группы модельных животных.

3. Методы использующие эффект гетерозиса.

Методы подбора, использующие эффект гетерозиса у потомков

Для методов разведения, относящихся к этой группе, характерно одновременное разведение нескольких инбридных линий, заводских линий, замкнутых популяций, пород, которые затем - скрещиваются для получения гибридов I поколения. В этом случае в родительском поколении лучшими считаются не те особи, которые имеют самую высокую продуктивность, а те, кто дает высокопродуктивных потомков. Например, для получения кросса яичных кур × айсекс белый используется линия с продуктивностью 214 яиц на несушку. 4-линейные несушки данного кросса имеют годовую яйценоскость около 300 яиц.

Простое промышленное скрещивание

Представители двух пород скрещиваются для получения пользовательных животных, F 1 не используется в дальнейшем разведении.

Характерные примеры скрещивания двух видов для получения пользовательных животных. Лошадь скрещивают с ослом для получения сильных рабочих мулов. Яка скрещивают с крупным рогатым скотом для получения рабочих и молочных животных.

Простое промышленное скрещивание широко используется при разведении скота некрупных мясных пород (казахская белоголовая, абердин-ангус, герефорд, калмыцкая) в ряде стран. При этом повышается выход телят и их сохранность. Аналогичный эффект наблюдается при скрещивании пород и внутрипородных типов свиней.

Переменное скрещивание

Помесные самки F1 силу гетерозисного эффекта обладают лучшими воспроизводительными способностями по сравнению с чистопородными. В связи с этим их целесообразно использовать для дальнейшего скрещивания. При переменном скрещивании самок F1 скрещивают с самцом одной из исходных пород. Полученных таким путем самок скрещивают с самцом другой - исходной породы.

Переменное скрещивание также используется преимущественно в мясном скотоводстве и свиноводстве.

Ротационное скрещивание

В настоящее время в свиноводстве, в мясном скотоводстве чаще самок F1 от скрещивания 2-х пород скрещивают с самцом 3-й породы. Полученных таким путем самок второго поколения скрещивания покрывают самцом четвертой породы. Таким путем, поддерживая высокую гетерозиготность самок, стремятся от них получить и гетерозиготное потомство.

При ротационном скрещивании обычно спаривают помесных самок с чистопородными самцами. Но оказалось, что в ряде случаев целесообразно использовать помесных самцов. Помесный хряк как производитель работает на 30% дольше, может

покрыть за тот же срок на 10% больше самок, оплодотворяемость свиноматок повышается в 1-ю охоту на 7-8%.

Периодическая селекция и периодическая реципрокная (повторная) селекция

При ведении периодической селекции применяется подбор с одновременным отбором на специфическую племенную ценность. Особи испытываемой линии (реже породы) скрещиваются с контрольной линией - пинией-тестером (реже породой). В качестве родителей следующего поколения отбирают только тех индивидуумов, чье потомство показало наивысший гетерозисный эффект, т.е. оценку особей линии проводят по уровню гетерозиса, проявляемого потомством

В первых поколениях это может дать заметный эффект, но комбинационная ценность линии-тестера ограничена. Для повышения эффективности отбора по результатам скрещивания был предложен метод периодической реципрокной селекции. При этом отбор особей повторного скрещивания ведется во всех линиях. После отбора в скрещивающихся линиях используются особи, показавшие наивысшую комбинационную способность.

При этом в каждой линии происходит гомоготизация, возрастает различие генных концентраций, что и является предпосылкой для увеличения гетерозисного

При периодической селекции и при реципрокной пециодической селекции отбор на гомозиготность в линиях ведется только по признакам, проявляющим гетерозис. По остальным признакам гомоготизация может идти более медленно.

Вследствие того, что в испытание вовлекаются несколько линий, методы периодической и периодической реципрокной селекции преимущественно могут быть использованы в птицеводстве. Здесь стоимость каждой особи низка, а цена создания линий приемлема. Реже эти методы применяются при разведении свиней.

Скрещивание инbredных линий

Скрещивание инbredных линий проводится для получения максимального эффекта гетерозиса. Выявить его можно только при испытании многих инbredных линий. По сравнению с реципрокной периодической селекцией гомоготизация в линиях идет интенсивнее за счет близкородственных спариваний. Инbredная депрессия в линиях проявляется в большей степени. Но по сравнению с той же реципрокной периодической селекцией, гетерозисный эффект выше. Кроме того, и гетерозисный эффект и экономические результаты можно повысить по схеме 4-линейного скрещивания (*Fimn×Fief*).

4. Методы создания синтетических гибридов .

Для получения синтетических гибридов специализированные линии или породы, интенсивно селекционированные по многим аддитивно наследующимся признакам, скрещивают между собой для получения эффекта гетерозиса у потомков I поколения. Причем пользовательная ценность гибридов I поколения высока не только из-за проявления эффекта гетерозиса, но из-за достаточно высокого развития многих аддитивно наследующихся признаков. Обычно синтетические гибриды имеют промежуточное проявление этих признаков. При скрещивании проявляется гетерозисный эффект по дензакам плодовитости, жизнеспособности, продолжительности продуктивной жизни.

Породы или линии, используемые в скрещиваниях, в отличие от инbredных линий не испытывают негативного влияния инbredной депрессии. Они интенсивно селекционируются по основным признакам.

Часто породы и линии, используемые для получения синтетических гибридов, подразделяются на материнские и отцовские. В материнских линиях отбор направлен на повышение плодовитости, приспособленности, во вторую очередь он ведется по другим признакам. Иногда материнские - это линии и породы, приспособленные к суровым условиям содержания.

Межвидовое скрещивание (гибридизация)

Гибридизация — это скрещивание животных разных видов для получения пользовательных животных и создания новых пород. По высказыванию Н. В. Цицина, отдаленная гибридизация позволяет сочетать ценные свойства и признаки, далеко разобщенные в ходе многовековой эволюции, и создать огромное, ни с каким другим скрещиванием несравнимое, новое разнообразие гибридных потомков, представляющее собой колossalный материал для применения искусственного отбора.

В нашей стране работы по гибридизации животных были начаты М. Ф. Ивановым в Аскании-Нова (скрещивание муфлонов с мериносами). Им были разработаны основные положения методики выведения новых пород с применением межвидовой гибридизации сельскохозяйственных и диких животных. (Этот прием обогащает генотип домашних животных генными комплексами, связанными с развитием признаков, утерянных или резко ослабленных в процессе одомашнивания и искусственного отбора. Гибриды обладают более высокой продуктивностью и устойчивее к неблагоприятным факторам внешней среды. Следовательно, гибридизация позволяет дополнительно вовлекать в сферу материального использования ценные дикие и полудикие виды животных. Однако имеются трудности широкого использования гибридизации при создании пород из-за двух основных причин: нескрещиваемости отдаленных видов животных между собой и частичной или полной бесплодности гибридов (обоих или одного пола) I поколения. Это объясняется различным набором и структурой хромосом в гаметах, нарушением мейоза и образования гамет. Спермин не могут лизировать оболочку яйцеклетки и проникнуть в нее.

Однако, несмотря на трудности скрещивания к настоящему времени удалось создать значительное число пород и гибридных групп животных путем отдаленной гибридизации. При этом для зон с экстремальными природно-климатическими условиями важно получить такие формы животных, в которых сочетаются признаки домашних и диких животных.

Большое практическое значение имеют работы по гибридизации молочных и мясных пород крупного рогатого скота с зебу. Таким путем получены популяции животных, не восприимчивых к кровепаразитарным заболеваниям. Этих животных с успехом можно разводить во многих зонах нашей страны, где культурные породы крупного рогатого скота заражаются пироплазмозом и нередко гибнут от этой болезни. От гибридных первотелок красной степной породы с зебу получили за лактацию около 2,5 тыс. кг молока жирностью 4,8—5,0 %. В дальнейшем гибридам приливали кровь шортгорнов, что значительно улучшило мясные формы, способствовало повышению откормочных и убойных качеств. Гибриды II поколения, полученные от обратного скрещивания (74 крови зебу) дали 3 тыс. кг молока с содержанием жира 4,0—4,2 %. Кроме того, при испытании на акклиматизационные способности было констатировано, что они в достаточной степени сохранили приобретенный от зебу иммунитет к кровепаразитарным заболеваниям.

В результате скрещивания зебу индийского происхождения с мясным скотом в ряде стран выведены следующие породы мясного скота: санта-гертруд, брангус, брафорд, филанис, сан-пауло, бифмастер, чарбреи.

Например, одна из лучших мясных пород санта-гертруды была выведена путем гибридизации зебу породы браман с шортгорнским скотом (доля крови шортгорнов $\frac{5}{8}$ зебу — $\frac{3}{8}$; порода брангус выведена путем гибридизации зебу ($\frac{3}{8}$) с абердин-ангусами ($\frac{5}{8}$)- В результате гибридизации зебу (1/2 с герефордами 1/4 и частично шортгорнами 3/4 получена порода бифмастер, а при скрещивании зебу с шароле — чарбреи. Гибридизацией бизона с мясными породами скота в США получен скот кэттало, хорошо использующий круглый год пастбищный корм.

Особо ценная порода мясного скота бифало была создана в США путем

гибридизации на первом этапе буйвола с голштино-фризскими коровами, а затем спаривания гибридных самцов с коровами мясных пород. Гибриды имеют $\frac{3}{8}$ крови бизона и $\frac{5}{8}$ крови крупного рогатого скота ($\frac{3}{8}$ шароле и $\frac{1}{4}$ герефорда), быстро растут и к 12-месячному возрасту достигают живой массы 500 кг при использовании только пастбища. При дачах овса (4,5 кг) и сена вволю прирост бифало достигает 2 кг в сутки. Гибриды очень нетребовательны к виду корма и могут поедать полынь, кактусы, рисовую солому и прекрасно откармливаются на пастбище.

В свиноводстве также применяется гибридизация для увеличения массы животных, улучшения качества мяса, повышения крепости конституции и долголетия, а также резистентности свиней, предназначенных для интенсивной эксплуатации на промышленных комплексах.

Успешную гибридизацию домашних свиней с дикими проводили многие ученые в нашей стране и за рубежом. Так, П. Е. Ладан использовал европейских кабанов при создании северокавказской породы, М. Симон, И. Скорик и др. — при выведении сибирской северной породы. Ф. Мухамедгалиев, П. Еськов, В. Ли и др., приливая кровь среднеазиатского дикого кабана, создали в Казахстане семиреченскую породу свиней.

В Донском СХИ проводят работу по созданию для комплексов животных с крепкой конституцией (Ф. К. Почекняев, 1979). Для этого объединяют наследственные качества северокавказской породы с породой пьетрен и диким кабаном. Полученные гибриды имеют крепкие конечности, хорошую оброс-лость, у них отсутствуют признаки изнеженности, однако по скороспелости, оплате корма, воспроизводительным качествам гибриды уступают другим сравниваемым с ними синтетическим линиям.

Для создания конституционально крепких животных, способных в условиях жаркого климата давать высокую продуктивность, Г. К. Гаджиев, К. Я. Юсупов и А. Айгунов скрещивали три породы — крупную белую, северокавказскую, пьетрен — с диким кабаном. Вначале маток крупной белой породы скрестили с диким кабаном, а для получения гибридов II и III поколений лучших свинок покрывали хряками северокавказской породы. Для повышения мясности к полукровным помесям по северокавказской, породе прилили кровь породы пьетрен. Животных IV поколения начали разводить «в себе», а для закрепления положительных качеств (высокая мясность и крепость конституции) использовали близкородственное спаривание. Скороспелость, откормочные и мясные качества гибридов незначительно отличались от этих качеств чистопородного молодняка северокавказской породы.

Использование диких животных для создания новых форм овец по методике М. Ф. Иванова также получило широкое распространение. Используя отдаленную гибридизацию, им была создана новая порода овец — асканийский меринос. При выведении породы тонкорунных овец скрещивали с муфлоном. Среди гибридов I поколения были животные, сходные по экстерьеру и темпераменту с муфлоном, а по качеству шерсти — с мериносом. Но настриги шерсти были незначительны. При дальнейшем спаривании гибридных баранов с мериносовыми матками получали потомство с вполне удовлетворительными шерстными качествами.

В Казахстане путем скрещивания тонкорунных овец породы прекос с диким бараном архаром создана тонкорунная порода овец — казахский архаромеринос. Архаромериносы сочетают качества горного барана архара и мериносовых овец, хорошо используют высокогорные пастбища, обладают хорошей плодовитостью.

Путем гибридизации каракульских овец с горным бараном выведена группа серых каракульских овец. По качеству каракуля гибриды не отличаются от чистопородных животных, но значительно превосходят их по жизнеспособности.

В коневодстве путем скрещивания кобылы с ослом получены мулы. Возможно и обратное скрещивание — ослицы с жеребцом, от которого получают лошаков, значительно уступающих по величине и силе мулу. Кроме того, в последнее время

получают лошадей от скрещивания: домашняя лошадь× лошадь Пржевальского, домашняя лошадь× джигитай и др.

1.4 Лекция 4 (Л-4) Планирование племенной работы на станциях по племенной работе и искусственному осеменению.

1.4.1 Вопросы лекции:

1. Способы выращивания ремонтных бычков и быков на станциях по племенной работе и искусственному осеменению с.-х. животных.
2. Принципы организации племенного использования быков.
3. Оценка и отбор производителей по показателям воспроизводительной способности.
4. Условия получения, разбавления, хранения и оценки спермы производителей.
5. Оценка показателей воспроизводительной способности коров и современные методы повышения репродуктивных способностей с.-х. животных.

1.4.2 Краткое содержание вопросов:

1. Способы выращивания ремонтных бычков и быков на станциях по племенной работе и искусственному осеменению с.-х. животных.

В Оренбургской области племенную базу **молочного скотоводства** составляет скот племенного завода ФГУП ПЗ им. Свердлова и 14 племенных репродукторов, 7 из которых занимается разведением животных красной степной породы и 8 - симментальской. Численность племенного поголовья – 10,4 тыс. коров или 7% от поголовья коров общественного стада области. Средняя продуктивность коров племхозяйствах – 2943 кг, что на 57% выше среднеобластного показателя. Наивысшая молочная продуктивность коров в ОАО «Оренбургское» по племенной работе – 5205 кг, ФГУП ГПЗ им Свердлова Тюзского района – 4120 кг и ЗАО им. Калинина – 3527.

Племенную базу **мясного скотоводства** составляет скот двух плем.репродукторов по разведению казахской белоголовой породы, одного герефордской и двух племзаводов: «Спутник» занимается разведением калмыцкой породы, ОНО ПЗ «Димитровский» Илекского района - казахской белоголовой породы. Поголовье – 3058 голов или 12,8% от коров мясного стада области. В частности, в Оренбургской области на сегодня имеется всего 5 племенных хозяйств по разведению мясных пород с общей численностью 8,0 тыс. гол. скота, в том числе 2,9 тыс. коров, или 12,7% к общему поголовью маток. К сожалению, этого явно недостаточно для полного удовлетворения потребности региона, в племмолодняке мясных стад, а также в племенных бычках для промышленного скрещивания в молочном скотоводстве. 9 пород скота данного направления развития, численность его не превышает 400 тыс. гол. Для обеспечения потребностей отрасли в племживотных создана сеть племхозяйств (18 племзаводов и 99 племрепродукторов), где численность племскота - 150,1 тыс. гол., в т. ч. 67,4 тыс. коров.

1. Станции по племенной работе и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных - это основные центры организации и проведения племенной работы по качественному улучшению разводимых пород животных.

В зависимости от видов обслуживаемого маточного поголовья типы и размеры станций могут быть:

1. **Комплексными** – предназначенными для снабжения ферм спермой нескольких видов животных;
2. **Специализированными** – для снабжения спермой только одного вида животных.

Задачи станций (племпредприятий) по искусственному осеменению:

- 1) Руководить размещением, воспроизводством и рациональным использованием племенных ресурсов в товарном и племенном скотоводстве.
- 2) Осуществление генотипической селекции производителей путем их оценки по качеству потомства и отбора улучшателей;

- 3) Обеспечение высококачественной спермой высокоценных племенных производителей, в первую очередь оцененных по потомству и признанных улучшателями по породам;
- 4) Контроль за регистрацией полученного молодняка;
- 5) Внедрение мероприятий для достижения высокой оплодотворяемости маточного поголовья, предупреждение и ликвидация бесплодия и яловости маточного поголовья животных в обслуживаемых хозяйствах;
- 6) Организация широкого применения искусственного осеменения с.-х. животных во всех хозяйствах зоны деятельности;

Существующие племенные хозяйства по выращиванию ремонтных бычков имеют ряд крупных организационных, технологических и других недостатков.

1. ***Неравномерное рассредоточение племенных хозяйств-репродукторов по областям и административно-экономическим районам страны, разные их производственные объемы и многопородность усложняют планирование и выращивание ремонтных бычков.*** Племенным заводам и хозяйствам-репродукторам, как правило, устанавливают ежегодные задания на численную поставку ремонтных бычков без заявок на их линейную принадлежность. Качество бычков и их реализационная стоимость определяется по комплексному классу, который устанавливается по живой массе, продуктивности родителей, конституции и экстерьеру, происхождению. Все эти требования по своей природе относятся к фенотипическим признакам, которые формируются условиями содержания уровнем кормления и чистопородным разведением. Следовательно, племенные хозяйства материально не заинтересованы в повышении генетического потенциала выращиваемых на племя ремонтных бычков. Им достаточно получить чистопородных бычков от коров с относительно высоким удоем за одну из лактаций и вырастить молодняк до элитарного веса к моменту реализации независимо от генеалогии его происхождения и линейной принадлежности.

2. ***Погоня за рекордными показателями продуктивности коров-матерей (без учета их генетического потенциала) снижает эффективность заводской работы с лучшими консолидированными по селекционируемым признакам линиями пород.***

Само собой разумеется, что при таких требованиях к выращиваемым бычкам для станции искусственного осеменения в племенных стадах племхозов допускаются бессистемные кроссы, пренебрегается гомозиготность при индивидуальном и индивидуально-групповом подборе.

3. ***Государственные станции по племенной работе и искусственному осеменению при существующей структуре управления племенным делом не в состоянии обеспечить быками – производителями нужных плановых линий пород.*** Не координируется эта работа и племзаготконторами, производящими куплю-продажу бычков. В результате станции комплектуются в большей части представителями случайных линий, что ведет к бессистемному кроссированию породных стад хозяйств. Многие станции искусственного осеменения областного и даже регионального значения имеют по 10-12 линий быков, причем многие из них представлены одним-двумя производителями. Такая организация выращивания и комплектования бычьих стад на станциях не дает возможности составить правильные ротации использования быков, отвечающих требованиям линейного разведения и принятым методам селекции.

4. ***Племенные хозяйства, в свою очередь, официально не закреплены за государственными племенными станциями по их комплектованию ремонтными бычками определенных пород и линий, равно как и не несут никакой ответственности за поддержание и совершенствование линейной структуры не только товарных, но и собственных племенных маточных стад.***

5. ***Отсутствуют научно обоснованные рекомендации по содержанию, уходу,***

кормлению и подготовке ремонтных бычков к продолжительному и эффективному племенному использованию в будущем. Недостатки по выращиванию ремонтных бычков зачастую допускаются и не по вине племенных репродукторов.

6. **Отдельные племенные хозяйства и формы реализуют в год незначительное число бычков.** Только по этой причине они не могут создать надлежащих режимов содержания, ухода и кормления. Основное требование, которое предъявляется к бычкам к моменту реализации, - соответствие по живой массе высоким бонитировочным классам – способствует нарушению зоогигиенических требований выращивания: применению стойлово-привязного содержания, сверхвысоких норм кормления и т.д.

Реализация молодняка КРС в области в 2004 г составила – 1416 гол, из них племенного молодняка 340 молочных пород (в т.ч. 19 бычков) и 666 голов мясного скота (в т.ч. 290 бычков)

Для устранения перечисленных недостатков и использования наиболее прогрессивной научно обоснованной технологии выращивания во многих странах ближнего и дальнего зарубежья и в некоторых областях и регионах России применяется специализация выращивания быков-производителей, создание для этого специализированных хозяйств-элеверов.

По своему назначению и в зависимости от освоенных способов хранения семени они **бывают двух типов:**

1. хозяйства-элеверы по выращиванию бычков от 20-30 дневного до годовалого возраста
2. специализированные станции-элеверы, где быки-производители выращивают и используют до конца жизни.

Хозяйства-элеверы организуют по одному-два на область. В них концентрируют бычков определенных пород и линий, закупаемых в племенных хозяйствах. В 12 месяцев после выращивания по утвержденной технологии пригодных для племенного использования бычков по единому плану селекционно-племенной работы с породой передают на станции искусственного осеменения.

Выращивание бычков на фермах-элеверах имеет ряд и **технологических преимуществ:**

1. На специализированных фермах создаются все условия для организации любых из рекомендуемых способов содержания, в том числе и группового свободно-выгульного.
2. На фермах-элеверах можно применять комплексную механизацию производственных процессов, проводить ветеринарно-профилактические мероприятия, организовывать долголетние культурные пастбища и полноценное нормированное кормление, обеспечивать проведение эффективных прогулок, значительно повышать производительность труда рабочих.
3. В целом расходы по выращиванию ремонтных бычков сокращаются более чем в 2 раза.

Способы содержания быков. Для поддержания нормальной жизнедеятельности и продолжительного сохранения воспроизводительных способностей быков требуется самые **благоприятные условия, т е целая система жизнеобеспечения, которая включает в себя:**

1. режим содержания и ухода,
2. кормления,
3. вопросы организации производственных процессов,
4. зоогигиенические и ветеринарно-профилактические мероприятия.

В настоящее время на станциях применяется несколько способов содержания:

1. стойловое привязное
2. беспривязное,
3. групповое беспривязное

4. комбинированное.

При всех этих способах решается одна и та же задача, однако все они имеют свои преимущества и недостатки.

1. Стойловое привязное содержание. Применяется она на большинстве отечественных и зарубежных станций. Круглогодовое привязное содержание быков рассчитано на использование капитальных скотных дворов с нормальным микроклиматом, надежной фиксацией животных и сохранением режима содержания и ухода.

При стойловом привязном содержании скотники обслуживаются по 7-10 бычков-производителей. В обязанности скотников входит ежедневное кормление, подготовка быков к взятию от них семени, выводка в манеж, чистка, прогулка производителей и другие работы – чистка помещений, сохранение в надлежащем порядке инвентаря и других предметов ухода.

Кормление, взятие семени и прогулка быков должны выполняться в строго установленной последовательности. Кормление быков, как правило, трехразовое.

2.Стойловое беспривязное содержание. Оно отличается от привязного тем, что быков содержат в индивидуальных денниках, где они могут более активно пользоваться свободой движений.

3. Групповое круглосуточное беспривязное содержание. Этот способ содержания применяется реже. Он связан со сложностью сгруппировки быков, требует четкого выполнения всех производственных операций по уходу за животными, хорошей подготовки и дисциплины обслуживающего персонала. Быки находятся на выгульной площадке или на выпасе. В стойла их ставят только на время подкормки концентратами и сочными кормами, для подготовки к взятию семени, для мойки, проведения ветеринарных обработок и т.д.

4. Комбинированное содержание быков. Быков-производителей содержат на выгульной площадке или выпасе только в дневное время. На ночь их ставят в стойла на привязь.

Влияние факторов на качество спермы быков

- **кормление быков;**
- **режимы их использования;**
- **интервал времени между садками;**
- **активный мотив;**
- **сезон года;**
- **действие шумового стресса**

Важнейшими факторами, влияющими на биологическую полноценность спермы, являются **кормление быков и режимы их использования**.

В настоящее время доказано, что рационы кормления быков в зимний период должны включать около 40-50% концентратов, 25-40% грубых и 20-30% сочных кормов. В летний период необходимо из сочных кормов использовать зеленую массу – 30-40%, грубые корма – до 20% и концентраты – в пределах 40-50%. На племпредприятиях и станциях по искусственно осеменению животных быки получают комбикорма рецептов К66-1 и К66-2. в эти корма входят овес, ячмень, просо, кукуруза, отруби пшеничные, жмых подсолнечный, дрожжи, зернобобовые, травяная, рыбная и мясокостная мука, соль.

В рационы быков необходимо включать богатые витаминами корма – высококачественное сено (6-10 кг на одного быка в сутки), красную морковь (5 кг) либо муку из красной моркови, которую добавляют в комбикорм, кормовую или сахарную свеклу (5 кг), а также использовать специальные премиксы. Высококачественный силос и сенаж предпочтительно скармливать в весенние месяцы. Большое значение в улучшении основных показателей качества спермы имеет минеральное питание быков. Поскольку

быков-производителей используют практически в течение всего года, их кормление должно быть рассчитано на поддержание заводской кондиции упитанности. Имеющийся практический опыт свидетельствует о возможности применения полноценных стабильных рационов для племенных быков в течение круглого года.

Например: В ОАО «Оренбургское» по племенной работе.

Одной из важных задач станций по искусственному осеменению и племпредприятий является создание оптимальных условий содержания быков. Многочисленные данные свидетельствуют о том, что *лучшей системой является свободно-выгульное групповое или индивидуальное свободное содержание. Однако в условиях крупных станций и племпредприятий принято круглогодовое содержание быков в помещениях.*

На племпредприятиях и станциях искусственного осеменения бычкам должен систематически предоставляться *активный моцион*. Для проведения моциона быков станции искусственного осеменения используют кольцевой коридор из металлических труб

На количественные и качественные показатели спермопродукции влияет *сезон года*. Лучше качественные показатели спермы в осенне-зимние месяцы наблюдались только у быков в возрасте 8-9 лет, тогда как у 3-4 летних животных подвижность спермиев была выше в весенне-летний период.

В последние годы были проведены исследования действия *шумового стресса* на биологическую полноценность спермиев. Установлено, что долговременное воздействие шума (выше 65 дБ) механического устройства для моциона, вентиляторов и навозоуборочного транспортера приводит к снижению количества и качества спермы быков.

На станциях и племпредприятиях *режим использования* животных обычно устанавливают с учетом их возраста, индивидуальных особенностей, упитанности, состояния здоровья и эффективности криоконсервации спермы. Оптимальным режимом использования быков на госплемстанциях является получение от них 3-4 эякулятов в неделю. Получение 5 эякулятов и более в неделю приводит к снижению устойчивости спермиев к замораживанию.

При получении спермы от быков необходимо соблюдать определенный *интервал времени между садками*. Интервал между получением первого и второго эякулята должен быть не менее 10 мин, а между вторым и третьим – 10-15 мин.

Необходим помнить, что при взятии спермы должны соблюдаться *необходимые меры, что избежать ее загрязнения патогенной микрофлорой*.

2. Принципы организации племенного использования быков.

На всех станциях искусственного осеменения, в племенных заводах и хозяйствах-репродукторах поголовье быков комплектуют животными, отвечающими определенным требованиям товарного или племенного скотоводства зоны и породы.

Известно, что структура каждой породы состоит из внутрипородных типов, ряда линий и многочисленных семейств, которые отличают ее от других пород глубиной развития тех или иных породных и типологических признаков, в большей или меньшей степени отвечающих хозяйствственно полезным требованиям.

Число внутрипородных линий скота, разводимых в зоне и каждом хозяйстве, может быть разным. Это зависит от продолжительности и уровня предшествующей племенной работы и сложившихся особенностей каждого стада и отдельных групп животных.

В каждой зоне и в каждом стаде имеются группы животных, отличающиеся рядом качественных признаков. Дать наиболее полное развитие преимущественным для зоны показателем можно только при правильном подборе и соответствующем совершенствовании линий. Самой собой разумеется, что каждая линия имеет свои

особенности и не может удовлетворять всех хозяйственных требований. На станциях искусственного осеменения целесообразно иметь не более 3-4 линий, а в зональных хозяйствах-репродукторах – 4-5.

Потребность в производителях при комплектование станций быками определяется:

- в зависимости от обслуживаемой численности маточного поголовья скота в зоне,
- породности и качества животных,
- размеров ферм и их удаленности от станции,
- состояния дорог,
- наличия автотранспорта,
- а также от методов хранения семени и результатов оплодотворения

Средней нагрузкой на одного быка обычно считают 750-1000 маток. В каждой линии должно быть не менее 3-4 пар быков (основных и заменяющих). Следовательно, на станции при линейном разведении целесообразно иметь 18-32 быка при осеменении не менее 13,5 тыс. коров и телок в год. Комплектовать станции ремонтными быками следует из племенных хозяйств-репродукторов.

Подбор и ротационные схемы использования быков. В современной практике работы станций искусственного осеменения производителей *используют по четырем основным типам подбора:*

- групповому,
- индивидуальному,
- индивидуально-групповому,
- дифференцированному с соблюдением (или без соблюдения) принципов линейного разведения.

За каждой группой хозяйств закрепляют группу быков на шесть лет, через два года каждую пару быков во избежание родственного разведения переводят на обслуживание следующей подгруппы хозяйств. После шестилетнего использования всех быков (шесть) закрепляют за следующей группой хозяйств. В массовой практике на станциях искусственного осеменения создают число групп быков, равное числу используемых линий. Обслуживаемые хозяйства разбивают на такое же число групп.

Для поддержания разведения по линиям каждая группа быков (линия) должна состоять из 3-4 пар производителей одной линии. Таким образом, в зоне будет 3-4 группы хозяйств (по числу линий), а в каждой группе, в свою очередь, будет 3-4 группы с внутригрупповой ротацией использования быков. Схемы закрепления быков в ротациях могут быть разными.

С переходом на хранение семени в жидким азоте нужно применять индивидуальный подбор и на товарных и на племенных фермах.

Интенсивность использования быков. Усиленное половое развитие быков начинается с 6-месячного возраста и заканчивается к двум годам. **Выделяют три пожизненных периода сперматогенеза:** первый – становление половых функций от 18-20 месяцев до 4 лет, второй – расцвета половых функций от 4 до 10 лет и третий – угасание половых функций после 10 лет.

Бонитировка быков. Для определения племенной ценности качественного состояния и эффективности использования производителей на станции искусственного осеменения, в племенных и других хозяйствах нужно ежегодно проводить их бонитировку. **В процессе бонитировки уточняют и проверяют:**

- а) подлинность происхождения и линейную принадлежность быков по данным племенных документов и по группам крови (в лабораториях иммуногенетики);
- б) продуктивность матерей, дочерей и ближайших родственников за последнюю законченную лактацию;

- в) состояние здоровья, половую активность и качество семени к моменту бонитировки;
- г) живая масса и упитанность;
- д) правильность оценки животных по экстерьеру и конституции за предшествующую бонитировку.

Всех быков, поступивших на станцию искусственного осеменения или в другое хозяйство после предшествующей бонитировке, подвергают тщательному комиссионному осмотру с оценкой:

- а) выраженность типа породы и происхождения, породности и линейной принадлежности;
- б) показателей происхождения и оценки родителей по продуктивности;
- в) экстерьера и конституции со взятием основных промеров;
- г) типа нервной деятельности;
- д) состояния здоровья и показателей живой массы;
- е) воспроизводительных способностей родителей, половой активности и качества семени бонитируемых животных.

После визуальной и документальной оценки быков определяют наличие их потомства – маточного состава (дочерей и внучек) в зоне деятельности станции с указанием названий ферм и хозяйств. Полученные данные сравнивают с ротацией использования быков, утвержденной планом племенной работы. При обнаружении значительного числа потомства, полученного от беспланового использования быков, производят уточнение закреплений производителей за хозяйствами.

В ходе анализа данных бонитировки выявляют удачные кроссы линий, лучших быков по воспроизводительным способностям и дающих хорошее потомство.

На основании полученных материалов пересматривают план закрепления быков на следующий год, планируют завоз ремонтных бычков нужных линий, намечают мероприятия по улучшению работы.

Результаты бонитировки быков станция искусственного осеменения обязана сообщить всем хозяйствам обслуживающей зоны.

3.Оценка и отбор производителей по показателям воспроизводительной способности.

Условия получения, разбавления, хранения и оценки спермы производителей.

Оценке по воспроизводительной способности подлежат все производители племпредприятий и станций по искусственноому осеменению животных.

Рациональное использование репродуктивного материала самцов - производителей подразумевает осуществление комплекса мероприятий, направленных на получение оптимального количества качественного репродуктивного материала (спермы) за время хозяйственного использования самца, и включает в себя:

- полноценное кормление самцов-производителей;
- периодичность взятия спермы (обычно дуплетно два раза в неделю);
- профилактику и лечение заболеваний, передающихся половым путем.

Показатели воспроизводительной способности :

- **Половая активность производителя;**
 - **Качество спермы;**
 - **Оплодотворяющая способность спермы.**
- 1. Половая активность производителя;**

Под **половой активностью (половой потенцией)** понимают характер и степень проявления половых рефлексов, в результате которых производитель выделяет сперму.

От особенностей ее проявления и будет, прежде всего зависеть возможность их использования. Чем выше половая активность производителя, тем обычно больше он продуцирует спермы и лучше ее качество.

Качество спермы; Сперма – сложный секрет половых желез. В настоящее

время разработано большое число методов оценки ее качества. Действующими инструкциями по искусственно осеменению с.-х. животных предусмотрено каждый эякулят производителей подвергать оценке:

- визуальной (по объему, цвету и т.д.),
- микроскопической – на густоту (концентрацию) и активность (подвижность) сперматозоидов.

Оплодотворяющая способность спермы проверяемых быков определяют по числу повторных осеменений. Если число коров с повторным осеменением превышает 50%, то таких быков из проверки исключают. Спермой одного быка должно быть осеменено не менее 80-100 коров и телок. Осеменять коров желательно в сжатые сроки (в течение 3-4 мес.)

По завершении оценки отобранных бычков по индивидуальным качествам они проходят испытания по потомству. С этой целью от бычков в возрасте 12-14 мес. берут по 500-600 доз спермы и осеменяют ею 80-100 коров и телок. Породность коров в таких случаях должна быть не ниже второго поколения, а продуктивность не ниже породного стандарта или не ниже средних показателей по стаду, если последние превосходят породный состав.

Режим использования быков. У взрослых быков берут по 2-4 эякулята в неделю. Второй эякулят получают спустя 5-10 мин после первого. У молодых 14-24 месячных бычков берут не более двух эякулятов в неделю. У бычков 12-13 мес. возраста сперму берут один раз дуплетом в 10-12 дней, с учетом возраста, развития и половой активности.

Методы получения спермы.

Для садки быков используют:

- 1) Станок конструкции ВИЖ сделан из металлических труб, укрепленных на специальной раме. С обеих сторон имеются специальные площадки для упора быка во время вспрывгивания и садки. Подставное животное, на которое берут сперму, фиксируют при помощи специального фиксатора;
- 2) Механический станок (чучело) с гидропневматической амортизацией (НИИЖ Лесостепи и Полесья УССР) – Сварено из металлических труб разного диаметра. Верхняя часть представляет собой каркас, который покрывается сначала легким материалом (поролон), а сверху дерматином или кожзаменителем.

При получении спермы на механическое чучело следует придерживаться следующих правил:

- 1) Не получать сперму от приучаемых быков на подставное животное;
- 2) Строго следить за исправностью чучела, не допускать шума в манеже и грубого обращения с быками;
- 3) Делать проводку быка между садками;
- 4) Быков, отказывающихся делать садку на механическое чучело, необходимо стимулировать путем ежедневного привода в манеж во время садок других быков на чучело, а затем дать возможность самим сделать садку.

Слайд
(вагина)

Оценка качества свежеполученной спермы. После получения сперму быков оценивают по внешнему виду, цвету, объему, густоте (концентрации спермиев в 1 мл), подвижности (в баллах), количеству спермиев с аномальной морфологией. Сперма с примесями гноя, крови, мочи или хлопьев к использованию не допускается.

По ветеринарно-санитарному состоянию сперма должна соответствовать требованиям и нормам. По этому показателю сперму быков исследуют один раз в квартал в лабораториях государственной ветеринарной службы.

По микробной загрязненности неразбавленную сперму быков подразделяют на:

- a) незагрязненную – в 1 мл менее 0,1 тыс. непатогенных микроорганизмов;
- b) слабозагрязненную – в 1 мл до 2 тыс. непатогенных микроорганизмов;
- c) среднезагрязненную – в 1 мл до 5 тыс. непатогенных микроорганизмов.

Для разбавления и замораживания спермы в форме гранул или в полипропиленовых соломинах (пайетах) применяют лактозо-глицерино-желточную среду (ЛГЖ) следующего состава: лактоза ($C_{12}H_{22}O_{11} \cdot H_2O$)- 11,5г, желток куриных яиц- 20мл, глицерин ($C_3H_8O_3$)- 5 мл, спермосан-3-50 тыс. ед., вода дистиллированная – 100 мл.

Для разбавления и замораживания спермы быка в облицованных гранулах используют среды №1 и 2.

Среды для разбавления и замораживания спермы в облицованных гранулах могут быть использованы и для замораживания в форме необлицованных гранул. В качестве бактерицидного средства в средах для разбавления спермы вместо спермосана –3 можно использовать полимиксин в количестве до 100 тыс. ед.

После получения, определения объема эякулята и концентрации сперму разбавляют прямо в спермоприемнике в отношении 1:1 – 1:2 и после 5-10 минутной выдержки дополнительно до нужного объема. Среду для разбавления вводят небольшими порциями при осторожном перемешивании после каждой добавленной порции. Температура среды перед разбавлением должна быть 30-35 °C. срок использования среды 3-4 ч со времени ее приготовления.

Разбавленную сперму, предназначенную для замораживания в соломинках, охлаждают до 22 °C и выдерживают при этой температуре 20 мин. Дальнейшую обработку спермы (расфасовка, закупорка, раскладка в штативы) проводят при комнатной температуре. При замораживании спермы в необлицованных гранулах спермоприемники спермой помещают в холодильник при температуре 2-4 °C на 2-4 ч до момента замораживания.

При замораживании спермы в облицованных гранулах ее вначале разбавляют средой № 1 температурой 30-35 °C, а через 5-10 мин средой № 2 при комнатной температуре. Разбавленную сперму расфасовывают в полимерную трубку, которую с помощью автомата разделяют на отдельные спермодозы объемом 0,25-0,33 мл с одновременной их герметизацией и маркировкой.

При хранении спермы при температуре 2-4 °C спермоприемник с разбавленной спермой обертывают в 2 слоя марлей или ватой и ставят в холодильник при температуре 2-4 °C. транспортируют такую сперму в термосе с тающим льдом. Срок использования ее не более 3 сут. Скорость снижения температуры разбавленной спермы до 2-4 °C не должна превышать 0,25-0,5 °C в минуту.

Способы замораживания спермы быков.

На настоящее время существуют несколько методик замораживания спермы быков:

- в пайетах (Франция, Cassou R., 1964);
- в открытых гранулах (Япония, Nagase H., 1964);
- в ампулах и соломинках (США, Almaquist J.O., 1968);
- в облицованных гранулах (Украина, Осташко Ф.И., 1969);
- в минитубах (ФРГ, Simmet L., 1972).

Каждая из методик имеет свои **недостатки и преимущества** по простоте использования, уровню бактериального загрязнения, необходимости наличия сложного оборудования т.п.

Сперму в форме гранул замораживают на блоках твердой углекислоты или фторопластовой пластине, на поверхности которой имеются лунки на 0,2 или 0,5 мл. в лунки охлажденной до 160-170 °C пластины с помощью шприца или другого устройства накапливают разбавленную и охлажденную до 2-4 °C сперму, выдерживаю в течение 2 мин над поверхностью азота, а затем опускают пластину в жидкий азот. После замораживания гранулы спермы собирают с пластины, пересыпают в мешочки или

алюминиевые трубы и переносят на хранение в сосуды Дьюара или хранилища. На мешочках или тубах делают запись даты получения спермы, клички и номера быка, количества доз. Слайды (Сосуд Дьюара) - 4 шт

Замораживание спермы в облицованных гранулах. При этом способе разбавляют сперму, расфасовывают и маркируют гранулы с помощью специальных устройств и автоматов – УАР – 1, ПРЖ – 1 и УСМА – 1. Расфасованые и полиэтиленовую трубку спермодозы помещают в алюминиевые тубы и после эквилибрации обойму с тубами погружают в жидкий азот таким образом, чтобы он не проникал в тубы через верхний край. Через 15 мин обойму с тубами полностью погружают в жидкий азот и оставляют в нем до проверки качества спермы.

Замораживание спермы в полипропиленовых соломинах (пайетах). После оценки и разбавления сперму охлаждают до 22 °C в водяном термостате. Затем соломинки с помощью специальной машины или под вакуумом заполняют разбавленной спермой, закупоривают с обеих сторон стерильными стеклянными шариками и помещают на специальных штативах в холодильник при температуре 4 °C на 3-4 ч. Перед заполнением соломины маркируют с помощью машины ММС.

Замораживают сперму в стационарном хранилище КВ-6202 в газообразном азоте на медном щите при температуре 120-130 °C. Замороженную в соломинах сперму закладывают в пластмассовые стаканы для хранения в стационарном хранилище.

Замораживают сперму в ампулах с помощью специальных аппаратов (ПЗСС-1 и др).

Оттаивание замороженной спермы. Оттаивают гранулы объемом 01-02 мл в стерильных пенициллиновых флаконах, в которые наливают по 1 мл 2,9%-ного раствора лимоннокислого натрия (пятиводного, трехзамещенного). Температура раствора должна быть 38-40 °C, время оттаивания – 5-8 с. оттаивают сперму в водяной бане при такой же температуре воды. Оттаивают гранулы объемом 0,5 мл в сухом стерильном пенициллиновом флаконе, куда помещаются две гранулы. Дополнительную сперму цитратом натрия не разбавляют. Температура оттаивания 38-40 °C.

При оттаивании спермы в облицованных гранулах ее помещают в воду, температура которой 38-40 °C, на 5-10 с до появления тонкого стерженька льда. Для оценки активности спермиев гранулу помещают на предметное стекло и прижимают вторым стеклом, затем кладут на предметный столик микроскопа при температуре 38-40 °C. Сперму, замороженную в соломинах (пайетах), размораживают в стерильном полиэтиленовом мешочке в водяной бане при температуре воды 38-40 °C в течении 11-12 с.

Сперму, замороженную в ампулах или полиэтиленовых стаканчиках, оттаивают в водяной бане при температуре 38-40 °C до появления тонкого стержня льда. После оттаивания качество спермы оценивают под микроскопом при температуре 38-40 °C путем нанесения капли спермы на предметное стекло.

2. Оценка показателей воспроизводительной способности коров и современные методы повышения репродуктивных способностей с.-х. животных.

1.5 Лекция 5 (Л-5) Племенное животноводство России

1.5.1 Вопросы лекции:

1. Состояние и направления повышения эффективности.
2. Особенности работы в племенных хозяйствах.
3. Племенная работа со стадом в крупных спецхозах.

1.5.2 Краткое содержание вопросов:

1. Состояние и направления повышения эффективности.

Современное состояние отрасли животноводства в РФ. В России скотоводство имеет преимущественно молочное направление и является основным источником получения

молока и мяса. Мясное скотоводство как специализированная отрасль по производству говядины занимает пока не большое место.

Данные органов государственной статистики и государственного управления сельским хозяйством свидетельствуют, что состояние животноводства в Российской Федерации вызывает особую тревогу вследствие непрекращающегося спада поголовья скота, приведшего к резкому снижению объемов производства мяса и молока, деформации и дисбалансу отечественного продовольственного рынка.

В 2004 году продолжилась тенденция сокращения поголовья крупного рогатого скота (далее - КРС) и свиней в хозяйствах всех сельхозтоваропроизводителей.

Поголовье КРС сократилось на 6,7 % по сравнению с 2003 годом и на 1 января 2005 года составило 23,1 млн. голов (из него поголовье коров сократилось на 6,4 % и составило 10,3 млн. голов), поголовье свиней сократилось на 11,1 % и составило 14,2 млн. голов.

За последние 4 года цены на электроэнергию увеличились в 3,4 раза, газ - в 3,1 раза, дизельное топливо - в 1,9 раза, бензин - в 1,7 раза, одновременно с этим потребительская цена, например, на мясо птицы повысилась в 1,6 раза, яйца - в 1,7 раза. Индекс цен на промышленную продукцию для сельского хозяйства составил в 2008 году 128 %, что, по экспертной оценке, привело к потерям сельхозтоваропроизводителями 25 млрд. рублей.

Вследствие сезонного характера производства животноводческой продукции предложение молока и молочных продуктов в период с мая по октябрь опережает спрос, что приводит к падению цен до 30 %, при этом механизмы государственного регулирования продовольственного рынка в целях выравнивания диспропорций не применяются.

Производство продукции животноводства в сельскохозяйственных предприятиях является убыточным, за исключением молока.

Самый большой убыток в 2007 году был получен от производства говядины (32,4 %).

Рентабельность производства животноводческой продукции характеризуется следующими данными (в процентах). Продукция 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. Молоко 6,9 11,5 0,9 6,4 8,7 Говядина -29,7 -18,2 -22,9 -32,4 -27,4 Несоответствие региональной видовой структуры животноводства и местных особенностей кормовой базы и одновременная ориентация на зернопотребляющий (концентратный) тип кормления (включая традиционно травоядные виды животных) также обусловливают неэффективность производства.

С проведением в Российской Федерации экономической реформы, предполагающей демонтаж прежней экономической системы и формирование рыночных отношений, изменился механизм государственной поддержки сельского хозяйства. С отменой государственного механизма централизованного ценообразования на оборудование и материалы, закупаемые сельскохозяйственными организациями, и закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию основными формами государственной поддержки агропромышленного производства стали бюджетные дотации, субсидии и субвенции. Необходимо отметить, что выделение бюджетных средств (бюджетные дотации) как формы государственной поддержки сельскохозяйственного производства широко распространено в странах с развитой рыночной экономикой.

Сравнительные данные, характеризующие их размер, свидетельствуют о протекционистской политике в иностранных государствах по отношению к национальному сельскому хозяйству. Так, в середине 90-х годов бюджетные дотации в сельское хозяйство США, Японии и страны Европейского экономического сообщества составляли, соответственно, 220, 11319 и 1099 долл. США на 1 га сельскохозяйственных угодий. Для сравнения в Российской Федерации финансирование из федерального бюджета в 2004 году на сельскохозяйственное производство осуществлено в размере 22,8 млрд. рублей, что составляло 107,3 рубля на 1 га сельскохозяйственных угодий, при этом по Южному федеральному округу - 59 рублей на 1 га сельскохозяйственных угодий.

С учетом того, что значительная доля бюджетного финансирования (до 50 %) направляется на осуществление прочих расходов и содержание подведомственных органов управления, размер прямых дотаций и субсидий на поддержку и развитие животноводства составляет не более одной трети. Большинство развитых государств оказывает значительную поддержку национальному аграрному сектору экономики, нежели Россия.

При этом они имеют высокий уровень развития животноводства в отличие от российского. В России поддержка аграрного сектора в целом находится на уровне статистической погрешности и не может влиять на функционирование предприятий. Имеющиеся механизмы государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей не отвечают потребностям сельского хозяйства. Уровень поддержки сокращается быстрыми темпами, несмотря на рост отдачи в результате вложенных субсидий, как в растениеводстве, так и в животноводстве, хотя в последнем и более медленными темпами. Таким образом, государство сменило приоритеты прямой поддержки не в пользу животноводства. В то же время хронически убыточное животноводство в большей мере нуждается в помощи. Оценивая эффективность отечественного животноводства с точки зрения вложения бюджетных средств и сравнивая выгоды от импорта продукции с развитием собственной отрасли, необходимо обратить внимание и на тот положительный эффект, который наблюдается в отечественном сельском хозяйстве в процессе устойчивого развития сельских территорий, а также учитывать значительную роль хозяйств населения в производстве животноводческой продукции и снижении социальной напряженности, в решении проблемы бедности и недоедания.

Так, например, в обществе в настоящий период к инновациям можно причислить следующие: 1. Повышение биологического потенциала продуктивности животных. 2. Выведение новых пород, типов и кроссов высокопродуктивных животных и птицы. 3. Сохранение и улучшение генофонда в животноводстве. 4. Усовершенствование биологических систем разведения животных. 5. Новые системы интенсивного кормопроизводства. 6. Методы эффективного использования кормовых ресурсов. Внедрение интенсивных технологий в животноводстве сопровождается заметным ростом продуктивности животных.

Так, например, в молочном животноводстве, на откорме КРС уровень продуктивности при хорошей организации применения интенсивных технологий, как правило, в 2-3 раза выше, чем на обычных животноводческих фермах сельхозпредприятий. В последние годы, несмотря на достаточно сложное экономическое положение АПК и его предприятий, инновационные процессы в отрасли стали постепенно активизироваться.

Особенно это относится к передовым сельскохозяйственным предприятиям, которые интенсивно осваивают в производстве инновации, при этом абсолютное большинство предприятий, внедряющих в производство научные достижения, добиваются существенного улучшения производственных, экономических и социальных показателей. Необходимость активизации инновационного процесса во всех сферах народного хозяйства в современных условиях поддерживается практической деятельностью правительственные и межгосударственных органов.

Низкая продуктивность скота является одной из главных причин не только плохого качества животноводческого сырья, но и высокой трудоемкости и убыточности производства продукции животноводства.

Два направления являются основными: инерционное и инновационное.

Инерционное развитие представляет собой процесс, предполагающий стагнацию, замедление темпов экономического роста, сопровождающееся кризисными явлениями, связанными с ростом цен, инфляцией, безработицей. Инновационное развитие связано с ускоренным экономическим ростом, повышением эффективности функционирования системы, расширенным воспроизводством и улучшением качества жизни населения.

Кроме двух основных направлений развития социально-экономических систем существует множество промежуточных и их модификаций.

Выделяют пессимистический вариант развития (как разновидность инерционного), умеренный (его называют реальным), инновационно-прорывной (оптимистический) и др. Подсистемы в животноводстве выделяются по функциональному и организационному признакам. К функциональным подсистемам относятся: биологическая, технико-технологическая, социальная, экологическая и экономическая, которые отражают различные стороны воспроизводственного процесса. Биологическая подсистема, выделенная автором, включает часть ресурсного потенциала, представленную специфическими средствами производства – сельскохозяйственными животными, которые в процессе жизнедеятельности продуцируют различную биологическую массу (молоко, мясо, шерсть и др.), обеспечивая кругооборот вещества и энергии в природе и удовлетворяя потребности населения в животном белке. Данная подсистема подчиняется как экономическим, так и биологическим законам развития.

Технико-технологическая подсистема – это совокупность технических ресурсов, технологий производства, способствующих получению необходимого результата (продукции, работ, услуг). Социальная подсистема включает элементы социальной инфраструктуры отрасли животноводства: социальные типы животноводов, специализированные дома отдыха и т.п. Экологическая подсистема состоит из элементов земельно-природного потенциала и ресурсов природоохранной и природовосстановительной деятельности.

Она обеспечивает рациональное природопользование и производство экологически чистой продукции.

Экономическая подсистема представляет собой экономический механизм хозяйствования, позволяющий рационально функционировать и развиваться биологической, технико-технологической, социальной и экологической подсистемам. Форму функционирования всей системы животноводства отражает организационная подсистема, включающая формы собственности, хозяйствования и управления. Цели развития любой социально-экономической системы многовариантны, зависят от этапов её развития, многообразия экономических интересов внутри системы и ее подсистем.

Подсистемы могут иметь собственные цели, которые подчинены общей цели всех социально-экономических систем – осуществлению расширенного воспроизводства. Основным механизмом достижения главной цели системы животноводства является инновационное развитие, а базовыми категориями, составляющими основу методологии его исследования – воспроизводство, эффективность, интенсификация, конкурентоспособность, инновация, инновационный процесс, инновационная деятельность, инновационная привлекательность, инновационная политика, инновационный капитал, инвестиции.

Воспроизводство, как непрерывный процесс воссоздания факторов производства (природных ресурсов, рабочей силы, средств производства), может происходить на простой, суженной и расширенной основе. Именно расширенное воспроизводство является ключевой целью инновационного развития системы животноводства и её подсистем. Степень достижения целей каждой из стадий кругооборота капитала (денежной, производительной и товарной) определяет эффективность инновационного развития животноводства, а выбор путей её повышения – направления инновационных процессов в отрасли.

Инновационное развитие животноводства тесно связано с интенсификацией и является одной из форм её проявления, так как включает одновременно процесс расширенного воспроизводства и качественное совершенствование его стадий на основе внедрения достижений научно-технического прогресса.

Конкурентоспособность производства отражает качество хозяйствования в условиях конкурентного рынка, способность состязаться с аналогичными производителями и товарами по качеству, цене, издержкам и другим показателям с целью завоевания рынка и получения более высокой доходности. Степень достижения конкурентоспособности животноводства определяется уровнем его инновационного развития. Инновация – конечный результат внедрения новой или усовершенствованной продукции (услуги), техники, технологии, организации производства, системы его управления с целью получения различных видов эффекта и ускорения процесса расширенного общественного воспроизводства.

Инновационная деятельность, применительно к животноводству, означает совокупность последовательно осуществляемых действий по созданию новой или улучшенной животноводческой продукции, усовершенствованной технологии и организации её производства, на основе использования результатов научных исследований и разработок, или передового производственного опыта с целью модернизации производства и выхода на новые рынки.

В работе сформулирована экономическая сущность инновационного процесса в животноводстве, который предлагается рассматривать как систему мероприятий по проведению комплекса научных исследований и разработок, созданию инноваций, их освоению с целью максимизации доходов и обеспечения конкурентоспособных параметров производства животноводческой продукции на основе роста производительности труда, снижения удельных издержек, повышения качества продукции как условий расширенного воспроизводства отрасли.

Инновационная привлекательность животноводства предполагает совокупность технологических, социальных, экологических, финансово-экономических параметров функционирования отрасли, определяющих платежеспособную потребность в инновациях. В работе инновационная политика в животноводстве рассматривается как часть аграрной инновационной политики государства и предприятий, которая представляет собой форму реализации инновационной стратегии отрасли, включающей установление масштабов и наиболее важных направлений инновационной деятельности для обеспечения продовольственной безопасности страны, достижения конкурентоспособных параметров и повышения эффективности производства животноводческой продукции. Инновационный капитал, в предложенной автором формулировке, представляет собой совокупную стоимость ресурсов, созданных в результате инновационной деятельности и способных приносить дополнительный доход. Чем больше доля инновационного капитала предприятия, тем выше его конкурентоспособность. Она основана на предвидении принципиальных, качественных изменений в отрасли, способных обеспечить её устойчивое, динамичное развитие за счёт достижения конкурентоспособных параметров производства животноводческой продукции.

В работе раскрыты особенности развития инновационных процессов в АПК, отличающие производственную деятельность в аграрной сфере. К таким специфическим характеристикам можно отнести зависимость производства от природно-климатических условий, использование в производственном процессе земли и живых организмов – растений и животных, различия в технологиях и продолжительности производственного цикла, многообразие видов сельскохозяйственной продукции, недостаточный уровень организации менеджмента всего инновационного цикла, дефицит высокопрофессиональных кадров, низкие темпы освоения инноваций, высокие производственно-финансовые риски.

В аграрном секторе скорость оборота инновационного капитала и его приращение не могут конкурировать с промышленностью. Особенно это касается выведения новых пород животных, сортов растений, на создание и освоение которых уходят десятилетия.

Поэтому перелом негативных тенденций и экономический рост в сельском хозяйстве невозможны без ускорения научно-технического прогресса, что требует максимальной оптимизации использования ограниченных финансовых, инвестиционных, материально-технических ресурсов. Развитие инновационных процессов в отрасли, по мнению автора, должно быть подчинено законам рынка, но регулировать и координировать связи между участниками инновационной деятельности необходимо государству, которое может учитывать и сочетать интересы государственного (федерального и регионального) и предпринимательского секторов, определять приоритеты и осуществлять планирование инновационной деятельности. Животноводство характеризуется разнообразием решаемых задач, разноуровневым характером экономических интересов, что предполагает наличие множества видов эффективности инновационной деятельности, отражающих различные стороны процесса воспроизводства. Народнохозяйственная эффективность животноводства характеризует степень удовлетворения потребностей государства в животноводческой продукции, произведённой отечественными товаропроизводителями и обеспечивающей продовольственную безопасность страны.

Региональная эффективность животноводства определяет уровень использования инновационного потенциала отрасли в регионе и степень удовлетворения потребностей населения в продуктах питания животного происхождения.

Локальная эффективность животноводства отражает достижение качественного уровня воспроизводства товаропроизводителя, позволяющего улучшить финансовые, социальные, экологические показатели функционирования отрасли. Эффективность инновационной деятельности в животноводстве отличается сложной взаимосвязью показателей, которые систематизируются в зависимости от её видов и отражают различные элементы воспроизводственного процесса, а также степень использования разнообразных ресурсов или факторов производства.

Технико-технологическая эффективность инновационной деятельности определяется степенью достижения рациональной системы ведения земледелия и животноводства при помощи таких показателей, как прирост производства животноводческой продукции на 1 га с х. угодий и 1 условную голову скота, снижение фондо- и энергоёмкости продукции и др. Критерий – максимизация производства продукции, удовлетворяющей требованиям рынка на единицу использованных ресурсов.

В животноводстве целесообразно выделить биологическую эффективность, которая характеризуется показателями прироста продуктивности животных, увеличения коэффициента конверсии корма (оплаты корма продукцией). Её критерием будет улучшение обменных процессов у скота и птицы, способствующих трансформации кормов в животный белок.

Экономическая эффективность инновационной деятельности определяется достижением дополнительной доходности производства за счёт улучшения качества ресурсов и измеряется такими показателями как снижение себестоимости, рост прибыли, рентабельности, производительности труда и др. Критерий – максимизация доходов отрасли как условие её расширенного воспроизводства.

Социальная эффективность инновационной деятельности отражает качество жизни населения и измеряется повышением уровня оплаты труда работников отрасли, соотношением совокупных реальных доходов и прожиточного минимума, улучшением демографических показателей. Критерий – повышение качества жизни работников, занятых в отрасли животноводства.

Экологическая эффективность инновационной деятельности определяется улучшением состояния окружающей среды. Для её оценки используются такие показатели, как увеличение объёмов производства экологически чистой животноводческой продукции в расчёте на единицу совокупных затрат, масштабов природо восстановительной деятельности. Критерий – сохранение и улучшение природной среды. Особенностью

анализа эффективности инновационной деятельности в животноводстве является обязательный учет технологического и коммерческого рисков, факторов времени, масштаба, качества и условий использования нововведений.

Таким образом, исследование инновационного развития животноводства основано на базовых категориях системно-воспроизводственного подхода, позволяющего учитывать как внутренние, так и внешние закономерности развития и связи между элементами системы. Развитие инновационных процессов в животноводстве во многом определяется адекватностью оценки оптимальных параметров отрасли, которые влияют на масштабы производства животноводческой продукции и её эффективность.

2. Особенности работы в племенных хозяйствах.

Племенные хозяйства. Основная задача племенных хозяйств заключается в совершенствовании наследственных качеств пород свиней и производстве высокопродуктивного племенного молодняка для неплеменных хозяйств. Эта задача решается в племенных хозяйствах двух типов: на племенных заводах, являющихся высшей формой хозяйств по племенной работе, где совершенствуются наследственные качества пород свиней; в племенных репродукторах, где занимаются размножением улучшенных племенных свиней, поступающих из племзаводов, сохранением их высокой продуктивности и выращиванием племенного молодняка для неплеменных хозяйств.

Основной метод разведения в племенных хозяйствах - чистопородное разведение, включающее комплекс мероприятий по оценке наследственных качеств свиней, отбору лучших животных и подбору для получения еще более продуктивного потомства в следующем поколении. Воспроизводительные качества свиноматок устанавливают по их многоплодию, молочности и массе помета при отъеме, а хряков - по многоплодию и молочности их дочерей. Откормочные и мясные качества оценивают по собственной продуктивности и качеству потомства.

Оценку ремонтного молодняка по собственной продуктивности проводят для выявления лучших по мясным и откормочным качествам животных, предназначенных для перевода в основное стадо в соответствии с ОСТ 102-86. Оценку проводят непосредственно в хозяйствах или на специальных контрольно-испытательных станциях. Оценке подлежат ремонтные хрячки и свинки племенных заводов и племенных репродукторов. Ремонтный молодняк отбирают от лучших хряков и маток (не менее 2 хрячков и 3 свинок из одного гнезда), по развитию не ниже первого класса в соответствии с инструкцией по бонитировке свиней, утвержденной в установленном порядке. Оценку проводят в специальных помещениях, в которых необходимо иметь станки из расчета 1,9 м² на 1 голову. Ремонтный молодняк содержат группами одного пола не более 10 голов в группе, происходящих, как правило, от одного хряка. Молодняку необходимо предоставлять прогулки; в летнее время давать в подкормку зеленую массу, а зимой сочные корма. Кормление проводят по нормам, которые должны обеспечивать среднесуточный прирост не ниже 500 г. Оценку проводят по результатам выращивания хрячков и свинок от возраста 4 месяцев до достижения 100 кг живой массы. При оценке учитывают возраст достижения живой массы 100 кг, считая со дня рождения, толщину шпика и длину туловища.

Для прижизненного измерения толщины шпика существуют различные инструменты и приборы, которые можно разделить на две группы по принципу действия.

Металлические линейки и иглы различной конструкции с миллиметровыми делениями, которыми прокалывают кожу и слой шпика до соприкосновения с нижележащими тканями. На средней линии спины под слоем шпика находятся остистые отростки позвонков, а сбоку от средней линии - длиннейшая мышца спины, которая окружена

довольно плотной соединительной оболочкой. Глубина погружения линейки или иглы до соприкосновения с нижележащей тканью соответствует толщине шпика.

Ультразвуковые аппараты - эхолоты. Датчик аппарата, который соприкасается с телом свиньи, испускает ультразвуковые волны. Ультразвук проходит через слой шпика и отражается от нижней его границы. Аппарат улавливает отраженный сигнал, и по скорости прохождения его фиксирует толщину шпика.

Длину туловища измеряют при живой массе 100 кг лентой по средней линии спины от затылочного гребня до корня хвоста.

После такой оценки отбирают на племя быстрорастущих свинок и хрячков с тонким слоем шпика.

Оценку по качеству потомства проводят методом контрольного откорма в соответствии с ОСТ 103-86 с последующим убоем откормленных свиней и определением качества полученных туш. Контрольный откорм проводят на контрольно-испытательных станциях (пунктах). Хряка оценивают по 12 и более потомкам, матку по 3-4. Соотношение потомков по полу в пределах каждого гнезда должно быть равным, а при отборе трех поросят один к двум, при условии, чтобы разница между количеством боров-кон и свинок по превышала 20% от общего числа потомков в группе оцениваемого хряка. Поросят отбирают при отъеме в 2-месячном возрасте с живой массой средней по гнезду, но не ниже требований I класса для ремонтного молодняка в соответствии с существующей инструкцией по бонитировке свиней. Перед постановкой на контрольный откорм поросят ставят па 20-дневный профилактический карантин, в период которого проводят дегельминтизацию и прививки против рожи. Прививки против чумы и болезни Ауески проводят по показаниям. Перед началом откорма проводят санитарную обработку помещения и просушивание его в течение не менее трех суток. Поросят размещают погнездно или индивидуально. До начала учетного периода в течение 5-7 дней поросят приучают к стандартному комбикорму. Учетный период при оценке откормочных качеств начинают с момента достижения подконтрольными подсвинками живой массы 30 кг. Возраст поросят в начале учетного периода не должен превышать 90 дней. Заканчивают откорм при достижении каждым подсвинком жилой массы 100 кг. Если животное не достигает массы 100 кг к возрасту 211 дней, то его снимают с контрольного откорма. При оценке хряка (или матки) не учитывают их потомков, не закончивших контрольный откорм.

Откармливают молодняк стандартными комбикормами по ГОСТ 16995 - 71 или полнорационными комбикормами рецепта ПК 55-26, в состав которого входит сухой обрат, или комбикормом рецепта К 55-25 с добавкой к нему свежего натурального обрата из расчета 1,5 кг на голову в сутки в течение всего учетного периода контрольного откорма. Кормят подсвинков 2 раза в сутки вволю, не допуская остатков и потерь (до "чистого корыта"). Комбикорм рецепта ПК 55-26 размешивают с водой, а рецепта К 55-25 - с обратом и водой в соотношении 1:

1. Подсвинков взвешивают в начале и конце учетного периода перед кормлением или по истечении 3 часов после кормления. Последнее взвешивание перед отправкой на убой проводят после 12-часовой предубойной выдержки без кормления. Во время голодной выдержки подсвинки должны иметь доступ к воде.

При проведении контрольного откорма учитывают по каждому подсвинку возраст достижения живой массы 100 кг в днях и среднесуточный прирост за период откорма от 30 до 100 кг. Расход кормов учитывают ежедневно индивидуально, а при групповом содержании в среднем по станку и после окончания учетного периода пересчитывают на 1 кг прироста за учетный период откорма в кормовых единицах.

Контрольный убой свиней проводят без съема шкуры (со шпаркой). Категории туш устанавливаются в соответствии с ГОСТ 1213-74.

Мясные качества определяют:

1. убойной массой парной туши в килограммах с кожей, без головы, ног, внутренностей и внутреннего жира; голову отделяют поперечным разрезом перпендикулярно позвоночнику между затылочными мышцами и первым шейным позвонком; передние ножки отрезают по нижней границе запястного сустава, задние - по нижней границе скакательного сустава;
2. длиной охлажденной туши в сантиметрах, измеряемой в висячем вертикальном положении от переднего края лонного сращения до передней поверхности первого шейного позвонка (атланта);
3. толщиной шпика в миллиметрах, измеряемой миллиметровой линейкой на охлажденной полутуше в висячем вертикальном положении над остистыми отростками 6-7-го грудного позвонка; толщину шпика измеряют вместе с толщиной кожи;
4. площадью "мышечного глазка" в квадратных сантиметрах, измеряемого площадью поперечного разреза длиннейшей мышцы спины между первым и вторым поясничными позвонками; площадь определяют планиметром по контуру "мышечного глазка", перенесенного с туши на прозрачную пленку; при этом измеряют площадь поперечного разреза только длиннейшей мышцы спины; допустимо определять площадь "мышечного глазка" путем перемножения его длины, ширины и коэффициента 0,8;
5. массой задней трети охлажденной полутуши в килограммах, отделяемой поперечным разрезом между предпоследним и последним поясничными позвонками.

На основании результатов откорма и убоя потомков оценивают наследственные качества их родителей. Животных, потомство которых отличается высокой скоростью роста, низкими затратами корма на 1 кг прироста живой массы, мясными тушами, оставляют в племенном стаде. Выбраковывают тех маток и хряков, которые дают плохо откармливаемое потомство с жирными тушами.

После оценки лучших животных отбирают на племя. Здесь действует следующее правило: чем больше выбракованных животных, тем лучше будет потомство от оставленных на племя родителей. После оценки надо браковать не менее 50% свиней по каждому улучшающему признаку, чтобы получить более продуктивное потомство по сравнению с родителями по этим признакам. Если стоит задача повысить среднесуточный прирост, то следует выбраковывать после оценки не менее 50% свиней по этому признаку. Если одновременно надо повысить среднесуточный прирост и снизить толщину шпика, то сначала выбраковывают 50% животных по приросту живой массы, а затем из оставшихся - снова 50% по толщине шпика. При такой браковке легко обеспечить подбор отобранных на племя животных по принципу "лучшее с лучшим".

В НИИ свиноводства разработана методика одновременной оценки свиней по фенотипу и генотипу, предусматривающая оценку проверяемых хряков и маток по откормочным и мясным качествам потомства на контролльном выращивании с последующим убоем 50% подсвинков от каждого хряка и свиноматки и оценку каждого из потомков по собственной продуктивности (фенотипу), а также по собственной продуктивности и показателям сибсов и полусибсов (генотипу). Новый метод дает возможность сократить срок оценки хряков и маток по генотипу с 22-месячного до 7-8-месячного возраста и сохранить от убоя 50% и более высококлассного племенного молодняка.

Селекция на высокую мясность свиней может приводить к ослаблению конституции, снижению плодовитости и ухудшению качества свинины (мясо становится палевого цвета, водянистым, мягким). Это связано с тем, что у мясных животных чаще, чем у сальных, встречается в хромосомах галотановый ген. Назван он так потому, что животное с таким геном в гомозиготном состоянии болезненно (напряженная поза, судороги, повышение температуры и даже смерть) реагируют на газ галотананестезирующего действия. Если заданный ген находится у одного из родителей, то потомство (гетерозиготное) нормальное. Неприятности возникают в том случае, когда оба родителя являются носителями галотанового гена и потомство рождается гомозиготным.

Галотановый ген, с одной стороны, обуславливает высокую мясность, но с другой - может снижать многоплодие, жизнеспособность животных и качество свинины. Поэтому при селекции на высокую мясность надо выбраковывать животных с пониженной воспроизводительной способностью, ослабленной конституцией, слабыми конечностями и т.д., даже если они очень мясные.

Следует знать, что процесс наследственного улучшения продуктивности племенных свиней постепенный и длительный. При 50% -ной выбраковке животных по каждому улучшаемому признаку в среднем за поколение среднесуточный прирост под влиянием селекции может увеличиться на 5-9 г, возраст достижения массы 100 кг - уменьшиться на 1,5-2 дня, затраты корма на 1 кг прироста - на 0,03-0,05 корм. ед. Интервал между поколениями (период от рождения племенного животного до рождения его потомства, оставляемого на племя) составляет в наших племенных стадах в среднем 2,5 года, т.е. продуктивность всего стада на указанные величины может подняться селекцией за 2,5 года, хотя часть стада (30-50%), которая обновляется ежегодно, улучшается за один год. Племенное стадо имеет определенную структуру. Основу его составляют хряки и матки - животные старше 1,5 - летнего возраста. Ежегодно основное стадо обновляют на 30 - 50%. Для этого в возрасте 2 - 4 месяцев отбирают группу ремонтного молодняка из расчета 200 - 600 свинок на 100 основных маток, 20-60 хряков на 10 основных в зависимости от направления селекции и процента годового обновления основного стада. Ремонтный молодняк проходит контрольное выращивание; лучших животных используют для воспроизводства. После случки плодотворно осемененных свинок переводят в группу проверяемых маток, а хряков, плодотворно покрывающих маток, - в группу проверяемых хряков. Проверяемых маток оценивают по результатам первого опороса (многоплодию, молочности, по массе гнезда при отъеме), а хряков - по продуктивности покрытых ими маток. После такой оценки лучших животных переводят в группу основных маток и хряков (вместо выбывших или выбракованных по продуктивности свиней) и уже там оценивают по качеству потомства методом контрольного откорма. Свиньи, не отобранные после отъема в группу ремонтного молодняка, а также ремонтные свиньи, не отобранные на племя после оценки, составляют в стаде группу племенного молодняка и используются в качестве племенной продукции для продажи в другие хозяйства, если имеют классную оценку. Остальные идут на откорм и убой.

3. Племенная работа со стадом в крупных спецхозах.

Основными требованиями, которые должны предъявляться к свиньям в настоящее время, являются хорошая приспособленность к условиям промышленного производства и способность давать высокий эффект гетерозиса в товарном производстве.

В связи с этим поголовье свиней делят на две части - племенную и пользовательскую. Методы племенной работы в обеих частях идентичны.

Изменение системы племенной работы вызвано многими факторами, однако главный из них - нестабильность результатов промышленного скрещивания.

Рекомендуемое ранее промышленное скрещивание для увеличения продуктивности товарного поголовья не всегда дает гарантированный эффект.

Даже при скрещивании одних и тех же пород иногда получаются различные показатели. Именно поэтому предложена система разведения свиней, где основной структурной единицей при скрещивании является не порода, а линия, причем эта линия должна определенным образом селекционироваться на сочетаемость, т. е. на комбинационную способность с другой линией, отнесенными к иной или данной породе. Это дает гарантированный эффект гетерозиса, который можно с успехом применять в товарном свиноводстве. Такая система скрещивания получила название гибридизации.

В связи с интенсивной селекцией на высокие мясные и откормочные качества свиней возникла проблема совместить их с воспроизводительными признаками.

Как известно, к этим качествам относятся многоплодие, крупноплодность, молочность, масса гнезда в 2 месяца, выживаемость поросят, оплодотворяемость свиноматки. Замечено, что интенсивная селекция на мясные и откормочные качества приводит к ухудшению воспроизводительных способностей свиней из-за наличия между ними нежелательных корреляционных связей. Примером служит порода пьетрен, которая при отличных мясных качествах обладает крайне низкими воспроизводительными показателями. Вследствие этого предложена селекция па специализированные линии по ограниченному количеству признаков. В специализированных отцовских линиях селекция ведется на получение высоких показателей мясных и откормочных качеств при умеренных показателях воспроизводительных признаков, селекция в материнских линиях - па высокие воспроизводительные качества при средних показателях мясных и откормочных. Дифференцированная селекция на отцовские и материнские признаки позволила в каждом отдельном случае достичнуть высоких показателей продуктивности, которые при одновременной селекции по всем признакам получить невозможно. При скрещивании же специализированных отцовских и материнских линий в товарном свиноводстве сочетаются высокие воспроизводительные, откормочные и мясные качества. Это происходит потому, что при скрещивании проявляется гетерозис по воспроизводительным качествам (которые обладают невысоким коэффициентом наследуемости), а мясные и откормочные качества передаются в силу их высокой наследуемости.

Как правило, все полученные высокие качества при следующем разведении животных "в себе" исчезают.

Таким образом, в результате скрещивания двух или нескольких специализированных линий одной или нескольких пород, сочетающихся между собой, образуется товарный продукт - внутривидовой и межвидовой гибриды.

Система разведения свиней в массовом свиноводстве должна быть направлена на получение товарной формы гибрида. В связи с этим племенные свиноводческие хозяйства следует дифференцировать по целям и задачам в области селекционно-племенной работы, но подчинять одной общей цели - получению товарного гибрида в промышленном свиноводстве.

В соответствии со сказанным хозяйства делят на следующие категории:

1. Племенные заводы. Это высшая категория хозяйств, задача которых - общее совершенствование породы, выведение новых и совершенствование существующих линий и семейств, создание специализированных линий, выращивание линейного молодняка и реализация в хозяйства низших категорий.

Племенные заводы ведут работу в кооперации с дочерними хозяйствами - племенными совхозами. За каждым племенным заводом должно быть закреплено 2-3 племсовхоза.

2. Племенные совхозы. Задача племенных совхозов - проверка кроссов специализированных линий на сочетаемость и размножение линейного племенного молодняка. Племхозы комплектуют чистопородным линейным ремонтным молодняком (свинками) проверенных сочетаний. Хозяйства третьей категории - племенные фермы и снецовхозы-репродукторы.

3. Племенные фермы и снецовхозы-репродукторы. Эти хозяйства получают кроссы линий и комплектуют ими маточные стада племенных репродукторов комплексов или маточное поголовье товарного репродуктора (если отсутствует племенрепродуктор) кроссбредным чистопородным ремонтным молодняком, полученным от сочетания, перспективных кроссов линии.

4. Племенной репродуктор комплекса. Маточное поголовье племенного репродуктора должно быть чистопородным и состоять из кроссердных животных,

которых осеменяют хряками-производителями материнской специализированной линии или комбинированного направления продуктивности другой породы.

Полученный двухпородный молодняк идет на комплектование основного маточного репродуктора. Очень важно, чтобы маточное поголовье комплекса, т. е. его товарного репродуктора, обладало высокими материнскими качествами.

5. Товарный репродуктор комплекса. Двухпородное маточное поголовье товарного репродуктора осеменяется спермой хряков-производителей третьей породы, обычно мясной, отцовской, специализированной. Полученный грехпородный молодняк сдаают на мясо.

Если же племенной репродуктор комплекса отсутствует, то чистопородное кроссбредное поголовье племенных ферм и спецхозов-репродукторов идет па комплектование товарного репродуктора предприятия и осеменяется хряками мясной специализированной линии другой породы. При этом товарная продукция будет двухпородной.

В Ростовской области разработана система разведения свиней в колхозах и совхозах, которая предусматривает максимальное получение эффекта гетерозиса при использовании свиней крупной белой породы, северокавказской, донского мясного (ДМ-1) и ростовского типов свиней.

Как показали наши исследования, эффект гетерозиса при этом составляет 8-16% по различным показателям.

В товарном свиноводстве области уже много лет используется межпородное скрещивание. Серьезное внимание этой работе уделяется в Тарасовском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Целинском, Константиновском, Песчанокопском и в ряде других районов.

Трест Свинопром начиная с 1975 года широко использует ценные качества свиней типа ДМ-1 в промышленном скрещивании со свиньями крупной белой породы. Для этой цели в совхозах треста имеется более 300 хряков, 4100 свиноматок, 1500 ремонтных свинок типа ДМ-1. Работа проводится в крупных свиноводческих совхозах "Индустрия", "Тарасовский", "Донсвиновод", им. Подтелкова, "Комсомолец", на свинокомплексах "Курский", "Первомайский", "Ростовский". Ежегодно случают 170 тыс. свиноматок крупной белой породы с хряками ДМ-1.

1.6 Лекция 6 (Л-6) Использование мирового генофонда для совершенствования отечественных пород.

1.6.1 Вопросы лекции:

1. Ведение ГПК, издание каталогов.
2. Конкурсы племенных хозяйств.

1.6.2 Краткое содержание вопросов:

1. Ведение ГПК, издание каталогов.

Основной предпосылкой организации племенных книг явилась невозможность вести племенную работу в каждом заводе изолированно, без знания породы в целом, без использования всех ее ресурсов.

Племенные книги и их публикация — это средство объединения заводчиков, проникновение общественных форм в племенное дело, публичный контроль над творческой работой, ведущейся во многих хозяйствах. Без племенных книг нет чистопородного разведения, невозможно достаточно успешно вести обмен производителями. Без племенных книг и их анализа теория разведения не смогла бы перерости из заводского искусства в науку.

Первые племенные книги были опубликованы в Англии для чистокровных верховых лошадей, в 1822 г. — для крупного рогатого скота шортгорнской породы.

В России первая племенная книга (тоже для чистокровных верховых лошадей) опубликована в 1834 г., а в 1839 г. вышел первый том племенной книги орловской рысистой породы. С тех пор племенные книги по этим породам публиковались регулярно. Из племенных книг для животных других видов, кроме публикаций для собак и Харьковской племенной книги для нескольких пород крупного рогатого скота, разводимых на Украине, назвать нечего.

В советский период в работу племенных книг было внедрено несколько ценных нововведений. Племенные книги стали государственными. Издаются они по всем породам лошадей, крупного рогатого скота, овец и свиней. Записывают в племенные книги животных, удовлетворяющих стандарту породы, требованиям I класса бонитировки. В каждой племенной книге, кроме сведений о происхождении, экстерьере, продуктивности и потомстве отдельных животных, производится биометрическая обработка показателей всего записанного поголовья, а в некоторых книгах и глубокий генеалогический анализ пород (В. О. Витта — по орловским рысакам, Д. А. Кисловского — по тяжеловозам, О. В. Гаркави — по костромской породе и т. д.).

Но наряду с достижениями в работе государственных племенных книг в нашей стране много и недостатков, резко снижающих их ценность. К ним относятся нерегулярность публикаций, из-за чего ко дню выхода очередного тома животных, записанных в него, в живых остается мало; загрузка инспекторов другой работой, ведение одним специалистом племенных книг одновременно по разным породам и даже видам животных; запись животных без специальной их оценки в натуре крупным знатоком породы. Все это приводит к тому, что многое в такой важной работе выполняется формально.

Кроме обычных племенных книг, в ряде стран ведутся книги для особо продуктивных животных, например «Золотая книга» в Швейцарии, «Адвансед реджистер» — в США. В России также было издано несколько выпусков «Элитной племенной книги», в которую записывались животные классов элита и элита-рекорд.

Запись в племенную книгу повышает и денежную стоимость животного, так как дает известную гарантию в чистопородности и племенной ценности. Этим создается материальный стимул для углубленной племенной работы.

Неотъемлемый элемент работы с породой, который позволяет оценить состояние породы и историю ее развития, — книги племенных животных. В России первая книга племенных животных по орловской рысистой породе вышла в 1836 г. В книги племенных животных вносят следующие сведения о племенном животном: лату рождения, породу и породность, родословную, данные продуктивности, промеры, оценку за экстерьер, комплексный класс, оценку по потомству, племенную категорию и т. д.

Анализ книг племенных животных помогает установить особенности работы с породой, эффективность использования инбридинга, сочетаемость линий, удачные варианты подбора. В 1996 г. утверждено Положение о Государственной книге племенных животных (ГКПЖ). Крупный рогатый скот. Молочно-мясные породы, которым установлена государственная регистрация племенных животных путем внесения записей в ГКПЖ. Эти животные должны иметь: идентификационные номера в соответствии с государственной системой мечения и идентификации племенных животных, официальное подтверждение происхождения (мать, отец); достоверные сведения о племенных и продуктивных качествах; быть чистопородными. Обязательной записи в ГКПЖ подлежат нее племенные быки, принадлежащие организациям по искусенному осеменению; быки, сперма которых получена по импорту; все коровы, отобранные государственными органами по управлению племенным животноводством в группы матерей быков и в группы потенциальных матерей быков.

В племенном деле заводские и племенные книги имеют очень большое значение. Заводские книги составляют в хозяйстве на основе бонитировки. В них записывают

сведения о происхождении лошади, экстерьере, работоспособности и ежегодно результаты племенной деятельности.

В заводскую книгу заносят все важнейшие изменения в жизни племенного животного — изменение класса бонитировки, установление новых рекордов. По материалам заводской книги выдают документы при продаже лошади из хозяйства, при занесении в племенные книги.

Молодняк, получаемый в хозяйстве, заносят в книгу приплода, в которой отмечается время рождения жеребенка, его кличка, происхождение, масть, приметы, вес и промеры жеребенка, которые берутся в три дня, три месяца, шесть месяцев, в 1, 1,5, 2, 2,5, 3,5 года. В книге отмечают движение молодняка — перевод его в производящий состав, продажа, выбраковка и пр. Заводские книги ведутся зоотехником. Они необходимы для правильной организации племенной работы.

Племенные книги делятся на государственные и районные. Задачей племенных книг является регулярное отражение состояния породы. В них записывают происхождение лошадей, их работоспособность, особенности экстерьера, результаты племенной деятельности и дальнейшее назначение использования.

Племенные книги дают возможность, учитывая опыт племенной работы, совершенствовать породу, вести планово и целеустремленно отбор и подбор. В России первая племенная книга лошадей была издана в 1839 г. и называлась «Подробные сведения о конских заводах России». В настоящее время издаются раздельно Государственные племенные книги жеребцов и кобыл.

В них заносят приплод кобыл за период от издания предыдущей книги до выхода новой. Издаются время от времени добавления к Государственным племенным книгам, в которые включают приплод кобыл. В Государственную племенную книгу вписывают всех чистопородных лошадей следующих пород: чистокровной верховой, арабской, терской, донской, буденновской, ахал-текинской, иомудской, карабаирской, локайской, кабардинской, орловской и русской рысистых, советской и русской тяжеловозных, торийской, владимирской, латвийской упряжной и першеронской.

Особенное значение имеет ведение племенной книги лошадей новых пород. В книгу записывают всех лошадей новой породы, что облегчает дальнейшую работу по ее совершенствованию.

Чистопородными признают лошадей, родители которых занесены в том I племенной книги новой породы. Во вводной главе племенных книг даются подробная характеристика состояния породы, положения о племенной работе.

Племенные книги являются необходимым пособием для работы зоотехника-коневода. Наряду с ГКПЖ издают книги высокопродуктивных животных определенной породы, каталоги племенных производителей. Центральная станция по искусственноому осеменению сельскохозяйственных животных ежегодно издает каталог племенных быков, которых содержат на станции. В каталоге имеется информация о племенной ценности каждого быка и его племенной категории.

Большое значение для обмена опытом имеют выставки и выводки племенных животных. Это, прежде всего, пропаганда достижений в области племенного животноводства, оценки работы племенных хозяйств. Выставки могут быть всероссийские и региональные. Примерами могут служить ежегодно проводимая на ВВЦ всероссийская выставка племенных животных «Золотая осень» и региональная выставка племенных животных «Звезды Подмосковья» в одном из хозяйств Московской области, совмещенная с аукционом. На выставке эксперты оценивают животных, определяют чемпионов выставки и животных, занявших призовые места. За лучшие показатели хозяйствам к передовикам животноводства присуждают награды и премии.

Выводки имеют обычно местное значение. Основная их цель — показать лучших животных. Например, Центральная станция по искусственному осеменению

сельскохозяйственных животных ежегодно проводит выводку племенных быков. принадлежащих станции, чтобы ознакомить специалистов, ученых, селекционеров племенных заводов с племенной ценностью вновь поступивших быков, а также с уже имеющимися на станции. Это помогает более правильно подобрать племенного быка к маточному поголовью.

2. Конкурсы племенных хозяйств.

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 377 г. Москва "Об утверждении Административного регламента Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации племенных стад и ведению государственного племенного регистра" Зарегистрирован в Минюсте РФ 29 ноября 2011 г. Регистрационный N 22442

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента 1.1. Административный регламент Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации племенных стад и ведению государственного племенного регистра (далее - Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) по государственной регистрации племенных стад и ведению государственного племенного регистра, а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России), его должностными лицами, взаимодействия Минсельхоза России с заявителями при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей

2. При предоставлении Минсельхозом России государственной услуги по государственной регистрации племенных стад и ведению государственного племенного регистра заявителями могут быть: юридические лица, осуществляющие разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) в селекционных целях, а также оказание услуг в области племенного животноводства, являющиеся организациями, осуществляющими деятельность в области племенного животноводства, которым принадлежат племенные стада; физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени юридических лиц.

Требования к порядку информирования о предоставлении государственных услуг

3. Место нахождения Минсельхоза России: 107139, г. Москва, Орликов пер., д. 1/11.

График работы Минсельхоза России:

понедельник - четверг - с 9.00 до 12.00, с 12.45 до 18.00

пятница - с 9.00 до 12.00, с 12.45 до 16.45

суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни - выходные.

4. Информация о месте нахождения и графиках работы Минсельхоза России, его структурных подразделениях можно получить по справочным телефонам, на официальном сайте Минсельхоза России в сети Интернет, по электронной почте, на стенде в месте предоставления государственной услуги, в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

Справочные телефоны структурного подразделения Минсельхоза России: 8 (495) 607-80-00, 607-85-86.

Телефон-автоинформатор отсутствует.

Адрес официального сайта Минсельхоза России в сети Интернет: <http://www.mcx.ru>.

Адрес официального сайта федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)":
<http://www.gosuslugi.ru>.

Адрес электронной почты Минсельхоза России: info@plem.mcx.ru.

Блок-схема предоставления государственной услуги по государственной регистрации племенных стад и ведению государственного племенного регистра приведена в приложении N 1 к Административному регламенту.

5. Информация заявителям по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе ее предоставления предоставляется уполномоченными государственными гражданскими служащими Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России.

6. Информация о месте нахождения, графике работы, адресах официальных сайтов, адресах электронной почты, номерах справочных телефонов структурных подразделений Минсельхоза России размещается:

на официальном сайте Минсельхоза России в сети Интернет <http://www.mcx.ru>;
в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": <http://www.gosuslugi.ru>;
на информационном стенде, находящемся в помещении Минсельхоза России по адресу:
г. Москва, Орликов пер., д. 1/11.

II. Стандарт предоставления государственных услуг

Наименование государственной услуги

7. Государственная услуга по государственной регистрации племенных стад и ведению государственного племенного регистра.

Наименование федерального органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу

8. Полномочия по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации племенных стад и ведению государственного племенного регистра (далее - государственная услуга) осуществляются Минсельхозом России.

9. Взаимодействие с другими государственными органами и организациями при предоставлении государственной услуги Минсельхоз России не осуществляется.

10. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных услуг и связанных с обращением в иные государственные, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации (пункт 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" <*>, подпункт "б" пункта 14 Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 <**>).

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587.

<**> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, ст. 5032.

Описание результата предоставления государственной услуги

11. Результатом предоставления государственной услуги является:

- 1) выдача свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре сроком на 5 лет;
- 2) внесение изменений в государственный племенной регистр;
- 3) уведомление заявителя об отказе в предоставлении государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи (направления)

документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги

12. Срок предоставления государственной услуги - 30 дней со дня регистрации заявления заявителя в Минсельхозе России.

13. Приостановление предоставления государственной услуги не предусмотрено.

14. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственных услуг, - 16 дней с момента принятия решения.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

15. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) (источник официального опубликования (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 27, ст. 3122; N 45, ст. 5147; 2010, N 8, ст. 777; N 9, ст. 899, ст. 41, ст. 5188);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (источник официального опубликования (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587);

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (источник официального опубликования (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060; 2010, N 27, ст. 3410; N 31, ст. 4196);

Федеральный закон от 3 августа 1995 г. N 123-ФЗ "О племенном животноводстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 32, ст. 3199; 2003, N 2, ст. 167; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 52, ст. 5497; 2007, N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; 2008, N 29, ст. 3418; 2011, N 1, ст. 32; N 30, ст. 4590, ст. 4596);

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 "О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации" (источник официального опубликования (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983; N 32, ст. 3791; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 150; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119, 1121; N 27, ст. 3364; N 33, ст. 4088; 2010, N 4, ст. 394; N 5, ст. 538; N 16, ст. 1917; N 23, ст. 2833; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251, 4262; N 32, ст. 4330; N 40, ст. 5068; 2011, N 6, ст. 888; N 7, ст. 983; N 12, ст. 1652; N 14, ст. 1935; N 18, ст. 2649; N 22, ст. 3179; N 36, ст. 5154).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления

16. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в Минсельхоз России лично, по почте, в электронной форме запрос о предоставлении государственной услуги: при регистрации племенного стада в государственном племенном регистре по форме согласно приложению N 2 к Административному регламенту;

при изменении вида организации по племенному животноводству по форме согласно приложению N 3 к Административному регламенту;

при ликвидации племенного стада по форме согласно приложению N 4 к Административному регламенту.

В случаях истечения срока действия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре или наличия технических ошибок в сведениях о племенных стадах в государственном племенном регистре внесение записей об изменениях в сведения государственного племенного регистра производится без представления документов организацией, осуществляющей деятельность в области племенного животноводства.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

17. Для предоставления государственных услуг предоставление документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, не требуется.

18. Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении Минсельхоза России, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" <*>.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги

19. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, являются непредставление или представление запросов о предоставлении государственной услуги по форме, не предусмотренной Административным регламентом.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги

20. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не имеется.

21. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги является представление документов заявителем, в соответствии с которыми:

заявитель не является организацией, осуществляющей деятельность в области племенного животноводства: племенным заводом, племенным репродуктором, генофондным хозяйством, организацией по искусенному осеменению или другой организацией, осуществляющей деятельность в области племенного животноводства; запрос о предоставлении государственной услуги подписан не уполномоченным лицом, согласно п. 2 настоящего Административного регламента;

в соответствии с п. 19 Административного регламента принято решение об отказе в приеме документов.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги

22. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе сведений о документах (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, не имеется.

23. Организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, не имеется.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

24. Предоставление государственной услуги осуществляется без взимания государственной пошлины и иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

25. Необходимость предоставления государственных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствует.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги

26. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги не должен превышать 30 минут.

27. Срок ожидания заявителя в очереди при получении результата о предоставлении государственной услуги не должен превышать 30 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме

28. Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистрируется Департаментом животноводства и племенного дела Минсельхоза России в течение 3 дней с момента его поступления в Минсельхоз России.

При регистрации запроса о предоставлении государственной услуги ему присваивается входящий номер.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг

29. Предоставление государственной услуги осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфорtnым условиям заявителей (в том числе для лиц с ограниченными возможностями) и оптимальными условиями работы государственных служащих с заявителями.

30. Для заявителей должны быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта до помещения, в котором предоставляется государственная услуга (не более 10 минут пешком).

31. На территории, прилегающей к месторасположению Минсельхоза России, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

32. Вход в помещение Минсельхоза России должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок.

33. На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:

наименование Минсельхоза России;

место нахождения и юридический адрес;

номера телефонов для справок.

Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.

34. Места ожидания и приема заявителей в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

35. Места ожидания и приема заявителей оборудуются информационными стендами, на которых размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих отношения по предоставлению государственной услуги; текст Административного регламента; место нахождения, график (режим) работы, номера телефонов, адреса электронной почты Минсельхоза России, по которым заявители или их представители могут получить необходимую информацию; порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги; порядок получения консультаций; списки контактных телефонов подразделений Минсельхоза России, осуществляющих административные процедуры; перечни документов, необходимые для предоставления государственной услуги; образцы оформления документов, необходимых для исполнения государственной услуги;
таблица сроков предоставления государственной услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур, в том числе времени нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов и т.д.;
основания отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок и сроки обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих государственную услугу.

36. В местах ожидания и приема устанавливаются стулья для заявителей, выделяется место для оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями.

37. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки документов.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

38. Основными показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются количество жалоб от заявителей о нарушениях установленных Административным регламентом сроков предоставления государственной услуги, а также количество заявлений в суд по обжалованию действий и решений Минсельхоза России, принимаемых при предоставлении государственной услуги.

38.1. Качество предоставления государственной услуги определяется как отношение количества поступивших заявлений об исправлении технических ошибок к общему количеству заявлений о предоставлении государственной услуги за отчетный год.

38.2. Доступность государственной услуги в электронном виде определяется как отношение количества рассмотренных запросов о предоставлении государственной услуги, представленных с использованием сетей связи общего пользования в форме электронных документов, к общему количеству заявлений, рассмотренных за отчетный период.

38.3. Соблюдение сроков предоставления государственной услуги определяется: как отношение количества запросов о предоставлении государственной услуги, исполненных с нарушением сроков, к общему количеству рассмотренных заявлений за отчетный период; как отношение количества запросов о предоставлении государственной услуги, представленных с использованием сетей связи общего пользования в форме электронных документов, и исполненных с нарушением сроков, к общему количеству рассмотренных заявлений, представленных с использованием сетей связи общего пользования в форме электронных документов, за отчетный период.

38.4. Жалобы граждан по вопросам предоставления государственной услуги.

Определяется как количество обоснованных жалоб граждан на качество и доступность государственной услуги, поступивших в Минсельхоз России к общему количеству осуществленных действий за отчетный год.

38.5. Обжалование в судебном порядке действий по предоставлению государственной услуги.

Определяется как отношение количества удовлетворенных судами требований (исков, заявлений) об обжаловании действий Минсельхоза России к общему количеству осуществленных действий за отчетный период.

38.6. Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственной услуги определяется путем присвоения рейтинга в рамках общественного мониторинга.

38.7. Полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления государственной услуги определяется путем присвоения рейтинга в рамках общественного мониторинга.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме

39. В любое время с момента предоставления запроса о предоставлении государственной услуги заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения государственной услуги по телефону, электронной почте, в сети Интернет или на личном приеме.

В многофункциональных центрах предоставление государственной услуги не осуществляется.

40. При информировании заявителя по устному обращению и по телефону предоставляется информация по следующим вопросам: о нормативных правовых актах, на основании которых предоставляется государственная услуга; о входящем номере зарегистрированного запроса о предоставлении государственной услуги; о ходе предоставления государственной услуги.

Время разговора не должно превышать 10 минут.

Если специалист, принявший звонок, не может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу Министерства или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Информирование по иным вопросам осуществляется на основании письменного обращения.

По письменным обращениям и обращениям, направленным по электронной почте, заявитель информируется устно по телефону или письменно посредством почты (электронной почты) в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации в Министерстве письменного обращения.

41. Заявителю в целях получения государственной услуги посредством использования официального сайта Минсельхоза России и в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" обеспечивается возможность:

представления документов в электронном виде;
 осуществления копирования форм запросов (заявлений) и иных документов, необходимых для получения государственной услуги в электронном виде;
 получения заявителем сведений о ходе предоставления государственной услуги;
 получения электронного сообщения Минсельхоза России, в случае обращения за предоставлением государственной услуги в форме электронного документа,

подтверждающего прием запроса о предоставлении государственной услуги к рассмотрению.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

42. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 1) проверка ответственным исполнителем формы представленного запроса о предоставлении государственной услуги на соответствие Административному регламенту; 2) регистрация запроса о предоставлении государственной услуги, поступившего от заявителя, или объяснение причин отказа в приеме документов; 3) рассмотрение запроса заявителя о предоставлении государственной услуги. При регистрации племенного стада в государственном племенном регистре:

4) регистрация племенного стада в государственном племенном регистре или уведомление заявителя об отказе в предоставлении государственной услуги;

5) подготовка свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре и уведомление заявителя о необходимости явиться для получения свидетельства о регистрации в государственной племенном регистре.

в случае изменения вида организации по племенному животноводству:

6) внесение изменений в государственный племенной регистр или уведомление заявителя об отказе в предоставлении государственной услуги;

7) подготовка свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре и уведомление заявителя о необходимости явиться для получения свидетельства о регистрации в государственной племенном регистре.

в случае ликвидации племенного стада:

8) подготовка и издание приказа Минсельхоза России о внесении изменений в приказ Минсельхоза России об определении вида организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства, или направление уведомления заявителю об отказе в предоставлении государственной услуги;

9) внесение изменений в государственный племенной регистр;

10) уведомление заявителя об исключении стада из государственного племенного регистра.

в случаях истечения срока действия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре или наличия технических ошибок в сведениях о племенных стадах в государственном племенном регистре:

11) внесение изменений в государственный племенной регистр.

42.1. Проверка ответственным исполнителем формы представленного запроса о предоставлении государственной услуги на соответствие Административному регламенту.

Запрос о предоставлении государственной услуги подается заявителем для регистрации в государственном племенном регистре принадлежащего ему племенного стада или внесении изменений в ранее внесенную запись в государственном племенном регистре. Основанием для начала административной процедуры является предоставление в Минсельхоз России заявителем запроса о предоставлении государственной услуги согласно пункту 16 Административного регламента.

Заявитель вправе при подаче запроса о предоставлении государственной услуги использовать образцы документов, размещенные в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, запросы о предоставлении государственной услуги и иные необходимые для предоставления государственной услуги документы могут подаваться в форме

электронных документов с использованием сетей связи общего пользования, в том числе: посредством отправки через "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"; через официальный сайт Минсельхоза России; посредством отправки электронной почтой по адресу Минсельхоза России. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России (далее - ответственный исполнитель). При поступлении запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе при поступлении в электронной форме, ответственный исполнитель в течение 1 дня проверяет его форму на соответствие форме, предусмотренной Административным регламентом. При поступлении запроса о предоставлении государственной услуги в электронном виде ответственный исполнитель распечатывает его на бумажном носителе.

42.2. Регистрация запроса о предоставлении государственной услуги, поступившего от заявителя, или объяснение причин отказа в приеме документов.

Основанием для начала административной процедуры является принятие решения ответственным исполнителем о соответствии или не соответствии представленного заявителем запроса о предоставлении государственной услуги на соответствие форме, предусмотренной Административным регламентом.

При соответствии представленного запроса о предоставлении государственной услуги форме, предусмотренной Административным регламентом, он регистрируется в ответственном Департаменте ответственным за делопроизводство должностным лицом, в срок, установленный пунктом 28 Административного регламента.

В случае несоответствия запроса о предоставлении государственной услуги форме, предусмотренной Административным регламентом, заявитель уведомляется об отказе в приеме документов и в предоставлении государственной услуги с объяснением причин отказа в приеме документов и возможностей устранения недостатков в письменной форме.

В случае уведомления об отказе в приеме документов в письменной форме ответственный исполнитель оформляет уведомление на бланке ответственного Департамента, которое подписывает директор или заместитель директора ответственного Департамента.

Уведомление об отказе в приеме документов подлежит регистрации в системе делопроизводства ответственного Департамента в течение 1 дня с момента подписания. Уведомление об отказе в приеме документов направляется заявителю по почте не позднее 3 дней со дня его регистрации.

42.3. Рассмотрение запроса о предоставлении государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел ответственного Департамента зарегистрированного запроса о предоставлении государственной услуги.

Ответственный исполнитель в течение 3 дней после регистрации рассматривает запрос на правильность заполнения документов, полноту сведений, содержащихся в запросе. По итогам рассмотрения заявки о регистрации в государственном племенном регистре принимается решение о предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги.

Принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги осуществляется на принципах защиты государством прав на объекты интеллектуальной собственности, прав и законных интересов российских производителей и потребителей, оперативности, гласности, недопустимости причинения вреда третьим лицам, недопущения необоснованного увеличения сроков и неоправданных задержек в предоставлении государственной услуги.

При регистрации племенного стада в государственном племенном регистре:

42.4. Регистрация племенного стада в государственном племенном регистре или уведомление заявителя об отказе в предоставлении государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятие положительного или отрицательного решения ответственным исполнителем о правильности заполнения представленного запроса и полноте сведений, содержащихся в нем, согласно приложениям N 2 - 4 к Административному регламенту.

При принятии положительного решения о регистрации племенного стада в государственном племенном регистре ответственный исполнитель в течение 3 дней вносит в государственный племенной регистр соответствующие записи.

При регистрации племенных стад в государственный племенной регистр вносятся следующие данные: наименование организации, осуществляющей деятельность в области племенного животноводства; адрес места нахождения; вид организации, осуществляющей деятельность в области племенного животноводства; дату и номер приказа Минсельхоза России об определении вида организации по племенному животноводству; вид и порода (тип) разводимых животных; данные о количественных и качественных показателях племенного стада; дату регистрации; номер свидетельства о регистрации.

При внесении записей в государственный племенной регистр племенному стаду организации по племенному животноводству присваивается уникальный идентификационный номер (код).

При принятии отрицательного решения в случаях, установленных пунктом 16 Административного регламента, в предоставлении государственной услуги ответственный исполнитель в течение 5 дней готовит уведомление заявителю об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин.

Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги оформляется ответственным исполнителем на бланке ответственного Департамента, которое подписывает директор или заместитель директора ответственного Департамента.

Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги подлежит регистрации в системе делопроизводства ответственного Департамента в течение 1 дня с момента подписания.

Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги направляется заявителю по почте не позднее 3 дней со дня его регистрации.

42.5. Подготовка свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре и уведомление заявителя о необходимости явиться для получения свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре.

Основанием для начала административной процедуры является регистрация племенного стада в государственном племенном регистре.

В течение 5 дней со дня регистрации племенного стада в государственном племенном регистре ответственный исполнитель оформляет свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре и уведомляет в устной форме заявителя о необходимости явиться для получения свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре. Срок действия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре - 5 лет. В случае изменения вида организации по племенному животноводству:

42.6. Внесение изменений в государственный племенной регистр или подготовка уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятие положительного или отрицательного решения ответственным исполнителем о правильности заполнения представленного запроса и полноте сведений, содержащихся в нем, согласно приложениям N 2 - 4 к Административному регламенту.

При принятии положительного решения о внесении изменений в государственный

племенной регистр ответственный исполнитель в течение 3 дней вносит в государственный племенной регистр соответствующие записи.

В случаях, установленных пунктом 16 Административного регламента, в течение 5 дней ответственный исполнитель готовит проект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин.

Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги оформляется ответственным исполнителем на бланке ответственного Департамента и подписывает его директором или заместителем директора ответственного Департамента.

Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги подлежит регистрации в системе делопроизводства ответственного Департамента в течение 1 дня с момента подписания.

Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги направляется заявителю по почте не позднее 3 дней со дня его регистрации.

42.7. Подготовка свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре и уведомление заявителя о необходимости явиться для получения свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре.

Основанием для начала административной процедуры является внесение изменений в государственный племенной регистр.

В течение 5 дней со дня внесения изменений в государственный племенной регистр ответственный исполнитель оформляет свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре и уведомляет в устной или письменной форме заявителя о необходимости явиться для получения свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре.

В случае ликвидации племенного стада:

42.8. Подготовка и издание приказа Минсельхоза России о внесении изменений в приказ Минсельхоза России об определении вида организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства, или направление уведомления заявителю об отказе в предоставлении государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятие положительного или отрицательного решения ответственным исполнителем о предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги.

При принятии положительного решения о предоставлении государственной услуги ответственный исполнитель готовит проект приказа Минсельхоза России о внесении изменений в приказ Минсельхоза России об определении видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства, в установленном порядке.

Срок подготовки проекта приказа о внесении изменений в приказ Минсельхоза России об определении видов организаций по племенному животноводству не должен превышать 12 дней со дня принятия положительного решения о внесении изменений в государственный племенной регистр.

Приказ Минсельхоза России о внесении изменений в приказ Минсельхоза России об определении видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства, подписывается Министром сельского хозяйства Российской Федерации или лицом, его замещающим.

В случаях, установленных пунктом 16 Административного регламента, в течение 5 дней ответственный исполнитель готовит проект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин.

Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги оформляется ответственным исполнителем на бланке ответственного Департамента, подписывается директором или заместителем директора ответственного Департамента, регистрируется в

делопроизводстве ответственного Департамента и направляется заявителю.

42.9. Внесение изменений в государственный племенной регистр.

Основанием для начала административной процедуры является издание приказа Минсельхоза России о внесении изменений в приказ Минсельхоза России об определении видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства.

В течение 5 дней со дня после издания приказа Минсельхоза России о внесении изменений в приказ Минсельхоза России об определении видов организаций в государственный племенной регистр ответственный исполнитель вносит соответствующие изменения в государственный племенной регистр.

42.10. Подготовка уведомления об исключении заявителя из государственного регистра.

Основанием для начала административной процедуры является внесение ответственным исполнителем соответствующих изменений в государственный племенной регистр.

В течение 5 дней ответственный исполнитель готовит проект уведомления об исключении заявителя из государственного регистра.

Уведомление об исключении заявителя из государственного регистра оформляется ответственным исполнителем на бланке ответственного Департамента, которое подписывает директор или заместитель директора ответственного Департамента.

Уведомление об исключении заявителя из государственного регистра в предоставлении государственной услуги подлежит регистрации в системе делопроизводства ответственного Департамента в течение 1 дня с момента подписания.

В случаях истечения срока действия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре или наличия технических ошибок в сведениях о племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре

42.11. Внесение изменений в государственный племенной регистр.

В течение 3 дней с момента истечения срока действия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре или выявления технических ошибок в сведениях о племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, ответственный исполнитель вносит соответствующие изменения в государственный племенной регистр.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятию ими решений

48. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и сроков исполнения административных процедур по предоставлению государственной услуги осуществляется постоянно государственными служащими, ответственными за выполнение административных действий, входящих в состав административных процедур, а также путем проведения Министром сельского хозяйства Российской Федерации, его заместителем, директором ответственного Департамента проверок исполнения государственными служащими положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

49. Для текущего контроля используются сведения, имеющиеся в электронной базе данных, служебная корреспонденция, устная и письменная информация государственных служащих, осуществляющих выполнение административных действий, входящих в состав административных процедур, книги учета соответствующих документов и др. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

50. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) государственных служащих Минсельхоза России.

51. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы Минсельхоза России) и внеплановыми. Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя.

В зависимости от состава рассматриваемых вопросов могут проводиться комплексные и тематические проверки.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги может быть сформирована комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие Минсельхоза России и должностные лица, иные работники подведомственных Минсельхозу России организаций.

Результаты проверки оформляются в акте, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Ответственность должностных лиц федерального органа исполнительной власти за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

52. Ответственность государственных гражданских служащих за выполнение административных действий, входящих в состав административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

53. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

54. Контроль за рассмотрением своих запросов (заявлений) могут осуществлять заявители на основании полученной в Минсельхозе России информации.

Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке предоставления государственной услуги, а также направлять замечания и предложения по улучшению качества предоставления государственных услуг.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц

55. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) Минсельхоза России и его должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке.

56. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является нарушение порядка осуществления административных процедур, указанных в разделе III Административного регламента, а также других требований и положений Административного регламента.

57. Основаниями для приостановления рассмотрения жалобы являются необходимость направления запроса в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления или другие организации.

58. Случай, в которых ответ на жалобу неается: 1) не указана фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю в течение семи дней со дня регистрации в случае, если прочтению поддается его фамилия и почтовый адрес;

3) если в обращении обжалуется судебное решение. Такое обращение возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;

4) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;

5) если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, Минсельхоз России вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;

6) если в письменной жалобе содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор ответственного Департамента либо уполномоченное на то лицо должен принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Министерство. О данном решении уведомляется лицо, направившее жалобу.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершающем или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Заявителю должно быть сообщено о невозможности рассмотрения обращения в десятидневный срок со дня его получения и регистрации.

59. Основаниями для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение, направленное в Минсельхоз России, на имя Министра сельского хозяйства Российской Федерации или на имена его заместителей или директора ответственного Департамента.

Обращение заявителя в письменной форме должно содержать следующую информацию: наименование государственного органа, в который направляется письменное обращение, либо должность, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ либо уведомление о переадресации обращения; суть предложения, заявления или обжалуемого решения, действия (бездействия); личная подпись заявителя и дата.

Дополнительно в обращении могут указываться причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых получатель государственной услуги считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требования (об отмене решения, о признании незаконным действия (бездействия)), а также иные сведения.

К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства. В таком случае в обращении приводится перечень прилагаемых к нему документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения обращения, отсутствуют, решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.

60. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

61. Заявитель имеет право обжаловать действия (бездействие) государственных служащих Минсельхоза России Министру сельского хозяйства Российской Федерации, его заместителю.

62. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 30 дней с момента регистрации обращения в Министерстве.
63. По результатам рассмотрения обращения на действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предусмотренную Административным регламентом государственную услугу, и их непосредственных руководителей Министерства:
признает правомерными действия (бездействие) и решения указанных лиц и отказывает в удовлетворении жалобы;
признает действия (бездействие) и решения указанных лиц неправомерным и определяет меры, которые должны быть приняты в целях устранения допущенных нарушений либо условий по совершению подобных действий (бездействия) в ходе административных процедур, предусмотренных Административным регламентом.
Результат досудебного обжалования сообщается заявителю в виде письменного ответа, подписываемого ответственным должностным лицом.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, направляется заявителю.

1.7 Лекция 7 (Л-7) Использование мирового генофонда для совершенствования отечественных пород. (в интерактивной форме)

1.7.1 Вопросы лекции:

1. Апробация селекционных достижений.
2. Отличимость, однородность, стабильность

1.7.2 Краткое содержание вопросов:

1. Апробация селекционных достижений.

Основанием для подведения итогов работы по созданию селекционного достижения являются следующие данные:

1. Требуемое число племенных чистопородных животных и животных гибридного происхождения от межвидового скрещивания одновременно приводится в табл. 14.
2. По всем видам животных поголовье в каждой заводской линии соответствует установленным требованиям к ее численности (табл. 15).
3. Наличие достаточного числа племенных хозяйств и ферм (репродукторов) в государственных предприятиях по разведению сельскохозяйственных животных апробируемых пород, породных групп, типов, линий, комплексов сочетающихся линий.
4. Минимальное наличие структурных единиц в представляемых к апробации селекционных достижениях на момент аprobации: в птицеводстве в новой породе должно быть не менее 6 заводских линий и 100 семейств; в новой породной группе - не менее 3 заводских линий и 60 семейств; в новой заводской линии - не менее 20 семейств; в новом комплексе сочетающихся заводских линий - не менее 2 заводских линий и 40 семейств.
5. Наличие у сельскохозяйственных животных апробируемой породы или ее структурной единицы продуктивных, экстерьерных, биологических, хозяйственных и других свойств, по которым они превосходят разводимые в этой зоне породы, породные группы, типы, линии, комплексы сочетающихся заводских линий того же направления продуктивности животных или отличаются по этим свойствам от других пород, породных групп, типов, линий, комплексов сочетающихся заводских линий.
6. Стойкая передача потомству продуктивных, экстерьерных и других свойств при межпородном скрещивании и межпородных кроссах сочетающихся заводских линий.
7. Наличие зоотехнической документации, подтверждающей происхождение, уровень продуктивности и племенные качества животных; описание методов создания новой или улучшенной существующей породы, новой породной группы, внутрипородных (зональных) заводских типов, заводских линий, комплекса сочетающихся заводских линий, а также утвержденные в установленном порядке план племенной работы и

методика работы с породой, породной группой, типом, линией или комплексов сочетающихся заводских линий.

8. Данные о высокой экономической эффективности вновь созданных или улучшенных существующих пород, породных групп, типов, линий, комплексов сочетающихся заводских линий.

Основанием для апробации является превосходство животных апробируемого селекционного достижения над стандартом породы и животными-сверстниками по одному или комплексу селекционируемых свойств, которое должно быть следующим.

14. Число животных, необходимых для апробации селекционных достижений

		Категория сельскохозяйственного достижения			
Вид и пол сельскохозяйственных животных	Вновь созданная или улучшенная существующая порода	Новая породная группа	Новый или улучшенный внутривидовой тип	Новый заводской тип	Новая Заводская линия
1	2	3	4	5	6
Крупный рогатый скот					
Коровы	6000	3000	3000	1000	500
Быки производители	150	100	100	30	10 улучшателей
Свиньи					
Матки основные	5000	3000	3000	500	100
Хряки-производители	500	300	300	50	10 улучшателей
Овцы скороспелых и грубошерстных пород					
Матки	10000	5000	5000	3000	500
Бараны-производители	200	100	100	60	10 улучшателей
Овцы тонкорунных и других пород (кроме каракульских)					
Матки	25000	10000	10000	5000	500
Бараны-производители	500	200	200	60	10 улучшателей
Овцы каракульской породы окрасок бурой, черной, серой					
Матки			5000	3000	500
1	2	3	4	5	6
Бараны-производители			100	60	10 улучшателей
Овцы редких оригинальных пород					
Матки				1000	250
Бараны-производители				20	10 улучшателей
Козы					
Матки	10000	6000	5000	3000	500

Козлы-производители	200	100	100	60	10 улучшателей
Лошади					
Матки	2000	1000	500	200	50
Жеребцы-производители	100	50	25	10	6 улучшателей

Продолжение таблицы 14

1	2	3	4	5	6
Птица					
Куры	40000	12000	12000		3500
Гуси	15000	10000	10000		500
Утки	15000	10000	10000		1000
Индейки и другая птица	15000	10000	10000		1000

15. Число линий для аprobации новых категорий животных

Категория селекционного достижения	Число		
	заводских линий	ветвей в линиях	семейств в линиях
Новая порода	6	12	12
Новая породная группа	3	6	6
Внутрипородный (зональный) тип	3	6	6
Новый заводской тип	2	4	4
Новая заводская линия	-	2	2
Новый комплекс сочетающихся заводских линий	2	4	4

По крупному рогатому скоту молочных и молочно-мясных пород: превосходство по надою молока коров апробируемого селекционного достижения над сверстницами на 10% при одновременном надое сверстниц не ниже 150% стандарта породы; содержание МДЖ в молоке на 10% и белка на 5% выше стандарта породы; скорость доения не ниже 2 кг/мин.; оплата корма молоком, жиром и приростом массы на 10% выше, чем у сверстниц. При аprobации селекционного достижения по одному какому-либо селекционируемому свойству, кроме молочности (скорость доения, оплата корма продукцией, формы телосложения, формы вымени, комолость, устойчивость к отдельным заболеваниям и др.), молочная продуктивность коров должна быть не ниже 150% стандарта породы, а жирность и содержание МДБ в молоке - не ниже стандарта породы.

По крупному рогатому скоту мясных пород: превосходство животных апробируемого селекционного достижения над сверстницами (сверстниками) по энергии роста (прирост массы) на 5%, по массе в 15-мес. возрасте - на 10%, по молочности - на 10% при соответствующих показателях сверстниц (сверстников) на 15% выше стандарта 1-го класса; по затратам корма на единицу прироста массы на 10% ниже, чем у сверстниц (сверстников), при затрате корма на 1 кг прироста с 8-9- до 15-мес. возраста - до 7 корм. ед. При аprobации селекционного достижения по любому другому селекционируемому свойству (экстерьер и конституция, устойчивость к неблагоприятным факторам среды и болезням, комолость и т. д.) уровень энергии роста (прироста массы), масса в 15-мес. возрасте и молочность должны превышать стандарт 1-го класса на 15%.

По свиньям всех групп пород по направлениям продуктивности: превышение требований класса элита животными апробируемого селекционного достижения по энергии роста на

5%; по затрате корма на 1 кг прироста массы меньше на 10%; толщине шпига над 6-7-м грудным позвонком на 15% меньше; превосходство над сверстниками (сверстницами) по массе задней трети туловища на 15%; площадь «мышечного глазка» не менее 35 см², плодовитость не менее 11 жизнеспособных поросят; молочность, определенная на 21-е сут. после рождения поросят, не менее 60 кг. При аprobации селекционного достижения по одному или нескольким селекционируемым признакам (свойствам) другие показатели должны быть не ниже требований класса элиты.

По овцам: селекционные достижения по животным всех пород, кроме романовской и каракульской, аprobируют на фоне продуктивности сверстников (сверстниц), превышающей требования 1-го класса по настигу мытой шерсти на 20%, по массе - на 10%. При этом животные аprobируемого селекционного достижения должны превосходить сверстников (сверстниц) по настигу мытой шерсти на 10%, по массе - на 5%; по овцам курдючных, жирнохвостых и других грубошерстных мясосальных пород превосходство по массе на 20%.

Аprobируемые взрослые животные должны иметь, длину шерсти годичного роста: тонкорунных пород у маток не менее 9 см, баранов - не менее 11 см; мясо- шерстных тонкорунных пород - длинношерстных типа линкольн - у маток не менее 16 см, баранов - не менее 18 см; короткошерстных тонкорунных и полутонкорунных пород - у маток не менее 8,5 см, баранов не менее 9,5 см. Шерсть по тонине и уравненности должна быть характерна для породы при достаточном количестве качественного жиропота; животные должны иметь правильные формы сложения, высокую скороспелость и мясную продуктивность.

По овцам романовской породы селекционные достижения аprobируют при условии соответствия всей аprobируемой группы животных требованиям высшего бонитировочного класса по всем свойствам (признакам) и при наличии качественного своеобразия (статистически достоверного превосходства) по одному или даже целому ряду селекционируемых свойств.

По овцам каракульской породы аprobируют селекционные достижения на животных всех окрасок, оттенков и расцветок жакетного, плоского и ребристого смушковых типов при условии соответствия всей аprobируемой группы требованиям 1-го класса и класса элиты, из них класса элиты не менее 20%; аprobируемые животные должны иметь превосходство по всем свойствам; обладать качественным своеобразием (статистически достоверным превосходством) по одному или ряду селекционируемых свойств.

По козам: селекционируемые достижения по козам пуховых и шерстных пород аprobируют при условии соответствия животных аprobируемой группы требованиям высшего бонитировочного класса по всем свойствам и наличию качественного своеобразия (статистически достоверного превосходства) по одному или даже целому ряду селекционируемых свойств или признаков.

По лошадям: селекционные достижения по лошадям аprobируют при условии соответствия аprobируемой группы требованиям высшего бонитировочного класса по всем признакам и наличию качественного своеобразия (статистически достоверного превосходства) по одному или ряду селекционируемых свойств.

По птицам: селекционные достижения по породе, породной группе, внутрипородному типу, комплексу сочетающихся заводских линий по всем видам птиц аprobируют при условии соответствия аprobируемой птицы (по основным и дополнительным признакам) требованиям класса элиты, а по отдельным заводским линиям требованиям высшего бонитировочного класса и превышение этих требований аprobируемой птицей всех категорий селекционных достижений по одному из следующих и признаков: по яйценоскости на среднефуражную несушку на 5%; по массе яиц на 3%; по массе молодняка в убойном возрасте (для мясной птицы) по курам на 15%, по другим видам птицы на 5%; по комплексу сочетающихся заводских линий уток на 3%.

Птица нового селекционного достижения, аprobируемая по хозяйственно полезным свойствам, не указанным в перечисленных требованиях (устойчивость к заболеваниям, высокие качества яиц, аутосексность и др.), по основным и дополнительным признакам должна быть не ниже 1-го бонитировочного класса.

2. Отличимость, однородность, стабильность.

В дополнение и взамен действующего положения об апробации селекционных достижений принят закон «О селекционных достижениях», которым установлены критерии охраноспособности - новизны, отличимости, однородности и стабильности. В соответствии с Законом Российской Федерации «О селекционных достижениях» поданная заявка на селекционное достижение подлежит рассмотрению в Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений (Госкомиссия) на соответствие заявленного возможного селекционного достижения установленным критериям охраноспособности - новизне, отличимости, однородности и стабильности. Испытания селекционных достижений проводятся в соответствии с «Общими положениями методики по испытанию селекционных достижений на отличимость, однородность и стабильность», утвержденными Госкомиссией при Минсельхозе России 23.12.94 г. № 12-04/2.

Положение по испытанию селекционных достижений в животноводстве уточняет особенности применения в животноводстве указанного выше документа, введено с целью установления единых методических принципов оценки вновь выведенных и улучшенных существующих пород и других селекционных достижений.

Селекционными достижениями в животноводстве являются порода, тип, линия, кросс линий. Охраняемыми в породе являются тип, линия, кросс линий. Селекционным достижением, существенным образом, наследующим признаки другого (исходного) охраняемого селекционного достижения, признается селекционное достижение, которое при явном отличии от исходного: наследует наиболее существенные признаки исходного селекционного достижения или селекционного достижения, которое само наследует существенные признаки исходного селекционного достижения, сохраняя при этом основные признаки, отражающие генотип или комбинацию генотипов селекционного достижения; соответствует генотипу или комбинации генотипов исходного селекционного достижения, за исключением отклонений, вызванных применением таких методов, как индивидуальный отбор из исходной породы, вводное скрещивание, генная инженерия. В целях охраны селекционное достижение может быть представлено как женскими и мужскими особями, так и племенным материалом (гаметы, зиготы, эмбрионы, семя). Поголовье племенных животных, запас гамет или зигот (эмбрионов) в структуре стада должны обеспечивать в перспективе стабильность указанных показателей продуктивности породы на период нахождения ее в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию. Критериями охраноспособности селекционного достижения являются: новизна; отличимость; однородность; стабильность. Селекционное достижение должно явно отличаться от любого другого общезвестного селекционного достижения, существующего к моменту подачи заявки.

Общезвестным селекционным достижением может быть достижение, находящееся в официальных каталогах, справочном фонде или имеющее точное описание в одной из публикаций.

Подача заявки на выдачу патента или на допуск к использованию также делает селекционное достижение общезвестным с даты подачи заявки при условии, что на селекционное достижение был выдан патент или что селекционное достижение было допущено к использованию.

Животные породы, типа, линии, кросса линий должны быть достаточно однородны по своим признакам с учетом отдельных отклонений, которые могут иметь место в связи с

особенностями размножения. Селекционное достижение считается стабильным, если его основные признаки остаются неизменными после неоднократного размножения.

Установление признаков. Об отличимости, однородности и стабильности судят по значениям отдельных признаков. Эти признаки не обязательно являются теми, которые характеризуют хозяйственную полезность селекционного достижения. Признаки должны легко поддаваться точному определению и описанию.

Для обеспечения оценки селекционного достижения на отличимость, однородность и стабильность животные одного вида могут быть сгруппированы по типу продуктивности (например, крупный рогатый скот — молочный, молочно-мясной, мясной; козы - пуховые, шерстные, молочные и т. д.) с приведением эталонных пород по каждой группе.

Признаки, используемые для идентификации селекционных достижений, могут быть качественными или количественными.

Качественные признаки — это признаки, представляющие собой прерывистый дискретный ряд свойств без определения их количества. Некоторые признаки, которые не отвечают этому определению, могут быть также отнесены к качественным при условии, если одно их состояние резко отличается от другого. Качественные признаки могут быть оценены визуально или органолептически или выявлены с помощью специальных методик. Количественные признаки - это признаки, которые можно измерить и которые представляют собой беспрерывный ряд, изменяющийся от одной крайней степени проявления до другой.

Организация испытания. Заявитель обязан представить данные по отличимости, однородности и стабильности всего поголовья, заявляемого в качестве селекционного достижения, в описании селекционного достижения по форме частной методики, утвержденной Госкомиссией. Госкомиссия может принять решение о соответствии селекционного достижения критериям охраноспособности на основании экспертизы представленных заявителем документов. Госкомиссия поручает независимым экспертам проверку достоверности представленных документов с выездом в предприятия - оригинары селекционного достижения. При выполнении задания оценке подлежит все поголовье предприятия, имеющее отношение к данному селекционному достижению, а также первичная зоотехническая документация по учету происхождения, продуктивности, качеству продукции, племенной ценности животных и программы селекционной работы. В случае если экспертиза предоставленных материалом покажет их малую достоверность или сомнительность, Госкомиссия может назначить конкретные испытания селекционного достижения на отличимость, однородность и стабильность по частной методике для каждого вида сельскохозяйственных животных в полном или выборочном объеме. Если заявитель не согласен с решением Госкомиссии, он имеет право его обжаловать в установленном порядке.

В этом случае заявитель обязан представить для испытаний необходимое число животных (племенного материала) по адресу и в сроки, указанные Госкомиссией. Представляемые для испытаний животные должны пройти ветеринарный контроль. Государственные испытания на охраноспособность проводятся в соответствующем научно исследовательском учреждении, контрольно-испытательной станции или в другой независимой организации по учету (контролю) продуктивности и племенной ценности Госкомиссия вправе использовать результаты испытаний, проведенных компетентными органами других государств, с которыми заключены соответствующие договоры, результаты испытаний, проведенных другими организациями Российской Федерации по договору с Госкомиссией.

Сроки и продолжительность государственного испытания определяются характером и степенью проявлении контролируемого признака (признаков) у потомства. При соответствии селекционного достижения критериям охраноспособности, при

соответствии названии селекционного достижения условиям Госкомиссия принимает решение о выдаче патента.

Испытание на отличимость. Селекционное достижение должно явно отличаться по одному или нескольким признакам от любых других селекционных достижений существование которых на момент подачи заявки является общеизвестным. Два селекционных достижения являются отличными, если отличие между ними проявилось по крайней мере в одном месте испытаний, явно выражено и постоянно. В случае чисто качественных признаков разница между двумя селекционными достижениями считается существенной, если соответствующие признаки имеют разное значение выраженности. При испытании качественных признаков на отличимость частота встречаемости значения выраженности признака должна соответствовать требованиям частных методик. Если различие между селекционными достижениями оценивается количественными признаками, то разница признается существенно, если она является достоверной. Если обычно отмечаемый визуально признак является не единственным, по которому можно отличить селекционное достижение, то в случае возникновения сомнений признак необходимо измерить. В любом случае рекомендуется делать непосредственные сравнения двух подобных селекционных достижений (порода с породой, ни, внутри породы тип с типом, линия с линией). При парных сравнениях наиболее простым критерием для установления отличимости является постоянство отличительного признака (значимые различия по одному и тому же признаку). Число сравнений должно быть достаточным для принятия надежного заключения.

Могут возникнуть ситуации, при которых отличие между двумя селекционными достижениями наблюдается по нескольким отдельно оцениваемым признакам или по совмещенным признакам. Для подтверждения отличительных особенностей селекционного достижения могут быть использованы сравнительные данные о группах и других биохимических полиморфных системах крови, генетические маркеры, морфологические, биохимические характеристики, позволяющие достоверно оценить различия между породами. При испытании кроссов линий рассматриваются материалы, подтверждающие отличимость товарной продукции от другой, аналогичной по значению.

Испытание на однородность. Селекционное достижение должно быть в достаточной степени однородным в отношении своих основных признаков. Селекционное достижение считается однородным, если его изменчивость позволяет сделать его описание и идентификацию, а также обеспечивает его стабильность. Однородность селекционного достижения оценивается по отклонениям количественных признаков, выраженных в генотипическом и фенотипическом вариантах. Количество отклоняющихся от среднего форм характеризуется коэффициентом вариации и не должно быть выше уровня, указанного в частной методике, или конкретных признаков. Селекционное достижение считается неоднородным по количественным признакам, если его коэффициент вариации в 1,6 раза превышает средний коэффициент вариации пород, используемых для сравнения. Наличие в потомстве до 50% отклоняющихся по основным признакам особей допускается только в том случае, когда эти признаки являются доминантными при условии, что иной путь воспроизводства неэффективен. Достигнутая однородность специфических признаков не должна снижать однородность по другим показателям, свойственным исходным (эталонным) породам. Степень однородности животных по количественным признакам должна быть адекватна величине коэффициента наследуемости по испытуемым признакам. Степень однородности подтверждается методами популяционной генетики, включая в ряде случаев методы биохимической генетики и иммуногенетики. Уровень гомогенности поголовья должен быть не менее 60%.

Испытание на стабильность. Селекционное достижение должно быть стабильным в отношении своих заявленных признаков и соответствовать своему описанию в конце каждого цикла размножения не менее чем в трех поколениях. При испытании на

стабильность рассмотрению подлежат специфические для селекционного достижения признаки у потомства по материалам, представленным заявителем. Материалы о стабильности обрабатываются и анализируются одновременно с данными об отличимости и однородности.

Частные методы. Положение дает наиболее общие рекомендации, в то время как частные методики (см. прил. 12), утвержденные Госкомиссией, дают конкретные рекомендации в отношении каждого вида сельскохозяйственных животных. Эти рекомендации определяют число предоставляемых животных, условия проведения испытаний и их продолжительность, а также содержат указания в отношении конкретных признаков, за которыми проводятся наблюдения, время испытаний и способ учета.

По просьбе заявителя Госкомиссией могут устанавливаться особые (дополнительные) условия испытания селекционного достижения.

Типы признаков. Чтобы провести испытания и составить описание селекционного достижения, в частных методиках приводятся таблицы признаков, по которым необходимо вести наблюдения. Признаки, отмеченные знаком (*), должны всегда включаться в описание селекционного достижения. Для каждого признака составляется шкала, в которой словесному определению значения выраженности признака присвоен определенный цифровой индекс. Шкалы признака позволяют автоматизировать идентификацию пород (типов, линий, кроссов линий). Для более точной оценки степени выраженности признака в методиках, там, где это возможно, приводятся эталонные селекционные достижения. Некоторые признаки отмечены знаком (+), который указывает, что для данного признака приведены комментарии в главе частной методики «Пояснения и методы».

Признаки в таблице должны быть расположены в порядке их формирования, по периодам роста и развития животного. Качественные признаки и те количественные, которые описываются по типу качественных, индексируются при помощи последовательных чисел в зависимости от степени выраженности, начиная с цифры 1 и без верхнего предела, пример такой индексации приведен в табл. 16.

Построение порядка выраженности признака начинается с наименьшего значения. К оцениваемым качественным признакам селекционного достижения могут быть отнесены: морфологические признаки - масть животного, наличие рогов, величина хвоста, наличие сережек (у свиней ливийской породы), устойчивость (невосприимчивость) к заболеваниям, приспособленность к определенным климатическим условиям, генетические маркеры и т. д.

16. Индексация качественных признаков

Форма вымени (крупного рогатого скота)	козье	1
	округлое	2
	чашеобразное	3
Профиль головы	вогнутый	1
	прямой	2
	горбоносый	3
Характер протекания родов	легкий	1
	трудный	2
	кесарево сечение	3
Цвет жиропота (у овец)	белый	1
	светло-кремовый	2

	кремовый	3
	желтый	4
	коричневый	5

Количественные признаки по степени их проявления объединены таким образом, что слабая и сильная степени выражаются соответственно словосочетанием, например: слабый — сильный, короткий — длинный, маленький — большой. Этим словесным парам даны индексы 3 и 7, а значение «средний» индексируется цифрой 5. Все степени проявления признака представляют полную шкалу индексов от 1 до 9, в соответствии со следующим примером (см. табл. 17).

17. Индексация количественных признаков

Степень проявления	Индекс	Степень проявления	Индекс
Очень слабо	1	От среднего до сильного	6
От очень слабого до слабого	2	Сильное	7
Слабое	3	От сильного до очень сильного	8
От слабого до среднего	4	Очень сильное	9
Среднее	5		

Может использоваться вся шкала (1-9), даже если в частной методике с целью упрощения указаны только некоторые значения, например, только 1, 3, 5, 7, 9 или 3, 5, 7 (табл. 18). По признакам с альтернативным проявлением значение «отсутствует» обозначается цифрой 1, а «имеется» - цифрой 9. Если по признаку необходимо отметить различия между полным его отсутствием и различными степенями выраженности, то этот признак подразделяется на один альтернативный со значением «отсутствует» - 1 и «имеется» - 9 и второй количественный со значением от 1 до 9. Для признаков, у которых невозможно сделать различие между «отсутствует» и «очень слабое», цифра 1 означает «отсутствует или очень слабое» и является первым значением на шкале 1-9 для количественных признаков (табл. 19).

18. Все степени проявления признака представляют полную шкалу индексов

Содержание МДБ в молоке	низкое	3	Продолжительность лактации	короткая	3
	среднее	5		средняя	6
	высокое	7		длинная	7
Ширина спины	узкая	3	Густота шерсти	редкая	3
	средняя	6		средняя	6
	широкая	7		густая	7

К количественным признакам могут быть отнесены: показатели продуктивности - надой молока, живая масса, настриг шерсти, яйценоскость и др., экстерьерные показатели - измерение частей тела и их соотношение, морфологические и биохимические характеристики животных, характеристики сырья, его технологические свойства, оплата корма и другие признаки.

19. Признаки с альтернативным проявлением

Наличие рогов	отсутствуют	1	Длина рогов	короткие	3
	имеются	9		средние	6
				длинные	7

Количественные признаки могут в большей или меньшей степени подвергаться влиянию среды, которая может модифицировать проявление генетически контролируемых признаков. Предпочтительными являются признаки, наименее подверженные влиянию среды.

Значения отдельных признаков могут быть оценены по их соотношению. Например, отношение «длина/ширина». Значения таких относительных оценок должны приниматься в расчет так же, как и значения отдельных признаков.

Пояснения и методы. Этот раздел в частных методиках следует за таблицей признаков и содержит пояснения, рисунки, фотографии и описание методов, которые необходимы для оценки признаков, выделенных знаком (+).

Анкета селекционного достижения. Анкету селекционного достижения заполняют при подаче заявки на выдачу патента по форме, утвержденной Госкомитетом для селекционного достижения в животноводстве.

Анкета должна содержать:

- название вида (русское и латинское);
- имя и адрес заявителя;
- предлагаемое название селекционного достижения;
- происхождение селекционного достижения с указанием метода создания и исходных (родительских) форм;
- условия сохранения признаков селекционного достижения при его воспроизводстве;
- признаки селекционного достижения, характеризующие отличительные особенности;
- название аналогичных селекционных достижений и признаки, по которым они отличаются от заявляемого селекционного достижения;
- особые условия для испытания селекционного достижения на отличимость, однородность и стабильность (если они имеются).

Анкета селекционного достижения подписывается заявителем. Если заявка подается на породу, она должна содержать анкеты на все структурные категории этой породы (см. Методические указания «Законодательство в племенной работе»).

Описание селекционного достижения. К заявке на выдачу патента прилагается описание (идентификация) селекционного достижения по форме, прилагаемой к частной методике.

Описание селекционного достижения должно содержать признаки, позволяющие установить отличимость данного селекционного достижения от других, а также оценить степень его однородности и стабильности в соответствии с частной методикой.

Имеющиеся цифровые данные об отличимости, однородности и стабильности селекционного достижения должны быть обработаны общеизвестными методами биометрической статистики, подтверждающими степень их достоверности.

Заявитель может дать дополнительную информацию об условиях при испытании заявленного селекционного достижения. Описание селекционного достижения должно отражать:

- генетическую экспертизу достоверности происхождения по группам крови;
- направление продуктивности;

- особенности технологии содержания и выращивания;
- особенности воспроизводства;
- данные по основным показателям биологических характеристик заявляемого селекционного достижения, приспособленности к климатическим условиям;
- данные по генетическим маркерам заявляемого селекционного достижения.

Материалы заявителя должны содержать данные об отсутствии (частоте появления) у поголовья известных вредных аномалий, предрасположенности к заболеваниям, факторов, снижающих качество продукции и других генетически обусловленных отклонениях, нежелательных при производстве продукции животноводства.

В описании не допускается употреблять неопределенные выражения, а также сокращения (за исключением общепринятых).

1.8 Лекция 8 (Л-8) Научные достижения крупномасштабной селекции. (в интерактивной форме)

1.8.1 Вопросы лекции:

1. Создание информационной системы в животноводстве России и перспективы применения современных Интернет - технологий в информационных системах АПК РФ.
2. Современные направления в селекции молочного скота и оценке быков-производителей.
3. Системы информационных технологий в молочном скотоводстве (СЕЛЭКС, BLUP).

1.8.2 Краткое содержание вопросов:

1. Создание информационной системы в животноводстве России и перспективы применения современных Интернет - технологий в информационных системах АПК РФ.

Крупномасштабная селекция – это современная система племенной работы, отличительной чертой которой служит изменение масштаба действия системы племенной работы, применение достижений популяционной генетики, использование глубокозамороженной спермы и ЭВМ.

Крупномасштабная селекция применяется на больших группах, составляющих общий массив (популяцию) животных (табл. 1).

Таблица 1

Некоторые отличительные черты традиционной и крупномасштабной селекции.

Традиционная селекция	Крупномасштабная селекция
Функции	
Селекция	Селекция, воспроизводство стада, контроль за использованием продуктивных способностей
Основная цель селекции	
Продуктивность	Продуктивность и эксплуатационные качества
Работа	
С племенным стадом, линиями, семействами	Со всей популяцией, активной частью популяции, быками-лидерами
Селекция – искусство	Селекция – наука
Отбор производителей по предкам	Отбор производителей по качеству потомства
Теоретические предпосылки	

Сочетаемость пар и линий	Популяционная генетика, аддитивная наследственность
Естественное спаривание	Искусственное осеменение
Работу выполняли только специалисты животноводства	В обеспечении крупномасштабной селекции участвуют специалисты разных отраслей народного хозяйства и науки
Приобретение племенных животных	Приобретение гамет и зигот
Ручная обработка данных и ведение племенных книг	Обработка, хранение и анализ данных на компьютере.

Вся система племенной работы в племенных хозяйствах нацелена на увеличение количества реализуемой племенной продукции и повышение ее качества. Остальная продукция животноводства (молоко, мясо, шерсть, яйца и т.д.) является сопутствующей.

На современном этапе развития племенного дела в систему крупномасштабной селекции, например, молочных пород скота входят:

1. Оценка и отбор матерей и отцов ремонтных производителей по единой программе для всей породы, независимо от ее ареала и численности;
2. Выращивание, оценка и отбор ремонтных производителей по развитию, экстерерьеру, показателям воспроизводительной способности и другим признакам;
3. Накопление запаса спермы проверяемых производителей;
4. Оценка производителей по качествам потомства;
5. Регламентация использования спермы проверяемых и оценка по качеству потомства производителей;
6. Создание системы сбора, накопления и обработки данных племенного учета по породе с применением современных компьютерных программ и генетико-математических методов;
7. Использование в селекции достижений биотехнологии: иммуногенетическая аттестация происхождения племенных животных, цитогенетическая оценка производителей, трансплантация эмбрионов и др.

Выполнение мероприятий по крупномасштабной селекции осуществляется по следующей схеме:

- В каждой породе или отдельной зоне ее разведения все племенные хозяйства объединяют в небольшое число групп, в которых отбор и подбор осуществляют по единому плану. Каждую группу племенных стад специализируют на разведении определенных линий, неродственных линиям других групп племенных стад. Отечественный и зарубежный опыт показывает, что для популяции от 100 до 500 тыс. коров таких групп желательно иметь не более 5-6.
- Из каждой группы племенных хозяйств ежегодно выделяют по одному быку-лидеру, спермой которых осеменяют наиболее ценных коров этой же группы для получения от них ремонтных быков. При составлении плана заказного спаривания рекомендуется применять родственное спаривание в различных степенях инбридинга. При осеменение коров товарных стад для получения ремонтных телок применяют аутбридинг с общепринятой ротацией линий или родственных групп;
- Для оценки быков по развитию (с 1 до 12-месячного возраста) и воспроизводительной способности (с 12 до 18-месячного возраста) при головных племпредприятиях создают специальные элеверы;
- Для оценки и отбора быков по оплодотворяющей способности спермой каждого проверяемого производителя в сжатые сроки (в течение 3-6 мес) осеменяют не менее 200-300 коров активной части популяции. В активную часть породной популяции входят племенные хозяйства, а также лучшие товарные стада, в которых проводится

оценка быков по качеству потомства. В дальнейшем это позволяет оценить каждого быка по продуктивности 40-60 и более дочерей. Общее число коров, осеменяемых спермой проверяемых быков, должно составлять около 20-30% активной части породной популяции. Остальных коров активной части и всех коров пассивной части популяции осеменяют спермой быков - улучшателей, отобранных после оценки по качеству потомства.

На каждого проверяемого быка в течение 2-3 лет создается запас спермы до 20 – 30 тыс. доз, затем производителя выбраковывают на мясо. Часть производителей, наиболее высоко оцененных по происхождению, после этого переводят в группу «ожидающих» без дальнейшего накопления банка спермы. Если эти быки окажутся улучшателями, то у них возобновляются взятие спермы и общий спермбанк увеличиваются до 50 – 100 тыс. доз и более.

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что лучший результат по крупномасштабной селекции молочных пород скота можно достичь при следующих параметрах (табл. 2).

Таблица 2

Нормативы для основных мероприятий по крупномасштабной селекции молочных пород скота (размер популяции 100 тыс. коров)

Мероприятия	Значение параметров
Размер активной части популяции коров, % ко всему поголовью	50
Число коров в быкопроизводящих стадах, % ко всему поголовью	10
Число отцов быков, гол.	5-10
Число ремонтных производителей, гол.	100
Число быков-улучшателей, отобранных после оценки по потомству, гол.	20-30
Банк спермы на каждого проверяемого быка, тыс. доз	20 – 30
Число коров активной части популяции, осеменяемых спермой проверяемых быков, %	20-30
Число эффективных дочерей на одного проверяемого быка, гол.	40-60
Ежегодный эффект селекции в расчете на одну корову, кг молока	40-50

В породе со слабо развитой племенной базой и в регионах с недостаточными условиями реализации генетического потенциала скот эффективнее внедрять вариант программы селекции с ограниченным запасом долговременного хранения спермы проверяемых быков с последующим переходом на вариант при условии улучшения племенной базы и условий кормления и содержания животных. Согласно второму варианту, все мероприятия крупномасштабной селекции соблюдаются, за исключением того, что на каждого проверяемого быка создается ограниченный запас спермы (500 – 1000 доз) с целью отбора отцов быков. Молодых производителей, отобранных по племенной ценности родителей, развитию и воспроизводительной способности, начиная с 1,5 – летнего возраста интенсивно используют, не дожидаясь результатов оценки по качеству потомства. После оценки по потомству решается вопрос о дальнейшем использовании этих производителей.

Для повышения эффективности крупномасштабной селекции по породам с широким ареалом целесообразно на базе областей и регионов с развитой племенной базой и удовлетворительными условиями по оценке генетического потенциала скота создавать зональные центры по племенной работе и искусственноому осеменению скота при более рациональном использовании быков-улучшателей. В области (регионе) с развитой племенной базой создается запас спермы от быков-улучшателей для осеменения коров не только своей области (региона), но и других областей (регионов). При этом зону обслуживания одним племобъединением можно увеличить до 1 млн

коров и более. При создании таких центров снижаются затраты на содержание малоценных быков и увеличиваются темпы генетического улучшения скота в результате осеменения коров спермой быков -улучшателей.

В соответствии со схемой крупномасштабной селекции включают следующие мероприятия:

1. Организация поэтапной селекции матерей быков. Среди элитной части племенных коров выделяют группу МБ, предназначенную для получения быков производителей. Для получения одного проверяемого быка требуется 10 потенциальных матерей. Отбор матерей быков проводят в несколько этапов. На ЭВМ по индексу племенной ценности среди первотелок отбирают наиболее высокопродуктивных коров. Затем из этой группы выранжировывают худших животных по содержанию жира и белка в молоке, экстерьеру и воспроизводительной способности и т.д. Индекс племенной ценности потенциальных матерей быков включает также информацию по происхождению. После второй лактации коров – будущих матерей быков – уточняют их племенную ценность и составляют план спаривания с таким расчетом, чтобы проверяемые бычки были получены от них по 3-му отелу и позже.

При отборе матерей быков их тщательно осматривают и оценивают по телосложению, крепости конституции, пригодности к машинному доению, состоянию здоровья и т.д. Учитывают также метод выведения и линейную принадлежность. При такой системе оценки и отбора племенную ценность матерей проверяемых быков возрастает.

2. Отбор нескольких наиболее выдающихся производителей в группу отцов быков ОБ. Согласно программе КС всю породную популяцию разбивают на небольшое число неродственных между собой групп и из каждой группы ежегодно выделяют быка-лидера. Также как и матери быков, отцы быков проходят длительный процесс оценки и отбора по происхождению, собственной продуктивности (скорость роста), спермопродукции и качеству потомства.

3. Составление плана заказного спаривания для получения проверяемых бычков. План осеменения матерей быков спермой отцов быков предусматривает происхождение обеих партнеров из одной родственной группы и применение родственного спаривания в различных степенях инбридинга. Д.А.Кисловский (1965) отмечал, что проверять надо не случайно подвернувшийся материал, выбранный лишь по фенотипу или даже по родословной, а полученный с определенной целью путем соответствующих спариваний и подбора.

План заказного спаривания составляют таким образом, чтобы в течение 3-6 мес отобрать необходимое число проверяемых бычков в соотношении минимум 3:1, т.е. на одного производителя, сперма которого должна использоваться для осеменения коров, должно быть не менее трех проверяемых бычков.

4. Создание элеверов по выращиванию и проверке молодых производителей. Элеверы целесообразно создавать при головных племпредприятиях. Комплектуют элеверы ремонтными бычками в возрасте 1-2 мес.

5. Организация поэтапной оценки проверяемых бычков. Племенные качества проверяемых бычков оценивают по собственным показателям (развитие по живой массе до 12-месячного возраста, телосложение, воспроизводительная способность) и по качеству потомства. Отбор быков по собственным качествам способствует генетическому улучшению скота по скороспелости и крепости конституции. У бычков, отобранных по развитию, оценивают половую активность, количество и качество спермы, способность ее к замораживанию.

От проверяемых бычков получают необходимое для оценки по качеству потомства число дочерей. Контрольное осеменение проводят в возможно короткие сроки, по его результатам быков оценивают также по оплодотворяющей способности их

спермы. В дальнейшем создают необходимый запас замороженной спермы.

На основании оценки быков по качеству потомства решают вопрос об использовании спермы. Сперма быков-улучшателей используют для осеменения коров, а сперму ухудшателей уничтожают. С целью сокращения генерационного интервала и повышения эффективности селекции сперму отобранных быков расходуют для осеменения коров в течение только одного года. В следующем году используют сперму новой партии проверенных и отобранных производителей. Среди быков-улучшателей выделяют быков-лидеров для получения от них ремонтных бычков следующей генерации.

Считается, что в основном генетическое улучшение популяции и ее прогнозирование при КС зависит от интенсивности отбора отцов и матерей быков Темпы генетического прогресса в популяции обусловлены тем, в какой степени используются современные достижения науки и практики при выведении производителей-лидеров.

Как известно процесс передачи генетической информации от родителей к потомкам в популяции осуществляется по 4-м путям передачи генов и интенсивность отбора каждой категории племенных животных неодинакова (табл 3).

Таблица 3

Категории племенных животных.

Пути передачи наследственной информации	Интенсивность отбора категории	Генетический вклад в результат селекции
от отца к сыновьям	3-5 %;	41 %
от отцов к дочерям	10-15 %;	10 %
от матерей к сыновьям	3-10 %;	33 %
от матерей к дочерям	60-90 %.	7 %

Генетическое улучшение хозяйственно полезных признаков животных в процессе селекции зависит от ряда факторов:

- биологическими особенностями популяции;
- структурой селекционных мероприятий;
- системой разведения скота;
- методами определения племенной ценности.

Три основных предпосылки возникновения крупномасштабной селекции:

1. Искусственное осеменение и метод длительного хранения спермы – первая техническая предпосылка крупномасштабной селекции. (К наиважнейшим научным достижениям в животноводстве, преобразующим ведение племенной работы, относится искусственное осеменение с возможностью долговременного сохранения спермы в жидком азоте при температуре -196°C. Т.о. роль отбора племенных животных в селекции посредством увеличения интенсивности отбора производителей возросла в десятки и сотни раз. Искусственное осеменение глубокозамороженной спермой делает возможным использование мирового генетического потенциала для улучшения любого стада. Все это стимулировало широкое применение межпородного скрещивания.)

2. В связи с необходимостью обоснования селекционной работы – стремительное развитие получила популяционная генетика, которая является второй важнейшей предпосылкой крупномасштабной селекции.

В 1939 г. Лаш сформулировал основное понятие популяционной генетики – понятие наследуемости. В СССР основы популяционной генетики созданы профессором С.С.Четвериковым (1926), О.В.Гаркави (1928), А.С.Серебряковским (1932,1935), С.Г.Давыдов (1932), Е.Ф.Лисун (1934). Отечественными достижениями являются и методы искусственного осеменения (Иванов М.Ф. 1935) и длительное хранение спермы быков-производителей (Милованов и др). В 1943 г. Разработаны основы индексной оценки животных. В 1954-1956 гг. в Норвегии Х. Скьервольд впервые

составил программу селекционной работы в масштабах страны, имевших более одного миллиона молочных коров (Реализация этой программы дала селекционный эффект в виде повышения удоя на 1,1 % в год. Установлено, что остальная часть прироста получена в результате улучшения условий содержания.)

3. Появление ЭВМ (компьютерная техника) изменило все отрасли человеческой деятельности, в том числе и селекционную работу. – это третья по важности научно-техническая предпосылка крупномасштабной селекции.

Непременное условие функционирования крупномасштабной селекции – автоматизированная информационная система (АИС) на базе использования компьютерных программ и технологий.

АИС по селекции молочных пород скота создается селекционными центрами на основе существующих систем обработки первичной информации по племенному и зоотехническому учету.

Банк селекционных данных по породам должен иметь следующую структуру:

1. сведения материей быков, включенная данные о продуктивности и племенной ценности самих коров и их предков;
2. сведения о быках производителях, включая данные о племенной ценности по хозяйственно- полезным признакам самих быков и их предков;
3. сведения о дочерях быков;
4. селекционно-генетические, зоотехнические и экономические параметры, характеризующие породную популяцию.

С помощью банка данных информации и компьютерных программ селекционные центры решают практически все задачи по крупномасштабной селекции:

1. оптимизирует селекционную программу;
2. составляет план племенной работы;
3. оценивает быков по развитию, воспроизводительной способности и качеству потомства;
4. оценивает результаты селекции.

Основой технологического взаимодействия племенных организаций является система информационно-аналитического обеспечения племенной работы, которая является необходимым условием для повышения генетического потенциала животных и экономической эффективности производства продукции.

На современном этапе развития молочного скотоводства в России организационная структура информационной системы (ИС) допускает два принципа формирования баз данных для сертификации племенного материала и решения селекционных задач:

- централизованный, когда информационная база создается непосредственно в региональных вычислительных центрах и с определенной периодичностью поступает на федеральный (породный) уровень;
- децентрализованный, при котором исходные базы данных формируются непосредственно в племенных хозяйствах, затем передаются на машинных носителях в региональный вычислительный центр, после чего объединенные массивы информации о племенных животных региона поступают в Головной информационно-селекционный центр, где формируются базы данных породного уровня. Технологии формирования баз данных по указанным принципам имеют ряд важных отличий, однако, учитывая современное состояние инфраструктуры племенных организаций в России, в настоящее время они могут быть допущены к использованию с учетом степени их внедрения в конкретных регионах страны.

Вместе с тем следует отметить, что централизованная система имеет ряд существенных преимуществ, а именно:

- минимизирует затраты на техническое и программное обеспечение;

- повышает степень достоверности учета исходных данных при формировании информационных баз регионального и породного уровня;
- упрощает и удешевляет технологию обмена информацией между базами данных на уровне регионов и пород;
- обеспечивает более оперативную актуализацию данных для региональных организаций и породных ассоциаций по племенной работе;
- в наибольшей степени соответствует международным требованиям по регистрации и идентификации племенных животных Технология организации системы сбора информации при централизованном принципе построения ИС выглядит следующим образом.

На начальном этапе вся информация о племенных животных, имеющихся в племенных хозяйствах, заносится в региональную базу данных. Этот массив служит в качестве исходной базы данных для дальнейшей актуализации и решения селекционных задач. В дальнейшем при рождении теленка в племенном хозяйстве в региональный вычислительный центр (РВЦ) поступает информация об отелившейся корове, которая содержит: идентификацию хозяйства и коровы, дату отела, кличу и идентификационный номер приплода. При этом в региональной базе данных автоматически создается новая запись о новорожденном животном (поскольку вся информация присутствует в записях об отце и матери теленка). В дальнейшем в процессе онтогенеза животного в РВЦ поступает следующая информация: данные о развитии (живая масса, промеры, оценка экстерьера), воспроизводительных качествах животного (даты осеменения, номера быков, спермой которых осеменялась корова, результаты ректальных исследований, легкости отелов, клички и номера приплодов); показатели продуктивности (даты контрольных доек, суточные удои). Указанная информация поступает в РВЦ непосредственно из племенного хозяйства. Точность поступаемой информации контролируется государственной племенной инспекцией, региональными организациями по племенной работе, а также при помощи логических программ формирования баз данных непосредственно в РВЦ. Наряду с этим выборочно (в соответствии с регламентирующими документами) осуществляется периодическая проверка достоверности происхождения животных, осуществляемая через лаборатории иммуногенетической экспертизы.

В случае выявления недостоверности исходных данных соответствующая информация в региональных базах данных подлежит корректировке (или удалению). Из лаборатории по определению качества молока непосредственно в РВЦ поступают данные о качественных характеристиках молока (содержание жира, белка и т. д.) каждой зарегистрированной коровы. Анализ осуществляется на основе отбора проб молока, организуемого лабораторией по договору на проведение соответствующей работы с каждым племенным хозяйством региона. Контроль за качеством отбора проб и точностью определения характеристик молока осуществляется также органами Госплеминспекции региона. Таким образом производится регистрация каждого племенного животного и актуализация информации о нем в региональной базе данных.

Несколько иная организационная взаимосвязь предусматривается при обмене информацией между РВЦ и организациями по искусенному осеменению сельскохозяйственных животных. При поступлении быка (спермы быка) на племпредприятие вся информация о нем из племенного сертификата переносится в базу данных самого предприятия, а оттуда поступает в РВЦ, где формируется справочник быков-производителей. Этот справочник содержит лишь ту информацию о быке, которая необходима для его оценки (по росту и развитию, воспроизводительной способности и продуктивности дочерей) и формирования сертификатов племенных животных (телок, бычков, коров). Вся оперативная актуализация базы данных быков-производителей (информация о количестве и качестве накопленной спермы, объемах

реализации и др.) осуществляется непосредственно в организациях по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.

Информационная база данных, создаваемая в РВЦ, служит массивом для решения следующих селекционных задач:

- оперативное управление стадом (выдача сводок, анализов, прогнозов владельцам племенных животных);
- формирование племенных сертификатов животных при племпродажах;
- свод и анализ результатов бонитировки на уровнях хозяйства, района, региона;
- формирование информации для осуществления контрольных функций (для органов Госплеминспекции);
- решение селекционных задач по запросу племенных хозяйств;
- формирование исходных массивов для актуализации базы данных племенных животных породного уровня управления.

На уровне управления племенной работой в породе (популяции) информационная база предназначена для:

- определения селекционно-генетической ситуации в породе (популяции) и ее анализа;
- сравнительной характеристики пород, регионов, экономических районов по уровню развития племенной базы;
- разработки селекционных программ в области племенного животноводства;
- оценки племенных качеств животных по различным параметрам и с учетом целей селекционной работы;
- оценки генетических трендов по селекционным признакам в породе, популяции;
- формирования основных селекционных групп животных (отцов быков, отцов коров, матерей быков);
- краткосрочного и долгосрочного прогнозирования динамики развития племенного животноводства в России.

Перспективы применения современных интернет технологий в информационных системах агропромышленного комплекса РФ

В настоящее время невозможно представить себе область человеческой деятельности, где бы ни применялись компьютеры, информационные системы и технологии. Не является исключением и сельское хозяйство, где во многих отраслях накоплены огромные массивы данных, которые требуют современные технологии обработки информации.

Создание баз данных и их анализ не являются чем-то новым. Однако технология баз данных предоставляет соответствующий современности, более эффективный, удобный и быстрый подход к анализу проблем и решению различных задач. В связи с наличием на рынке большого количества разнообразных систем управления базами данных (СУБД) особый интерес в настоящее время приобретает именно выбор таких систем. Они должны быть, во-первых, доступны по стоимости, во-вторых, должны содержать полный набор стандартных операций, выполняемых СУБД, в-третьих, обеспечивать доступ к данным через глобальную сеть интернет, при условии соблюдения требований защиты информации.

2. Современные направления в селекции молочного скота и оценке быков-производителей.

Прогноз племенной ценности даже в его наипростейшей форме основывается на знании фенотипической и аддитивной генетической дисперсии признаков или коэффициента наследуемости. Для большинства российских популяций сельскохозяйственных животных эти параметры неизвестны. Однако для эффективного управления селекцией необходима как можно более полная качественная и надежная

информация как об отдельном животном, так и о популяции в целом. Для получения и обработки такой информации требуется определенная система обработки данных.

Предложенная профессором В. М. Кузнецовым схема информационного процесса управления селекцией показана на рис. 2.



Концепция информационного процесса управления селекцией выглядит следующим образом:

- Подход к селекции как к динамической системе управления процессом генетического совершенствования больших и малочисленных популяций. (Система должна быть гибкой и быстро реагировать на различные, сторонние изменения).
- Ориентация на современные методы селекции. (Математическое обеспечение системы должно базироваться на теории селекции животных, обобщенных линейных моделях и экономико-математических методах).
- Ориентация на фермеров, селекционеров хозяйств, специалистов племпредприятий, селекционных центров или ассоциаций по породам. (Система должна предоставлять лицам, принимающим решения необходимую информацию в понятной форме).
- Ориентация на максимальную генетическую и экономическую эффективность. (Система должна обеспечить лиц, принимающих решения, такой текущей и перспективной информацией, которая бы гарантировала максимальную эффективность разведения животных).
- Независимость системы от ведения учета данных. (Программное обеспечение должно работать с любой базой данных).

В информационной системе управления селекцией выделяют следующие блоки задач:

- статистический анализ данных,
- генетическая оценка животных, генетический анализ популяций,
- оптимальная программа селекции,
- оптимизация отбора и подбора животных,
- оценка эффективности.

3 Современные направления в селекции молочного скота и оценке быков-производителей.

Основой любой системы селекции является оценка племенной ценности потенциальных родителей. Цель оценки - получить как можно более точный прогноз генетической ценности особи. Чем достовернее генетическая оценка, чем строже отбор на основе этой оценки, и чем интенсивнее использование генетически лучших животных, тем больше будет уверенности у селекционеров в улучшении животных от поколения к

поколению. В России племенную ценность рассчитывают только у быков, расчет ее ведется методом сравнения со сверстницами, предложенным Альтшуллером и Сухановым в 1936 году.

При использовании этого метода продуктивность дочерей быка сравнивается с продуктивностью лактирующих в аналогичных условиях сверстниц. Этот метод легко применим на практике, но имеет ряд недостатков. В частности, он эффективен и обеспечивает безошибочные оценки племенной ценности быков только в случае:

- 1) если средняя генетическая ценность отцов сверстниц одинакова для дочерей всех оцениваемых быков;
- 2) все оцениваемые быки выбираются из одной популяции (закрытая система разведения);
- 3) в популяции нет генетического тренда, то есть эффект селекции равен 0.

При разведении отечественных пород молочного скота, когда для генетического улучшения животных используется семя производителей разных стран, эти условия не соответствуют действительности, поэтому прямой метод сравнения со сверстницами не исключает возможности неточностей и ошибок при классификации быков по их племенной ценности.

Точный прогноз племенной ценности играет важную роль в программах генетического улучшения сельскохозяйственных животных. Это особенно важно для категории животных, малочисленность и высокий уровень воспроизводства, которых имеет преобладающее влияние на генетическую ценность популяции. Исследования показали, что вклад отцов в генетическое улучшение молочной продуктивности может достигать 40% и более.

Системы управления базами данных (СУБД) позволяют манипулировать собранными данными и переработать их в необходимую для оценки и прогноза информацию. Для анализа таких данных используются статистические модели смешанного типа (ММЕ). Эти модели включают в себя фиксированные и случайные (рандомизированные) факторы. Результатом решения (обработки ММЕ) является наилучший несмещенный линейный прогноз (Best Linear Unbiased Prediction) BLUP для рандомизированных, и наилучшая несмещенная линейная оценка (Best Linear Unbiased Estimation) BLUE для фиксированных факторов. Первый показывает вероятность проявления того или иного случайного фактора, а вторая - важность учета и силу действия того или иного фиксированного фактора. Эти методы разработаны американским ученым Ч. Хендersonом.

Методы оценки быков производителей постоянно совершенствуются. Наиболее совершенная оценка методом BLUP. Этот метод тоже освоен в системе СЕЛЭКС.

Для достижения наиболее точного прогноза необходимо учитывать следующие требования:

1. Привлечь все имеющиеся данные.
2. Определить, оценить и устраниТЬ из оценки значимые или наиболее значимые факторы окружающей внешней среды.
3. Использовать статистические методы, обеспечивающие несмещенный прогноз генотипа. Исследованиями было установлено, что генетическая оценка молочного скота по методу BLUP способствует повышению идентификации генотипа на 12-40% и более.

Таблица 4

выборка	метод оценки	число быков	повторяемость		% к СС	
			удой, кг	жир, %	удой	жир
20 племенных хозяйств	СС	116	0,45	0,30	-	-
	BLUP	116	0,53	0,44	118	147

Например в таблице 4 приведены данные расчета повторяемости оценок

племенной ценности быков, проведенного методами сравнения со сверстницами и BLUP, в 20 племенных хозяйствах Ленинградской области (по данным ВНИИ разведения и генетики сельскохозяйственных животных). Видно, что повторяемость (а, следовательно, и молочность, и содержание жира в молоке) BLUP-оценок была выше, чем оценок по методу СС. Использование BLUP повышало достоверность оценки быков по удою на 18%, по жиру - на 47%. Однако по данным ВНИИРГЖ свойства BLUP в большей степени реализуются при оценке быков, по данным массового учета молочной продуктивности не только в племенных, но и в обычных молочно-товарных хозяйствах. При этом достоверность оценки в сравнении с методом СС может достигать 25-37%.

Статистические модели, требующиеся для метода BLUP, составляются для каждой популяции индивидуально, однако в общих чертах эту модель можно описать.

Например:

удой дочери быка = среднее по стаду + эффект года - сезона отела + эффект отца + другие неучтенные факторы.

3. Системы информационных технологий в молочном скотоводстве (СЕЛЭКС, BLUP).

Модель - это уравнение, которое показывает, как независимые переменные (стадо, год, сезон отела) влияют на зависимую переменную - признак (удой, % жира). Она необходима для того, чтобы описать фактическую ситуацию в популяции, то есть, как можно полнее и точнее показать факторы, влияющие на продуктивность животного. Решение статистической модели обеспечивает наилучший несмещенный линейный прогноз 1/2 аддитивной генетической ценности быка, не зависящий от влияния содержания и кормления дочерей на ферме, года и сезона отела, а также всех взаимодействий между этими факторами. В настоящее время истинная генетическая ценность особей не может быть оценена со 100% точностью, поэтому непосредственно измерить эффективность того или иного метода невозможно. Можно лишь сравнить разные методы с методом, который изначально считается более точным. С точки зрения математики, статистики и селекции метод BLUP считается наиболее обоснованным и имеет под собой лучшую теоретическую базу.

Оценки племенной ценности, рассчитанные по методу BLUP, имеют минимальную дисперсию ошибки. Поэтому можно считать, что, при прочих равных условиях оценки племенной ценности по BLUP будут с наибольшей вероятностью отражать истинную генетическую ценность особи. На самом первом этапе этой работы необходимо привлекать данные хозяйств, ведущих племенной учет в своих стадах. Чем больше данных будет привлечено в обработку на первом этапе, тем точнее будет оценка, сделанная на их основании, и более оправданная программа селекции, принятая на основе анализа этих данных. Примерная форма создаваемой базы данных представлена в таблице 2 (количество строк и столбцов в базе может варьироваться в зависимости от полноты данных, имеющихся в хозяйствах). Системы управления базами данных (СУБД), уже разработанные в настоящее время, позволяют выполнять многие задачи. Наиболее приемлемы для этих целей СУБД FOX PRO и ее аналоги. Эта СУБД позволяет создавать файлы DBF, которые потом можно обрабатывать в программных пакетах Microsoft Office - Excel, а также программами статистической обработки данных SAS, HARVY. Кроме этого повсеместно используемая программа СЕЛЭКС-Россия может использоваться для первоначального сбора и накопления данных и дальнейшей их обработке в FOX PRO, однако использование недокументированного материала при создании этой программы может вызвать некоторые трудности у рядового пользователя при работе по совмещению баз данных этих двух программ. Дальнейшая работа с данными должна быть направлена на то, чтобы селекционер мог оптимизировать результативность своего труда в прошлом, продолжая эффективно осуществлять оценку, отбор и использование лучших животных в настоящем и разрабатывать оптимальные программы селекции в будущем. Управление селекцией - непрерывный процесс,

включающий планирование реализацию и контроль. Поскольку сбор первичных данных в хозяйствах происходит по различным системам, а конечный результат работы должен быть доступен и понятен каждому селекционеру для реализации программ селекции на местах, встает актуальная проблема - совместимость программного обеспечения - ведь разные хозяйства используют различный soft для своих ЭВМ, как правило, несовместимый между собой. Оценка компонентов фенотипической изменчивости, вычисление коэффициентов наследуемости, а также составление статистических моделей для оценки племенной ценности животных в каждом конкретном случае - это работа научно-исследовательских организаций, однако сбор информации, ее хранение, а затем и реализация разработанных программ должна осуществляться селекционерами племзаводов и племрепродукторов, которые работают над улучшением той или иной породы крупного рогатого скота. Поэтому необходимо рекомендовать внедрять единый пакет программ для сбора, обработки и анализа данных (некоторым примером этого может служить применение системы СЕЛЭКС и пакеты программ приведенных выше). Это очень важно, так как в племенную работу включены, как правило, различные учреждения организации предприятия и хозяйства.

Разработка долгосрочной селекционной программы сводится к мероприятиям:

- устанавливают **цель разведения** животных, которая определяется производственным направлением породы;
- определяют **методы оценки генотипа** животных и факторы, которые должны быть учтены при разработке долгосрочной программы селекции;
- разрабатывают генетико-математическую модель долгосрочной программы селекции с целью моделирования селекционного процесса в популяции и оценки ожидаемого селекционного прогресса;
- учитывают **число селекционируемых признаков**, их экономическое и хозяйственное значение;
- оценивают **биологические факторы** (наследуемость, изменчивость, повторяемость признака, на который направлена селекция, возраст получения первого потомства, количество спермодоз для плодотворного осеменения, генерационный интервал и т.д.);
- оценивают **селекционные факторы** (количество ремонтных производителей, интенсивность селекции по скорости роста и спермопродукции, число проверяемых производителей, число лактаций и т.д.);
- оценивают **экономические факторы** (закупочные цены, затраты на содержание и кормление, на получение и обработку спермы, оценку производителей). Общие затраты, валовой доход, чистый доход и рентабельность племенной работы.

АРМ «СЕЛЭКС» СЕЛЕкция, ЭКОномика, Система - является инструментальным средством для руководителей и специалистов зоотехнической службы. Оно позволяет без затрат ручного труда организовать ведение зоотехнического и селекционно-племенного учета, иметь исчерпывающий производственный и экономический анализ, получать производственные и селекционные планы для оперативного и перспективного планирования, управления отраслью.

Базовый пакет программы АРМ «СЕЛЭКС» позволяет решать следующие задачи:

Ведение базы данных племенных животных и оперативный учет показателей зоотехнического и племенного учета. В базе данных накапливаются все основные данные по животным: происхождение, генотип, развитие, экстерьер, комплексная оценка, продуктивность по всем лактациям, оценка вымени, отелы, осеменения, запуски;

Оперативное управление животноводством. Данная задача позволяет: отслеживать в стаде животных, которые приносят значительный экономический ущерб в отрасли; осуществлять оперативное планирование осеменений,

запусков, ректальных исследований; анализировать продуктивность стада в разрезе структурных подразделений и по хозяйству; контролировать раздой новотельных коров.

Оперативное управление селекционно-племенной работой. Решаются вопросы: анализа и организации воспроизводства в стаде; контроля за продуктивностью коров высокой племенной ценности, определения потенциала новотельных коров; обеспечение информацией по результатам использования быков в стаде.

Прогнозирование производства продукции животноводства (на предстоящий год), оперативный учет и анализ работы сельхозпредприятия. Формируется: производственная часть бизнес-плана по производству продукции животноводства на каждый месяц планового года, валовое производство молока, воспроизводство и движение поголовья.

Итоги племенной работы по хозяйству за отчетный год и анализ бонитировки крупного рогатого скота за ряд лет. Выдаются: оценка комплексного класса животных, свод бонитировки по хозяйству, анализ бонитировки за ряд лет

Формирования документов на скот. Создаются: племенное свидетельство, карточка 2-мол (для коров и телок).

Например. Руководители и специалисты хозяйства АОЗТ ПЗ «Ленинский путь» выделяют несколько составляющих, обеспечивающих рост производства молока.

1. Хорошо поставленная селекционно-племенная работа со стадом. Все маточное поголовье голштинизировано, доля кровности 85% и выше, т.е. скот в своей массе приближается к чистопородным голштинам. Ввод первотелок в основное стадо производится при среднесуточном надое 32 кг, первотелки с более низкой продуктивностью выранжированы. Коровы осеменяются быками, имеющими продуктивность матерей не ниже 15000 кг молока за лактацию.

2. Направленное выращивание молодняка. При выращивании молодняка обеспечиваются привесы не ниже 700 г, в результате 16-ти месячном возрасте телочки имеют живую массу 418-420 кг, осеменение производится в 17-18-ти месячном возрасте при живой массе 430 кг и выше. Нетели при 4-х месячной стельности достигают 500 кг живой массы.

3. Создание прочной кормовой базы. Посевы однолетних злаково-бобовых травосмесей в различные сроки, за счет которых животным в течение всего пастбищного периода скармливается свежая зеленая подкормка. Ввод в севооборот посевов вика+овес, залужение пастбищ по системе клевер+райграс. Использование биологически полноценных комбикормов и премиксов, жмыхов, шротов и патоки.

4. Организация кормления крупного рогатого скота. Кормление телят. В первый месяц жизни телятам выпаивают цельное молоко вволю (обычно 8-9 литров в день), в целом за весь молочный период выпаивают 520 кг молока. На 15 день начинают приучать к поеданию концентрированных кормов в виде каш, после приучения переводят на сухой корм, в возрасте 2,5 месяцев телята съедают в день 2 кг, в 6 месяцев – 3,5 кг концентратов. Сено и силос телята получают вволю. Нетелям скармливают 4 кг сена, 4 кг концкормов, до 20 кг силоса. Кормление коров. 3 кг сена, 12 кг концкормов, 4 кг жмыха, 22-23 кг силоса, 2 кг патоки, 10 кг корнеплодов. В целом коровы съедают 25-26 кг сухого вещества.

5. Режим кормления. Кормление дробное, 6 раз задаются концентрированные корма, 3 раза жмых. Порядок раздачи кормов сохраняется утром, в обед и вечером одинаковым: сено - жмых – премиксы – концкорма – силос – концкорма – силос.

6. Эффективная оплата труда. В хозяйстве действует экономически обоснованная оплата труда и премирования, которая напрямую зависит от полученной продукции в животноводстве. Премиальные составляют до 30% от общей суммы заработка. Интересы животноводства соблюдаются неукоснительно, по принципу сначала животноводство, а потом все остальное.

7. Жесткая производственная и технологическая дисциплина всех работников. Немедленное наказание за нарушение технологии при исполнении должностных обязанностей. Контроль осуществляют директор и главный зоотехник хозяйства. Выполнение вышеуказанных мероприятий позволил АОЗТ ПЗ «Ленинский путь» увеличить надой на 1 фуражную корову с 3600 кг молока в 1997 году до 8400 кг молока в 2000 году. Себестоимость 1 кг молока 3,05 руб., реализационная цена 1 кг – 4,65 руб., что свидетельствует о высокой доходности молочного производства.

2. Методические указания по проведение лабораторных работ.

2.1 Лабораторная работа 1 (ЛР-1) Особенности бонитировки крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направления продуктивности. Особенности бонитировки крупного рогатого мясного направления продуктивности.

2.1.1 Краткое описание проводимого занятия.

Бонитировка молочного и молочно-мясного направления продуктивности.

Бонитировка – система оценки племенных качеств животных по комплексу хозяйствственно-полезных качеств. По ее результатам определяют дальнейшее назначение животного: включение в воспроизводительную группу (племядро), на выранжировку или выбраковку.

Комплексный бонитировочный класс животного определяют породность, родословная, общее развитие, конституция и экстерьер, продуктивность, воспроизводительные качества и качество потомства.

Скот бонитируют в соответствии с действующей Инструкцией по бонитировке молочных и молочно-мясных пород, утвержденной Минсельхоз РФ.

Совершенствование бонитировочных инструкций – процесс постоянный, направленный на повышение точности определения племенной ценности животных, разработку дифференцированных для каждой породы стандартов желательного типа, оптимизацию экономической значимости отдельных селекционируемых признаков, совершенствование объективности при оценке животных.

Перед проведением бонитировки заполняют необходимые данные племенного и зоотехнического учета. По каждому животному и в целом по стаду анализируют ветеринарное состояние, возобновляют утерянные или неясные индивидуальные номера.

Бонитировку проводят таким образом, чтобы можно было решать следующие главные задачи:

1. Использовать преимущества целеустремленного отбора по главным признакам (продуктивность). Только в этом случае будет сравнительно быстро идти улучшение стада в избранном направлении. Однако оценка не должна быть и совершенно односторонней. Поэтому наряду с главными признаками при оценке животных принимают во внимание и другие показатели (конституцию, развитие и др.) с тем, чтобы избежать нежелательных последствий одностороннего отбора.

2. Если по каждому из учтенных признаков будет дана самая тщательная оценка, но она не найдет отражения в итоговой оценке, то это приведет к тому, что данное качество не окажет никакого влияния на результат отбора и трудоемкая подчас работа по выявлению этого качества практически не имеет смысла. Следовательно, чтобы улучшать животных путем отбора, каждому учтенному признаку необходимо отвести место в итоговой оценке сообразно его значимости.

3. При отборе животных по отдельным признакам и при выведении итоговой оценки максимальное внимание должно быть уделено наследственным качествам животных с тем, чтобы в воспроизводящую группу могли быть отобраны действительно лучшие генотипы. В этом одно из главных условий реального повышения эффективности искусственного отбора.

Бонитировку крупного рогатого скота проводят ежегодно в племенных хозяйствах. Скот молочного и молочно-мясного направления бонитируют обычно осенью в октябре.

В зависимости от полученных оценок пробонитированных животных относят к классам: элита-рекорд, элита, первый, второй. Выделяют также группу внеклассных животных.

Признаки по которым производится оценка скота. Число признаков и эффективность отбора. Для успешного достижения цели, поставленной зоотехником в племенной работе, большое значение имеет вопрос о числе и характере признаков, по которым ведется селекция. При индивидуальном отборе в маточном стаде, так же как и при выборе производителя, естественно стремление оценить животное всесторонне.

Для успеха дела максимально сократить количество требований, выбрать лишь самые главные признаки и сосредоточить на них основное внимание и отбор.

Главные признаки – это всегда продуктивные качества, соответствующие тому направлению, в котором совершенствуется данная порода. На том или ином этапе работы с породой ли стадом роль отдельных, как главных, так и вспомогательных, признаков может изменяться в зависимости от недостатков, присущих породе и конкретных задач по их исправлению. Значение этих показателей, получаемых с помощью статистических методов, позволяет судить о надежности произведенной оценки и на этой основе разрабатывать способы, повышающие точность оценки. Кроме того, они дают возможность в какой-то мере предвидеть результативность селекции и косвенный эффект при отборе сопряженным признакам и к конечном счете избрать наиболее рациональные пути улучшения животных.

Один из основных приемов совершенствования каждого молочного стада - селекция животных по основным хозяйствственно полезным признакам. В условиях промышленной технологии в молочном скотоводстве основные селекционные признаки можно условно разделить на продуктивные и технологические (пользовательные). К продуктивным селекционным признакам относятся: удой, жирность и белковость молока, откормочные и мясные качества, оплата корма молочной и мясной продукцией, воспроизводительные качества, к технологическим — пригодность коров к машинному доению, крепость конституции, устойчивость к заболеваниям и стрессовым ситуациям, нрав животного.

Молочная продуктивность. Удой — важнейший селекционный признак коров молочных и молочно-мясных пород. Основной количественный показатель — величина продукции за лактацию. В племенных хозяйствах при отборе учитывают удой коровы за все имеющиеся лактации, что позволяет:

- повысить точность и эффективность отбора в стаде матерей коров, так как коэффициент корреляции между продуктивностью матерей за ряд лактации и удоем их дочерей в 1,5—2 раза выше, чем за одну лактацию;
- вести косвенный отбор животных по крепости конституции, так как только здоровые, выносливые животные могут быть высокопродуктивными в течение ряда лет.

Для предварительной оценки первотелок определяют их удой за первые 90 или 100 дней лактации. Коэффициент корреляции между удоем за эти периоды и удоем за 305 дней первой лактации достаточно высокий ($r = 0,7—0,8$).

В настоящее время в молочном и молочно-мясном скотоводстве, в связи с переводом коров во многих хозяйствах на круглогодовые отели их бонитируют в течение всего года, по мере завершения лактации. Успешное проведение бонитировки в большей степени зависит от состояния зоотехнического учета. В каждом хозяйстве подсчитывают удои коров за последнюю лактацию и вычисляют содержание жира и белка в молоке. Первотелок оценивают по удою за первую законченную или укороченную лактацию. Учитывая невысокую повторяемость величины удоя одних и тех

же коров за разные лактации и необходимость повысить надежность оценки по этому основному признаку, последнюю производят за ряд лактаций. Коров старшего возраста оценивают по среднему удою не меньше чем за три лучшие лактации. Животных взвешивают утром перед кормлением и поением, инвентарные номера проверяют и обновляют.

У некоторых коров лактационная кривая довольно выравненная. У них удой устойчив на протяжении всей лактации. Выравненность лактационной кривой свидетельствует о конституциональной крепости животных. Снижение удоев после достижения максимума считается нормальным, если оно не превышает 5—6 % от этого показателя за предыдущий месяц. Двухвершинная лактационная кривая характерна для коров зимних и ранневесенних отелов в условиях неполноценного кормления их в стойловый период. В племенной работе, кроме удоя за лактацию, учитывается и высший суточный удой. Уровень удоя коровы зависит от ее наследственных качеств и факторов окружающей среды - кормления и содержания, подготовки к отелу, техники доения, продолжительности межотельного периода (12 мес.), сухостойного периода (50-60 дн., для коров-рекордисток – 60-80 дн.) сервис-периода (50-60 дн.), возраста животного, условий его выращивания.

Молочная продуктивность коров определяется не только количеством, но и качеством молока. Самые ценные составные его части - жир и белок. Содержание жира в молоке, кроме генетических факторов, зависит от кормления животных. Обильное полноценное кормление, особенно хорошим сеном, кормами. Содержащими большое количество белков и легкопереваримых углеводов, повышает жирномолочность до наследственного потенциала. Хронический недокорм ведет к снижению жирности молока на 0,2-0,5 % и более. Содержание белка в молоке находится в положительной связи с содержанием жира, но величина этой связи значительно варьирует. Поэтому отбор только по жирномолочности часто не приводит к автоматическому увеличению содержания белка в молоке. Отмечается даже, что с повышением содержания жира в молоке связь между этими двумя признаками снижается.

Показатели, характеризующие качество вымени. В условиях интенсивной технологии молочного животноводства пригодность коров к машинному доению стала таким же важным селекционным признаком, как и молочная продуктивность. Пригодность коров к машинному доению включает ряд селекционных показателей: форму, размер вымени и сосков, равномерность выделения молока из четвертей вымени, скорость молокоотдачи, полноту выдаивания. Особенno большое значение имеет форма (желательно ваннообразная) и емкость вымени у коров на промышленных фермах, где технология производства молока предусматривает двукратное доение. Обильное кормление и массаж вымени способствуют увеличению емкости вымени. Существенное значение при машинном доении имеет равномерность развития долей вымени у коров. Минимальные требования по количеству молока, выдаиваемого из передних долей вымени для коров разных пород, %: черно-пестрая – 42, голландская – 43, джерсейская – 45, красная степная – 41, остальные молочные и молочно-мясные породы – 39.

Железистое вымя имеет мелкозернистую структуру, после выдаивания становится мягким, губчатым и сильно спадает, образуя сзади запас кожи. Стенки сосков такого вымени обычно тонкие, эластичные. Ткани средней нежелезистого вымени после доения также губчатые, но несколько плотнее, их структура грубозернистая и недостаточно четкая на ощупь. После выдаивания вымя спадает средне.

Мясистое или жировое вымя имеет сильно развитую соединительную и жировую ткань. Объем вымени после доения почти не уменьшается, при ощупывании вымя упругое с плотно облегающей кожей. Стенки сосудов грубые.

Форму вымени характеризует длина, ширина и глубина, соотношение между этими промерами. По величине различают вымя крупное с обхватом 120 см и более,

среднее 110- 119 см и малое меньше 110 см. Нормальным расстоянием между концами сосков можно считать: передних 10-20 см, задних 6-12 см, между передними и задними 7-12 см. Правильное доение стимулирует активную работу молочной железы, а усиленная ее деятельность активизирует функционирование пищеварительных органов, легких, сердца, повышает аппетит. Доказано, что при прочих равных условиях при трехкратном доении в сутки удой коровы на 10—15 % выше, чем при двукратном (см. рис.1).

Мясная продуктивность. В мясном балансе страны удельный вес говядины превышает 40 %. Поэтому селекция молочного скота на улучшение их откормочных и мясных качеств имеет важное народнохозяйственное значение. Признаки, характеризующие откормочные и мясные качества животных.

Молочный скот совершают по мясной продуктивности через быков-производителей. Их оценивают по мясным качествам при выращивании на элеверах как по собственным показателям, так и по показателям их потомков, обычно мужских. Откормочные и мясные качества скота зависят от ряда факторов - условий выращивания и откорма, пола и возраста, породы.

Обильное, нормированное кормление обуславливает повышение мясной продуктивности у животных всех пород и всех возрастов. Среди пород молочного направления лучшей мясной продуктивностью характеризуется черно-пестрый скот, из комбинированных - симментальский.

Возраст коров - важный признак, обуславливающий уровень молочной продуктивности. Максимальный удой в среднем приходится на 4-6 лактацию. Следовательно, высокопродуктивных животных целесообразно использовать не менее 4-6 лактации. Взрослые коровы с нормальными воспроизводительными функциями выбраковываются по продуктивности, если их удой ниже среднего по стаду и меньше, чем у вводимых в стадо первотелок.

Правильное выращивание ремонтных телок имеет большое значение для получения в последующем высокой молочной продуктивности. Плохо выращенные, мелкие, недоразвитые коровы обычно бывают низкоудойными даже при хорошем кормлении. Все без исключения рекордистки имеют среднюю или большую живую массу. Мелкая корова не в состоянии переработать и превратить в молоке большое количество кормов.

Показатели воспроизводительной способности скота. В условиях концентрации, промышленной технологии, и интенсификации молочного животноводства большое значение приобретает селекция животных (быков и коров) по воспроизводительной способности.

Воспроизводительная способность **быков**. Племенных бычков оценивают и селекционируют по качеству спермы и оплодотворяющей ее способности.

Воспроизводительная способность **коров** - сложный физиолого-генный признак, который в зоотехнической практике и селекции характеризуется несколькими показателями. Плодовитость коров - наследственно обусловленный признак. Улучшить его можно быстрее всего путем селекции быков по плодовитости дочерей.

Установлено влияние наследственных факторов на частоту встречаемости нарушений плодовитости у молочного скота - плохая оплодотворяемость, трудные отелы, мертворождаемость, аборты и др. Эти негативные явления в селекции также необходимо учитывать.

Определение назначения животных и их группировка

Для проведения эффективной селекции необходимо систематическое контролирование животных. В практике применяют два вида воспроизводства: расширенное, с ежегодным увеличением поголовья коров и простое воспроизводство - без увеличения численности стада. При простом воспроизводстве в племенное ядро выделяют 50-60%, а при расширенном - до 70% коров или родившихся телок. Оно

определяется плановыми заданиями по увеличению производства молока и говядины, а также роста продуктивности животных. Интенсивность воспроизводства характеризуется размером ежегодной выбраковки коров или количеством (%) вводимых в стадо первотелок относительно числа коров на начало года. За последние годы она колеблется по хозяйствам от 20 до 30% и даже выше, а средний возраст продуктивного использования коров снизился. Основное средство количественного и качественного улучшения воспроизводства стад - широкое применение искусственного осеменения коров и телок.

В результате всесторонней оценки животных (бонитировки) определяют их дальнейшее назначение. Племенные и товарные фермы имеют некоторые различия в использовании неодинаковых по своей хозяйственной и племенной ценности групп животных. Однако в любом случае руководствуются единым принципом – выделением лучшей части животных для воспроизводства собственного стада. Остальных животных, в зависимости от их продуктивности, либо сохраняют в хозяйстве для получения от них товарной продукции либо выводят из стада, как производственный брак.

Группировка животных в товарном хозяйстве. Лучшая часть, оцененных по комплексу признаков, коров поступает в **племенное ядро**. Рождающихся от них телочек в нужном количестве оставляют на ремонт и предусмотренное планом расширенное воспроизводство маточного стада. Остальных коров, не выделенных в племенное ядро, подразделяют на две категории: производственная группа и брак.

Производственная группа образуется из коров, оставляемых в хозяйстве с целью получения от них продукции. В зонах молочного и молочно-мясного (комбинированного) скотоводства приплод, получаемый от коров этой категории, в основном предназначается для откорма на мясо. Нередко эту группу коров осеменяют спермой быков мясных пород, чтобы повысить откормочные и убойные качества получаемого при скрещивании молодняка. Следует также учитывать, что в товарных хозяйствах племенную ценность выявляют недостаточно хорошо, отбор в племенное ядро и в производственную группу не всегда точен, и в этой группе часть коров может по генотипу представлять определенный интерес.

Третья группа в маточном стаде – **брак**. В нее включают коров, выбракованных по возрасту, болезни, а также очень низкопродуктивных животных. Коров этой группы ставят на откорм и сдают на мясо.

Группировка животных в племенном хозяйстве. Племенные хозяйства выполняют значительно более сложные функции, чем товарные:

Во-первых, в племенных хозяйствах маточное стадо обеспечивают производителями, которых выращивают здесь же. Производители должны быть самого высокого класса по своим наследственным качествам;

Во-вторых, в этих хозяйствах выращивают племенных бычков для укомплектования ими всей супачной сети, обслуживающей и товарные фермы. Племенные достоинства продаваемых бычков должны быть высокими и их гарантируют в той мере, в какой доступно при современном уровне знаний;

В-третьих, телочки, оставляемые на ремонт, должны превосходить по своим потенциальным возможностям высокопродуктивное маточное стадо, точнее племенное ядро этого маточного стада, что гораздо труднее сделать, чем в рядовом товарном хозяйстве со средним уровнем продуктивности.

Этим определяются особенности группировки животных в племенных хозяйствах. Наиболее сложна схема использования животных различного назначения в племзаводе (рис. 2.). Маточное стадо в **племзаводе** подразделяют на племенное ядро, производственную группу и группу выранжированных и выбракованных животных.

Племенное ядро. В него выделяют лучших по племенным и продуктивным качествам коров. Получаемые от них бычки предназначаются для использования в

собственном стаде и для комплектования других племенных хозяйств и станций по племенной работе и искусенному осеменению. Телочки идут на ремонт собственного маточного стада; если же телок больше, чем требуется для этой цели, то их также продают в племенные хозяйства на пополнение их основного стада. Учитывая необходимость отбора наилучших бычков для ремонта собственного стада, целесообразно внутри маточного племенного ядра выделить небольшую группу наиболее ценных в племенном отношении коров, для которых заранее можно было бы запланировать индивидуальные спаривания или осеменение привозной спермой выдающихся, специально подобранных быков.

Производственную группу образуют из коров, не вошедших в племенное ядро, используемыми для получения приплода, выращиваемого и продаваемого затем на племя. Многие племзаводы располагают высокопродуктивным стадом, в котором и эта группа почти полностью состоит из коров класса элиты: приплод от них может быть высоко оценен в племенном отношении.

Из коров, подлежащих **выранжировке и выбраковке** из стада, комплектуют отдельные группы. Выранжировывают (передают в другие хозяйства) коров, не удовлетворяющих требованиям для оставления их в племенном хозяйстве, но пригодных для использования в менее продуктивном стаде. На мясо выбраковывают коров и животных других возрастных и половых групп по возрасту, состоянию здоровья, неспособности к нормальному воспроизведению, низкой продуктивности.

В соответствии с группировкой маточного стада молодняк подразделяют на группы: а) ремонтных, б) подлежащих продаже на племя и в) назначаемых на выранжировку. Производителей, используемых в племзаводе, делят на две основные категории: а) допущенных к племенной службе на основании предварительной оценки и проверяемых по качеству потомства; б) проведенных и получивших положительную оценку по качеству потомства. В племенных хозяйствах группировка животных строится по такой же схеме, с той иногда разницей, что в зависимости от племенной ценности стада, которым такое хозяйство располагает, преподаваемый сверхремонтный молодняк используется для пополнения как племенных, так и товарных стад.

Структура стада и ее формирование. Под структурой стада понимают процентное отношение в нем различных половых и возрастных групп животных. Наряду с этим количественным показателем для успешного ведения племенной работы огромное значение имеет генеалогическая структура, под которой понимается наличие и соотношение качественно различных родственных групп, складывающихся в стаде.

Структура стада по полу и возрасту поддерживается соответствующим оборотом стада, что также непосредственно связано с племенной работой, поскольку оборотом стада определяются размеры выбраковки и замены животных в основном стаде – получение приплода, отбор ремонтного молодняка и объем реализации его на племя. Основным показателем структуры стада по полу и возрасту служит удельный вес коров в нем. Для товарных хозяйств в стаде молочного направления желательно иметь 45-50% коров, в молочно-мясном – 40-45% и в стаде мясного направления – около 35%. Цифры эти варьируют в различных зонах. Например, в узко специализированных по производству молока пригородных хозяйствах удельный вес коров в стаде может быть выше (до 60%). В этом случае большую часть телят передают в специально организованные хозяйства по доращиванию молодняка.

В соответствии с численностью основного маточного стада, срока использования коров и намеченного роста поголовья определяют количество ремонтных телок для пополнения стада. В каждой возрастной группе телок предусматривают некоторый резерв, чтобы можно было провести отбор по мере развития их и получения дополнительных сведений о продуктивности и наследственной оценке родителей. Отбор среди ремонтных телок производят ежегодно во время бонитировки в возрасте до года и

в возрасте от 1 до 2 лет. Такой многостепенный отбор позволяет уточнять оценку животных и отбирать относительно лучших ко времени ввода их в основное стадо. В практике племенных хозяйств обычно предусматривается резерв для последующего отбора в размере 10-15% среди телок в возрасте до года и 7-8% от числа ремонтных телок в возрасте от 1 до 2 лет. В последнее время резервных телок иногда оставляют в большом количестве. Этих телок передерживают до получения приплода и определяют их назначение в зависимости от выявленной продуктивности. Данный прием существенно повышает точность оценки.

2. Особенности бонитировки крупного рогатого мясного направления продуктивности

1. Живая масса - один из основных показателей мясной продуктивности.

Крупным животным свойственны более высокая интенсивность роста и лучшая оплата корма приростом. Придается значение отбору молодняка по живой массе в 8-месячном возрасте, которая коррелирует с такими показателями, как живая масса животного перед убоем. **Живая масса телят при рождении** - характерный признак для каждой породы. Живую массу теленка при рождении определяют через 6 ч после рождения на весах среднего класса точности с пределом взвешивания до 500 г. Самая мелкоплодная порода абердин-ангусская, несколько выше живая масса при рождении у телят шортгорнской и калмыцкой пород. Практически одинаковой массы рождаются телята казахской белоголовой и герефордской пород, а наиболее высокой - телята шаролезской, кианской, мен-анжу. На живую массу телят при рождении оказывают также влияние возраст матери, уровень ее кормления в период стельности, живая масса производителей, продолжительность стельности, сезон отела и другие факторы. Обычно при отборе на ранних этапах предпочтение отдают телятам большей живой массы при рождении. Они, как правило, растут интенсивнее и имеют преимущество в живой массе к завершению откорма.

Однако при разведении некоторых крупных пород при чрезмерном увеличении массы новорожденных возрастает число трудных отелов. При одинаковых условиях кормления и содержания в первую очередь на скорость роста оказывает влияние породный фактор.

2. Легкость отелов. Определяют по числу случаев трудных отелов. Коров по легкости отелов оценивают по 5-балльной системе: до 10% трудных отелов - 5 баллов, от 10 до 20% трудных отелов - 4, от 20 до 30% - 3, от 30 до 40% - 2 балла.

3. Молочность - основной показатель продуктивности коров мясного направления, т.е. живая масса теленка при отъеме от коровы-матери в 6-8 месяцев. Она выражается массой теленка по завершении молочного периода - в 8-месячном возрасте. Молочностью коров в мясном скотоводстве пренебрегать нельзя. На практике ее часто недооценивают. А ведь это важнейший фактор хорошего развития телят в подсосный период. Живая масса при отъеме в значительной степени определяет дальнейший рост молодняка и конечную его массу к моменту убоя. Молочность скота мясного направления необходимо рассматривать лишь с точки зрения выращивания телят. Молоко его - нетоварный продукт. К лактирующей корове мясного типа нужно относиться так же, как к подсосной свиноматке или овцематке. Уровень молочной продуктивности должен обеспечивать интенсивный рост приплода. Влияет наследственность. У крупных пород – 240-280 кг, у средних пород - 180-220 кг. Взвешивают при отъеме от коровы-матери на специальных весах среднего класса точности с пределом взвешивания до 500 кг с допускаемой погрешностью не более 0,1 %.

4. Материнские качества. Определяют на основании показателей качества выращиваемого молодняка, а также с учетом нрава, проявления материнских качеств **5. Воспроизводительная способность.** Показатель - способности животных приносить регулярно нормально развитое потомство. Установлены относительно низкие показатели наследуемости воспроизводительной способности коров. Однако современная селекция

скота предусматривает отбор и оценку матерей будущих быков и быков для производства коров следующего поколения.

При оценке плодовитости **коровы** учитывают регулярность получения теленка, продолжительность стельности, межотельного и сервис-периода, материнские качества. Хорошая плодовитость - это получение от коровы по одному теленку в год. Для этого плодотворная случка должна быть через 90 дней после отела.

Воспроизводительная способность **быков-производителей** устанавливают по объему эякулята, подвижности, концентрации и переживаемости спермиев, густоте и оплодотворяющей способности спермы, а также легкости отела коров. Определяют в 12-15-месячном возрасте в период оценки племенного бычка по собственной продуктивности. Легкость отелов: до 10% трудных отелов - 5 баллов, от 10 до 20% трудных отелов - 4, от 20 до 30% - 3, от 30 до 40% - 2 балла.

6. Интенсивность роста молодняка. У молодняка крупных пород среднесуточный прирост от рождения до 15-18 месяцев составляет 1100-1300 г; средних пород – 900-1100 г. При оценке молодняка племенных бычков по интенсивности роста и оплате корма применяют 5-балльную систему оценки в зависимости от уровня среднесуточного прироста в период с 210 до 450 дней.

7. Тип телосложения. В мясном скотоводстве в селекции важное значение придается внешним формам телосложения, которые коррелируют с уровнем мясной продуктивности. Предпочтение отдается животным с округлыми формами телосложения и хорошо развитыми мышцами. Экстерьер и конституцию коров и быков оценивают по 100-балльной шкале, а молодняк - по 5 балльной. Согласно инструкции.

Установлена зависимость уровня мясной продуктивности от типа телосложения, в частности животные широкотелого типа более скороспелы, они лучше используют корм, чем скот узкотелого типа. Повышенной скороспелостью отличаются при хорошем кормлении и животные с нежным и рыхлым телосложением. Рост их в первый год жизни идет интенсивнее.

8. Важное значение при отборе и подборе в мясном скотоводстве придают **скороспелости** животных, под которой специалисты понимают высокую энергию роста, раннюю зрелость, способность животных в возрасте 15-18 месяцев формировать зрелую тушу с высоким выходом ценных отрубов мяса и наиболее желательным соотношением мякоти и жира.

Один из признаков скороспелости скота мясных пород - отложение ими жира на сравнительно ранних стадиях развития. Специализированные мясные породы обладают большей способностью откладывать жир в молодом возрасте, чем породы молочных.

Самой высокой продуктивностью обладают животные большой живой массы, с отлично развитой мускулатурой, округлыми формами телосложения.

9. Оплата корма. Определяют по каждому племенному бычку с 8- до 15-месячного возраста на основе количества скормленных кормов в кормовых единицах и полученного прироста в килограммах (от 5 до 9 корм. ед.)

10. Мясная продуктивность. Под мясной продуктивностью понимают количество и качество мяса в туще убитых животных:

10.1. Животные крупных пород имеют **предубойную живую массу** 550—600 кг, средних - 450- 550 кг. Взвешивание проводят: при снятии с откорма - в хозяйстве; при приемке на мясокомбинате со скидкой (1,5-3%) на содержание желудочно-кишечного тракта; после 24-часовой голодной выдержки. Взвешивают на весах среднего класса точности с наибольшим пределом взвешивания 2000 кг по с допускаемой погрешностью не более 1 кг.

10.2. Масса туши. Номенклатура продуктов убоя окота имеет свыше 60 наименований. Однако основную и наиболее ценную часть составляют туша и внутренний жир. У бычков крупных пород масса туши к 18-месячному, возрасту при

интенсивном выращивали и откорме достигает 280-350 кг, у бычков средних пород - 250-300 кг.

10.2.1. Массу парной туши определяют на мясокомбинате взвешиванием после разделки и туалета. Взвешивают туши (мясо на костях) на специальных весах без внутренних органов, головы, хвоста, ног, удаленных по запястному суставу - передних и по скакательному суставу - задних, но с обязательным оставлением при туще вырезки (большой поясничной мышцы);

10.2.2. Масса внутреннего жира. Имеются существенные различия в количестве внутреннего жира в зависимости от породных особенностей животных. Скороспелые породы английского происхождения, а также калмыцкая и казахская белоголовая характеризуются более интенсивным жироотложением, чем крупные породы. Выделяют и взвешивают один раз при контрольном убое на весах жир рубашечный, околопочечный, щуповый, брыжеечный и кишечный;

10.3. Убойная масса. Величина убойной массы зависит от интенсивности откорма и породных особенностей. Определяют один раз при контрольном убое животного путем сложения массы туши и массы внутреннего жира. Определяют по формуле: $УМ=Т+Ж$, где $УМ$ - убойная масса, кг; $Т$ - масса туши, кг; $Ж$ - масса жира, кг.

10.4. Убойный выход. Определяют при контрольном убое (один раз); это процентное отношение убойной массы к предубойной живой массе.

10.5. Качество туши (качество мяса). Мясо (туша состоит из мышц, жира, хрящей и костей), полученное от убоя крупного рогатого скота, называют говядиной.

Наибольшая доля в туще приходится на **мышечную ткань** (от 60 до 70% от массы туши), которая главным образом и определяет питательные достоинства мяса. Качество мяса оценивают по развитию мышц и наличию на поверхности жировых отложений (полива). Основную массу мышцы составляют многочисленные волокна, расположенные пучками различной величины. Чем больше удельный вес этой ткани, тем ценнее туша. Мышцы взрослого скота жестче, чем у молодняка, это объясняется большим содержанием соединительной ткани с высокой гидротермической устойчивостью.

Мясность туши, или морфологический состав. Это процентное отношение между массой мяса (мякоти) и массой костей и сухожилий в тушах и отрубах. Мясность зависит от породных особенностей животных и интенсивности их выращивания и откорма. У животных лучших пород удельный вес мякоти более 80%, костей 15-20%, у животных худших пород соответственно 75 и 25%. Тушу расчленяют при более глубоком изучении мясности на 5 анатомических частей - шейную, плечелопаточную, спинно-реберную, поясничную и тазобедренную. Оценка полномясности туши дополняется измерением площади «мышечного глазка» на уровне 12-13-го ребра. Для этого делают поперечный разрез туши, наносят на пергамент контур поперечного разреза туши и площадь мышцы измеряют планиметром.

Химический состав мяса устанавливают, определяя в средней пробе мякотной части количество жира, белка, воды и золы. Проводят полную обвалку полутиш. Мясо после жиловки пропускают через волчок и перемешивают в фаршемешалке и из пяти мест отбирают пробы по 500 г для химического анализа от трех туш. С учетом современных тенденций и требований к качеству мяса оптимальным содержанием жира в говядине должно быть 10-15%. Предпочтение отдают животным, имеющим хорошо развитую мышечную систему, и животным, у которых мясо богато белковым комплексом. Содержание **полноценных белков** определяют по количеству триптофана, а неполноценных — оксипролина. Отношение содержания триптофана к оксипролину называется качественным белковым показателем. В высокооцененном мясе этот показатель равен 5 (5,3-7,4). Согласно требованиям к качеству мяса, разработанным Всесоюзным научно-исследовательским институтом мясной промышленности, в наиболее

высококачественной говядине отношение триптофана к оксипролину составляет 5,8, в средней - 4,8 В низкокачественной - 2,5.

Жировая ткань служит резервом питательных веществ, принимает участие в их обмене; она подразделяется на межмышечную, внутримышечную и подкожную. Межмышечный жир откладывается между мышцами и их группами, вокруг кровеносных сосудов и нервов в виде слоев и скоплений. Внутримышечный жир концентрируется в соединительной ткани между мышечными пучками и придает мясу мраморность, он входит в состав отрубов мяса и употребляется в пищу. Жировая ткань откладывается и в других местах, с мясом она обычно не реализуется и входит в категорию так называемых прочих жиров. Подкожный жир покрывает наружную поверхность туши (в практике его называют жировой полив), что придает ей товарный вид. По поливу можно судить о степени откорма и содержания жира в мясе. Поверхностный жир предохраняет тушу от высыхания и защищает мясо от порчи. К жирам, не входящим в состав туши, относят околопочечный, брыжеечный, кишечный.

Жиры составляют 10-30% массы туши молодняка и 30- 45% туши взрослых откормленных животных. От содержания жира зависят питательность, сочность и аромат мяса.

До недавнего времени основным показателем качества мяса считали количество в нем жира, и чем его больше, тем ценнее мясо. В настоящее время требования к качеству мяса изменились. Большой спрос на мясо с оптимальным содержанием жира (10-15%), с равномерным распределением его внутри мышц и между ними, а также в виде полива. При этом мясо должно быть нежным, сочным и с высоким содержанием белка (18- 20%)

Нежность и жесткость мяса зависят, прежде всего, от количества **соединительной ткани**. На нежность мяса оказывают влияние и диаметр мышечного волокна и мышечных пучков, содержание и распределение жира внутри мышц. Более молодая, менее зрелая говядина нежнее. Предполагается некоторая связь между структурой мышц и нежностью. На основании данных химического анализа вычисляют **калорийность** 1 кг мяса по формуле: $K=C - (Ж+З) \times 4,1 + Ж \times 9,3$, где K - калорийность мяса в калориях; C - количество сухого вещества; Ж - количество жира, г; З - количество золы, г.

Диаметр мышечных волокон зависит от породы и с возрастом увеличивается: у взрослых животных он в 3-4 раза больше, чем у новорожденных. Чем меньше диаметр мышечных волокон, тем нежнее мясо. После рождения у животных волокна сначала утолщаются быстро, а затем этот процесс замедляется. На толщину мышечных волокон влияет упитанность скота. При сильном исхудании животного диаметр мышечных волокон уменьшается почти вдвое, однако мясо становится жестче, так как в нем повышается удельный вес соединительной ткани. При улучшении кормления животных толщина волокон быстро восстанавливается и мясо становится более нежным.

С увеличением диаметра мышечных волокон уменьшается доля соединительной ткани, поэтому при оценке нежности мяса следует принимать во внимание толщину мышечных волокон и удельный вес соединительной ткани. Нужно создать условия, способствующие росту мышечных волокон без прироста соединительной ткани. Отбор животных, генетически способных к быстрому росту, и хорошее кормление играют важную роль в получении нежного мяса.

Точность определяется **влагоемкостью** говядины и содержанием в ней внутримышечного жира. Чем большей водоудерживающей способностью обладает мясо, тем меньше оно теряет воды при тепловой обработке и, следовательно, сочнее изготовленный из него продукт. Более нежное мясо сочнее.

Вкус мяса зависит в основном от содержания солей, жира и экстрактивных веществ. Выщелачивание мяса водой приводит к потере вкуса. Следовательно, элементы мяса, определяющие его вкус, в основном водорастворимы.

Вкус мяса дополняется **ароматом**, который зависит не только от естественных качеств, но и от зрелости мяса и кулинарного приготовления.

Цвет мышечной ткани обуславливается пигментами миоглобином и гемоглобином. Миоглобин придает мясу различный цвет в соответствии со степенью насыщения кислородом. При отсутствии контакта с воздухом и в глубине ткани свежее мясо имеет пурпурно-красный цвет, после краткого пребывания на воздухе (не более чем через 1 ч) оно приобретает ярко-красный цвет, а после длительного - бурый. Эти перемены цвета ускоряются при повышении температуры, что и происходит в процессе кулинарной обработки.

Мясная продуктивность животных, качество говядины зависят от многих факторов:

1. Мясная продуктивность молодняка в большой степени определяется **уровнем кормления**. Обильное кормление позволяет выращивать животных с достаточной массой туши и отличным качеством мяса.

Известно, что с возрастом изменяются функциональная направленность организма и его требования к условиям кормления, что оказывается на продуктивности мясного скота и качестве его мяса. При полноценном кормлении с возрастом увеличивается удельная масса мышечной ткани в тушах, повышается содержание жира, снижается количество влаги и возрастает калорийность мяса. Поэтому важно определить оптимальный возраст убоя животного.

На период биохимического развития растущих животных приходится 4-5% времени средней продолжительности их жизни. У крупного рогатого скота при полноценном кормлении он составляет 450-550 дней, хотя рост организма продолжается примерно до 4 лет, биохимическое развитие мышечной ткани завершается в основном к полутора годам. В этом возрасте в мышечной ткани достигается желаемое соотношение питательных веществ. Наиболее целесообразен убой скота в возрасте 1,5 – 1,7 лет, когда получают максимальный выход мяса высокого качества при минимальных затратах. Но сроки убоя зависят от породных особенностей, скороспелости, интенсивности кормления и других причин.

В мясе скота высшей упитанности содержится в среднем 61,6% воды, 19,2 - белка, 18,3 - жира, 0,9% золы. При средней упитанности количество воды возрастает до 68,3%, белка - до 20, содержание жира снижается до 10,7, золы увеличивается до 1,0%, при нижесредней упитанности - соответственно до 74,1; 21,0; 3,8 и 1,1%. Изменение химического состава сильно оказывается на энергетической ценности говядины: если в 1 кг мяса скота высшей упитанности содержится в среднем 2500- 3000 ккал, то средней - 1800-2000 и нижесредней - около 1250 ккал.

Повышенный уровень кормления и упитанности животных обуславливает: интенсивный прирост; в процессе роста животного благоприятно изменяется соотношение разных частей туши и тканей; повышается питательная ценность отдельных частей туши; убойная масса; содержание жира в мясе; калорийность.

Отличная мясность животных формируется при бесперебойном, обильном, сбалансированном кормлении молодняка от рождения до убоя. Такой молодняк дает много мяса высоких пищевых качеств, причем производство его наиболее экономно. На качество мяса оказывают влияние характер откорма и специфика используемых кормов. Однако замечено, что говядина, полученная от скота после нагула на степной траве, исключительно вкусна и ароматна.

2. Мясная продуктивность и качество мяса в значительной степени определяются **породными особенностями животных**. В улучшении качества говядины существенную роль играют специализированные породы. Скот мясных пород хорошо сочетает процессы роста и откорма, намного раньше животных молочных и комбинированных пород достигает сдаточных кондиций и в более молодом возрасте дает спелое мясо.

Несомненны преимущества такого скота по уровню мясной продуктивности. При равной живой массе с животными молочных пород у мясного скота больше убойный выход и масса туши, относительно меньше костей, сухожилий, мясо их питательнее, и его используют для приготовления лучших натуральных мясных блюд.

Превосходство мяса скота специализированных пород в качественном отношении объясняется различием в развитии мышечной системы и характером жироотложения.

Скот мясных пород имеет наиболее сильно развитые мышцы на тех частях туловища, которые дают самое лучшее мясо. Широкая, длинная и хорошо обмускуленная поясница, отлично развитая задняя треть туловища увеличивают выход ценных отрубов. Так, расположенный поверх позвоночного столба длиннейшая мышца спины имеет высокие питательные достоинства и идет на приготовление ростбифа. Широкая, прямая, хорошо обмускуленная спина и поясница, пышно развитая поясничная и подвздошно-поясничная мышцы дают сочное вкусное мясо — филей. У животных молочного типа эти стати менее обмускулены и не обеспечивают такого выхода мяса высших сортов. Значительно превосходство молодняка мясных пород и в развитии окороков. Мясо окорока молодняка используется на приготовление шницелей, взрослых животных — рулета. Отдельные скороспелые породы крупного рогатого скота — абердин-ангусская, шортгорнская (мясного типа) — дают спелое мясо в молодом возрасте.

3. Возраст. Откорм скота необходимо завершать в таком возрасте, когда питательные вещества мяса находятся в наиболее желательном для человека соотношении. Известно, что при полноценном кормлении с возрастом увеличивается удельный вес мышечной ткани в тушах, повышается содержание жира, снижается количество влаги и возрастает калорийность мяса. У крупного рогатого скота средней упитанности в период от рождения до четырех лет количество воды в организме снижается с 74 до 53%, содержание жира возрастает с 3,5 до 23,7, белка — с 17,8 до 18,8 и минеральных веществ — с 2,4 до 5,0% .

Специфика возраста — биологическая основа откорма. Чем моложе животное, тем относительно меньше тратится питательных веществ на поддержание жизнедеятельности организма и тем большая часть их откладывается в теле. Вот почему высокий уровень кормления может дать ожидаемый эффект только в период естественной способности животного к росту и не обеспечивает такой же отдачи после того, как этот рост уже завершен. Разумеется, что интенсивность выращивания и откорма, а также возраст реализации молодняка в определенной мере зависят от того, какую продукцию намечается получить — гастрономическую телятину, молодую или зрелую говядину. Вид продукции предъявляет определенные требования к характеру кормления, возрасту реализации и методам содержания.

4. Пол животного имеет определенное влияние на качество мяса. Откорм бычков эффективнее, чем телок. Приросты у телок меньше, расход кормов на 1 кг прироста больше. По живой массе они уступают бычкам примерно на 10%. Телки быстрее достигают высших кондиций. Их можно сдавать на мясо в более раннем возрасте.

Мясо телок отличается высокой биологической ценностью. Оно превосходит мясо некастрированных бычков и содержит меньше соединительных белков. Мясо телок содержит больше экстрактивных веществ, определяющих вкус и аромат мяса бульона.

Телок следует максимально использовать для воспроизводство стада. От сверхремонтных же телок можно получать хорошую говядину. Однако сравнивать животных разного пола по качеству мяса правомерно лишь в одинаковом возрасте.

Полновозрастные коровы по биологической ценности мяса, естественно, уступают молодняку (снижается количество полноценных белков). Качество мяса коров в большей степени зависит от кондиций животных, подготовки их к реализации. Питательные качества туши коровы после 3-месячного откорма до высшей упитанности повышаются почти вдвое.

5. Кастрация бычков несколько снижает интенсивность их роста, повышает затраты корма на единицу прироста. Сложилось мнение, что мясо бычков по сравнению с мясом телок и кастраторов грубоволокнистое, жесткое, обладает неприятным запахом. Это действительно так, но только при убое бычков в относительно позднем возрасте. При интенсивном выращивании и убое в 15-месячном возрасте их мясо по качеству не уступает мясу кастраторов и телок. Вместе с тем у них выше приrostы, тяжелее туши, выше товарный выход мяса при меньшем количестве депонированного жира и одинаковом выходе костей.

Некастрированные животные дают более высокий прирост при стойловом содержании. В период нагула они растут хуже кастраторов, так как беспокойно ведут себя на пастбищах. Все исследователи единодушны в том, что использовать нагул для выращивания некастрированных бычков на мясо нецелесообразно.

У некастрированных бычков диаметр мышечных волокон несколько больше. Это обуславливает повышенный выход мускулатуры. Имеются различия и в формах телосложения. Бычки обладают более развитой мускулатурой. По внешним формам они сходны с быками-производителями: хорошо обмускуленные холка, спина, поясница и задняя треть туловища.

После полутора лет качество мяса некастрированных бычков ухудшается, оно грубоет, приобретает специфический вкус. Затрудняется также обслуживание животных из-за их беспокойства. Однако к кастрации следует подходить с учетом цели откорма и запросов перерабатывающей промышленности.

Учитывая все положительные и отрицательные моменты, вопрос о кастрации следует решать конкретно. Нельзя сбрасывать со счета то обстоятельство, что некастрированные бычки обеспечивают дополнительный прирост. В условиях интенсивного скотоводства нужно шире практиковать выращивание бычков без кастрации. Но это принесет успех лишь при строгом выполнении ряда требований, хорошей организации дела. Размещать бычков необходимо на отдельных дворах, базах, пастбищах, чтобы надежно изолировать от гуртов телок и коров. Тогда бычки будут меньше беспокоиться. Выращивание и откорм должны быть интенсивными, чтобы подготовить бычков к сдаче не позднее 15-18-месячного возраста. Желательно доводить массу животных до 400 кг и более.

Значительно спокойнее ведут себя бычки, содержащиеся в период откорма на привязи. Однако содержание молодняка может быть и беспривязным. Зимний откорм проводить легче, чем нагул. Гурты надо комплектовать дружно: введение в стадо «новичков» вызывает повышенный интерес к ним со стороны «старожилов» и чрезмерное возбуждение. Желательно обеспечивать выравненность гуртов по живой массе и возрасту. К этому нужно стремиться при формировании любых гуртов вообще, а в данном же случае — в особенности. Иными словами, необходимо делать все, чтобы создать животным спокойную обстановку и успеть получить от них продукцию до того, как начнут серьезно сказываться отрицательные (с хозяйственной точки зрения) моменты в поведении некастрированных бычков. При невозможности выполнить эти условия бычков лучше кастрировать.

3. Племенная работа в хозяйствах различных направлений. Путь к эффективному свиноводству начинается на племенных фермах, которые при правильной организации работы могут постоянно обеспечивать родительское стадо ремонтными свинками необходимого качества. Однако сегодня на многих комплексах преобладает такой подход: главное - откорм и получение свинины, пусть даже от свинок, возвращенных для репродукции с откорма. На племфермы крайне неохотно отпускаются средства для реконструкции и модернизации оборудования, обучения специалистов, оснащения, например, весами для животных, не говоря уже о дефицитных шпигомерах. А ведь только на племфермах, в идентичных с комплексом условиях содержания и

кормления, можно вырастить и оценить будущих маток, адаптированных к промышленной системе свиноводства, и от этих животных гарантированно получать крепкое потомство. **Современные принципы работы племфермы заключаются в следующем:**

- Использование искусственного осеменения маток, а также одних и тех же оцененных высокопродуктивных хряков для воспроизводства племенного и товарного стада;
- Оценка молодняка и отбор лучших по продуктивности животных как племенного, так и родительского стада (а не передача всех полученных ремонтных свинок на комплекс, как часто практикуется);
- Программное обеспечение племенной оценки животных на всех этапах воспроизводства стада.

Только выполнение всех этих условий позволяет реально влиять на продуктивность товарного молодняка на откорме. При этом гарантировано снижение затрат за счет ликвидации непродуктивных животных и увеличения выхода мяса в тушах ко времени вытеснения имеющихся чистопородных маток двухлинейными кроссированными. Современные системы разведения предполагают трехступенчатую систему: племядро - репродуктор - родительское стадо комплекса, причем две первые ступени - на племенной ферме, где начинается повышение генетического потенциала товарного молодняка. При этом селекционная оценка животных должна вестись на всех уровнях, включая оценку воспроизводительных качеств маток родительского стада и хряков станции искусственного осеменения по показателям роста, затрат корма и мясности туш откормочного молодняка. Затраты на селекционное обеспечение, а это 4–6% от общих затрат предприятия, многократно перекрываются полученной прибылью.

Так, например, только увеличение многоплодия маток на 0,3 поросенка на комплексе окупает затраты на племенную службу. То, что матки родительского стада должны быть двухлинейными, а не чистопородными или возвращенными с откорма помесными неизвестного происхождения, теперь уже мало у кого вызывает сомнение. Выращивание таких свинок для комплекса на репродукторе племфермы подразумевает воспроизводство по замкнутому циклу двух линий.

При этом каждая из строго специализированных линий совершенствуется:

1. Материнская - по воспроизводительным качествам, первая отцовская - по откормочным. Полученное первое поколение от скрещивания материнской и первой отцовской линий - кроссированные свинки - более устойчивы к условиям промышленных комплексов, обладают прекрасными материнскими качествами и при этом не имеют такой осаленности, как, например, животные крупной белой породы.

2. Вторую отцовскую линию, которая используется для заключительного скрещивания, целесообразно также иметь на племферме и воспроизводить ее в чистоте по замкнутой системе разведения. Эта линия должна быть ориентирована на превосходящую обе предыдущие линии мясную продуктивность, иметь высокую скорость роста при низких затратах корма. В результате полученный товарный гибрид несет в себе 0,25 материнской, 0,25 первой отцовской и 0,5 второй отцовской крови.

Если жестко выполнять эту схему скрещивания и постоянно совершенствовать линии по собственным специфическим признакам и по сочетаемости их между собой, можно эффективно производить свинину при снижении затрат кормов, материальных и трудовых ресурсов. Только выполнение всех этих условий позволяет реально влиять на продуктивность товарного молодняка на откорме. При этом гарантировано снижение затрат за счет ликвидации непродуктивных животных и увеличения выхода мяса в тушах ко времени вытеснения имеющихся аборигенных маток двухлинейными кроссированными.

В российских системах гибридизации используются животные и зарубежной селекции. Это объясняется двумя причинами: отсутствием мясных пород свиней на наших племзаводах и состоянием племенного поголовья в хозяйствах России. Однако не всегда цель приобретения животных зарубежной селекции в достаточной степени осознана.

Так, например, при покупке хрячков мясных линий для улучшения качества собственного стада совершенно не учитывается, что их использование дает эффект лишь на короткий период, поскольку матки — среднего и ниже среднего уровня продуктивности. А во втором поколении разброс показателей продуктивности потомков еще больше.

Другой пример — закупка линейных или даже двухлинейных хрячков для использования на заключительном этапе скрещивания. Со временем, когда они состарятся, придется вновь решать вопрос о приобретении таких животных. Поскольку пока нет возможности приобретать свиней с превосходными мясными качествами в стране, придется завозить их из-за рубежа. Однако наиболее целесообразно увеличивать мясную продуктивность животных в максимально короткие сроки, закупая базовые группы свинок и хрячков для внутрилинейного их разведения и использования в локальных системах гибридизации. Это не только улучшит показатели мясной продуктивности на конкретных предприятиях — разведение таких животных в чистоте под строгим племенным контролем значительно ускорит создание генетически ценных линий в стране, так как большая часть пути в их выведении и совершенствовании уже пройдена зарубежными компаниями.

Все эти системы имеют право на существование, однако давно доказано многими отечественными и зарубежными исследованиями, что максимальный эффект гетерозиса можно получить при использовании трехлинейной гибридизации хорошо отселекционированных специализированных сочетающихся линий.

Задачей племенных хозяйств является совершенствование существующих и выведение новых высокопродуктивных пород животных, а также производство для пользовательского животноводства племенного молодняка.

2.2 Лабораторная работа 2 (ЛР-2) Особенности бонитировки свиней и овец.

2.2.1 Краткое описание проводимого занятия:

Методы разведения свиней в племенных хозяйствах.

В племенных хозяйствах и фермах практикуют, как правило, чистопородное разведение животных плановой породы; лишь в отдельных случаях по заданию Министерства сельского хозяйства РФ может быть применено вводное или воспроизводительное скрещивание. Основой чистопородного разведения служит разведение животных по линиям и семействам. В племенных заводах сосредоточена наиболее ценная часть породы и ведется глубокая работа по ее совершенствованию. Племенная продукция заводов предназначается для комплектования стад племенных хозяйств. Племенные хозяйства снабжают производителями пункты искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, а также неплеменные фермы. На племенных колхозных фермах и в промышленных совхозах племенная работа направлена на улучшение маточного стада путем правильного выращивания и отбора для целей ремонта лучшего молодняка, а также использования спермы ценных производителей.

В племенных хозяйствах регулярно отбирают лучших животных и удаляют из стада свиней плохого качества:

1. Первый раз молодняк отбирают при отъеме от маток. Для ремонта основного маточного стада оставляют свинок в 2 раза больше количества маток, а

хрячков — по три на каждого производителя. Ремонтный молодняк отбирают от маток и хряков ведущей группы. Для продажи на племя молодняк отбирают от лучших маток племенного стада.

2. Второй раз молодняк отбирают в 4-месячном возрасте. Всех выбранных животных ставят на откорм.

3. Третий отбор ремонтного молодняка проводят при подборе для случки.

4. В последующем отбирают и выбраковывают свиней ежегодно при бонитировках. Маток и хряков для спаривания подбирают по комплексу признаков, но, прежде всего по крепости конституции. За свиноматками, давшими хороший приплод, закрепляют того же хряка. При неудовлетворительном потомстве хряка меняют.

Методы разведения свиней в промышленных хозяйствах. В этих хозяйствах выделяют племенную группу животных, основное назначение которой - производство и выращивание свинок для ремонта промышленного маточного стада. Молодняк для племенной группы отбирают и выращивают от маток племенной группы, а также завозят из племенных хозяйств. Племенная группа составляет 25 – 30 % всего основного стада маток. Эту группу размещают на отдельной ферме и за ней закрепляют опытных свинарок. Отбор и подбор в промышленных хозяйствах проводят теми же методами, что и в племенных, но с применением более упрощенных форм. Все хряки, матки и ремонтный молодняк должны иметь индивидуальные номера. В племенной группе применяют индивидуальный подбор, а в промышленной - групповой. Молодых проверяемых маток закрепляют за проверенными хряками, а молодых хряков проверяют на взрослых основных свиноматках. Ежегодно часть маток племенной группы заменяют лучшими молодыми, проверенными по продуктивности. Одновременно выбраковывают часть маток промышленного стада и заменяют их высококлассными молодыми матками, выращенными в своем хозяйстве. Свиноматок племенной группы покрывают хряками этой же группы, а маток производственного стада - хряками другой породы. Чистопородный молодняк от маток племенной группы поступает на выращивание в группу ремонта, а помесные животные - на откорм.

В некоторых областях переходят на новую систему племенной работы. Она заключается в том, что в промышленных хозяйствах отсутствуют племенные фермы и ремонт стад осуществляют за счет завоза молодняка из племенных хозяйств. В этом случае промышленные хозяйства из племенных хозяйств получают уже выращенных ремонтных свинок весом 100-120 кг, скрещивают их с хряками другой породы, а все полученное потомство ставят на откорм. Кроме того, в ближайшие годы будут использоваться на товарных фермах внутрипородные и межпородные гибриды, которые по своей продуктивности превосходят негибридных свиней. Таким образом, в племенной группе применяют чистопородное разведение, а в товарной - промышленное скрещивание. При этом следует помнить, что промышленное скрещивание эффективно не при всех сочетаниях, поэтому очень важно правильно выбрать породы для скрещивания. При подборе пород берут хряка и маток таких типов, которые в сочетании могут дать потомство, отвечающее поставленной цели. Маток подбирают характерных для породы, по типу сложения, живой массе и продуктивности не ниже первого класса бонитировочной шкалы. В первую очередь следует использовать маток наиболее распространенной в данной зоне породы. Хряков выбирают высокопродуктивных, культурных пород, обладающих высокой энергией роста в молодом возрасте, дающих высокие среднесуточные привесы, проверенных по качеству потомства. Для промышленного скрещивания используют как молодых, так и полновозрастных хряков. В качестве материнской породы могут быть использованы свиньи всех отечественных пород. Министерством сельского хозяйства РФ рекомендованы определенные породы свиней для промышленного скрещивания в различных зонах страны.

Бонитировка и основные селекционируемые признаки в свиноводстве.

Увеличение производства свинины немыслимо без планомерной племенной работы в свиноводстве. Отбор животных проводят по комплексу признаков: происхождению, конституции, экстерьеру и продуктивности (скороспелости и плодовитости, крупноплодности, молочности, весу гнезда при отъеме, оплате корма и мясосальным качествам).

В раннем возрасте молодняк свиней отбирают, но происхождению и развитию, а в дальнейшем к этим признакам добавляется оценка продуктивности и оценка по качеству потомства. Особое значение при этом придают крепости конституции свиней, ибо крепкая конституция — показатель здоровья и способности животных к высокой продуктивности.

История животноводства свидетельствует о том, что односторонний отбор животных только по продуктивности, без учета конституции, приводит к ослаблению потомства, снижению его резистентности к условиям жизни и как результат всего этого к потере продуктивных качеств.

Большое внимание уделяется и отбору животных по происхождению. Каждое животное должно иметь известную родословную по четырем рядам предков. При отборе по происхождению обращают внимание на плодовитость предков.

На племя оставляют только многоплодных маток и к ним подбирают хряков, происходящих также от многоплодных маток. При отборе свиней по крупноплодности (вес поросят при рождении) большое значение придают выравненности гнезда. Чем меньше разница в весе поросят одного гнезда, тем ценнее матка. Средний вес поросят при рождении должен быть не менее 1,0—1,2 кг. Для оценки молочности маток определяют вес гнезда поросят в месячном возрасте. При обычной подкормке поросят в племенных стадах он должен составлять не менее 70 кг, в пользовательных - 50 – 60 кг. Учитывают также и материнские качества свиноматок, способность их хорошо выкармлививать сосунов.

Для оценки наследственных качеств хряков и маток в Дании еще в 1907 г. были организованы станции контрольного откорма. Затем метод контрольного откорма получил распространение в Швеции, Норвегии, Голландии, Англии и в других странах.

В нашей стране оценку наследственных качеств маток и хряков осуществляют методом контрольного выращивания (оценка по собственной продуктивности) с прижизненной оценкой мясосальных качеств и методом контрольного откорма потомства хряков и маток, проводимым на специальных станциях, в племенных заводах и отдельных племенных хозяйствах.

После оценки и отбора, животных по происхождению, конституции и продуктивности производят подбор. В племенных хозяйствах применяют индивидуальный подбор – гомогенный (однородный) или гетерогенный (разнородный).

Контрольное выращивание. Одним из методов совершенствования племенных свиней по откормочным и мясным качествам является контрольное выращивание или оценка ремонтного молодняка по продуктивности. Оценке подвергают весь ремонтный, а в хозяйствах, реализующих племенных свиней весом 90 –100 кг, и весь племенной молодняк. При этом создают оптимальные условия кормления и содержания, необходимые для выращивания высокооцененных племенных животных. Обязательным условием при контролльном выращивании являются систематические прогулки и доступ к зеленым кормам в весенне – летне -осенний период. При выращивании учитывают возраст, в течение которого животные достигают живой массы 100 кг, вычисляют среднесуточные привесы и прижизненно оценивают мясосальные качества. Лучших по этим показателям животных оставляют в хозяйстве, а худших выбраковывают. Приплод, полученный от этих животных, тоже ставят на проверку. По ее результатам делают заключение о назначении животных (ремонт, продажа, брак), а также производят

окончательную оценку их родителей (ведущая группа, производственная, брак). Прижизненную оценку мясосальных качеств при контролльном выращивании осуществляют с помощью специальных приборов.

Для оценки скороспелости и мясосальных качеств при контролльном выращивании имеются специальные шкалы. Так, для крупной белой породы установлены следующие требования: класс элита - вес 90 кг животные должны иметь в возрасте 200 дней и менее; первый класс – 201-220 дней; второй класс – 221- 240 дней. Требования по толщине шпика соответственно 30-32 мм, 33-35, 36 мм и более. Метод контролльного выращивания позволяет проводить оценку свиней в любом хозяйстве, при этом нет надобности строить специальные станции. Следовательно, это метод эффективен и его целесообразно как можно шире внедрять в практику.

Контрольный откорм - оценка племенных хряков и маток по скорости роста, затратам корма на единицу прироста и мясным качествам их потомков (сыновей и дочерей) путем откорма в контролируемых условиях -совокупность заданных параметров микроклимата в помещении для откорма, размещения и кормления животных на контролльном откорме.

При контролльном откорме оценивают непосредственно генотип племенных животных путем откорма их потомства. При этом учитывают скороспелость, затраты кормов и мясные качества животных. Это мероприятие проводят на контролльных станциях и в хозяйствах зоотехники селекционеры при этом строят специальные свинарники или используют помещения, приспособленные для этих целей. На каждую голову должно приходиться не менее 1,2 м² площади пола. Для проверки родительских пар из гнезда в 2-месячном возрасте отбирают двух боровков и двух свинок весом, равным среднему весу подсвинка по гнезду, но не менее 16 кг. Хрячков, предназначенных для контролльного откорма, кастрируют в 6 – 7-недельном возрасте. Подсвинки на контролльном откорме содержатся гнездами, по четыре головы, или индивидуально. Кроме ветеринарной обработки против инфекционных заболеваний, животных подвергают дегельминтизации. Для кормления свиней используют стандартный комбикорм (рецепт 55-5). В течение всего периода контролльного откорма каждому подсвинку дополнительно дают 1 1/2 л обрата. Кормят подсвинков 2 раза в день, не допуская отходов и потерь корма. Комбикорм замешивают обратом и водой. Количество скормленных кормов записывают по каждому гнезду, если подсвинки содержатся по четыре в станке, и индивидуально, если в станке один подсвинок.

Учетный период начинают, когда животные в среднем весят 25 кг, а заканчивают при достижении каждым подсвинком веса 95 кг. По окончании откорма животных направляют на мясокомбинат или боенский пункт и до убоя содержат отдельно от других животных. Контрольный убой производят без съемки шкуры, со ошпаркой туш. Туши разделяют по специальной схеме. Хряков и маток оценивают по следующим показателям: возраст при достижении живого веса 95 кг; среднесуточный привес за период откорма (от 25 до 95 кг); расход кормов (в кормовых единицах) на 1 кг привеса за период откорма; убойный вес (в убойный вес включается вес парной туши с кожей, головы, ног, почечного жира). Для оценки животных по откормочным и мясосальным качествам пользуются примерной шкалой.

Животных, не удовлетворяющих требованиям второго класса, относят к внеклассным. Суммарный класс за откормочные и мясосальные качества выводят по таблице определения классности по трем показателям, согласно инструкции по бонитировке свиней. На основании данных контролльного откорма потомство хряков и маток, внеклассных по скороспелости, оплате корма и неудовлетворительных по мясосальным качествам, выбраковывают. При составлении плана случек пары подбирают с учетом закрепления и развития высокой скороспелости, оплаты корма и

желаемых мясосальных качеств; лучших сестер и братьев из гнезда, получивших высокую оценку при контрольном откорме, оставляют для ремонта стада.

Осматривают животных в следующем порядке: хряков по линиям и родству: отец, братя, сыновья, дочери, внуки; маток по родственным группам (семействам): мать, сестры, братя, дочери, внуки. Развитие хряков и маток оценивают по живой массе, длине туловища и обхвату груди. Класс по развитию определяют по таблице, которая имеется в инструкции МСХ РФ. Хряков и маток взвешивают и измеряют в состоянии заводской упитанности, маток — на пятый день после одного из опоросов, предшествующих бонитировке. Экстерьер оценивают по 100-балльной шкале, К классу элиты относят хряков и маток, получивших не менее 90 баллов; к первому классу — хряков, получивших не менее 85 баллов, маток — не менее 80 баллов; ко второму классу — хряков, получивших не менее 80 баллов, маток — не менее 70 баллов. Оценка хряков и маток по развитию в возрасте трех лет является окончательной; переоценка в старшем возрасте возможна только в сторону повышения класса.

Продуктивность хряков оценивают при назначении в случку (первая оценка) по продуктивности обоих родителей. При отсутствии сведений о продуктивности отца продуктивность хряка определяют по показателям продуктивности матери. Оценку продуктивности хряков производят также после опороса покрытых хряками маток по живому весу потомства; класс хряка по живому весу потомства определяют средними показателями живого веса всех поросят в 2- или 4-месячном возрасте от всех, но не менее чем от пяти маток, выращенных в условиях правильного кормления и содержания- При наличии данных живого веса молодняка в 2- и 4-месячном возрасте оценку проводят по весу в 4- месячном возрасте. Основным показателем племенной ценности хряка считается оценка его по откормочным и мясным качествам потомства методом контрольного откорма и контрольного выращивания. После опоросов дочерей хряка его оценивают по продуктивности дочерей.

По результатам бонитировки для хряков и маток устанавливают четыре класса: элита-рекорд, элита, первый и второй. Хряки второго класса могут быть использованы в качестве производителей как исключение. Их случают только с матками производственной (товарной) группы в промышленных стадах. Суммарный класс устанавливают на основании оценки развития, продуктивности и экстерьера только для хряков и маток с крепкой конституцией, имеющих не менее 12 нормально развитых сосков (6/6). Из племенного стада подлежат выбраковке животные, имеющие один из следующих недостатков экстерьера: явно выраженную провисость спины или резкий перехват за лопатками, недоразвитость или неравномерное развитие семенников (у хряков), мопсовидность, криворылость, неправильный прикус, кратерные соски (у маток и хряков). Для хряков и маток, оцененных классом элита по экстерьеру, а также по каждому показателю развития (живой вес, длина туловища, обхват груди), по всем показателям продуктивности (плодовитость, молочность, вес гнезда при отъеме от маток, продуктивность дочерей у хряков) и получивших суммарную оценку класса элита по откормочным и мясным качествам, устанавливают класс элита-рекорд.

Ремонтный молодняк отбирают из приплода животных племенной группы в соответствии с планом племенной работы в отдельных линиях, семействах, родственных группах. Кроме того, свинок отбирают из приплода хряков, поставленных на проверку, а также от маток, давших рекордные показатели продуктивности. При составлении плана подбора к маткам, как правило, подбирают хряков более высокого качества, способных сочетать и усиливать в потомстве лучшие показатели родителей и устранять недостатки телосложения, а также продуктивности. Предварительный отбор ремонтного молодняка из намеченных по плану гнезд, а также племенного поголовья проводят в 2- месячном возрасте. Для ремонта отбирают молодняка в полтора-два раза больше, чем требуется хозяйству. Отбирают только здоровых, нормально развитых поросят элита и I класса,

имеющих не менее 12 хорошо развитых сосков. Ремонтный и племенной молодняк, не соответствующий указанным требованиям, выбраковывают и ставят на откорм. Выращенный ремонтный молодняк ежемесячно осматривают и взвешивают, а в 6- и 9-месячном возрасте и перед случкой берут промеры. Окончательный отбор и оценку ремонтного молодняка проводят перед случкой.

Ремонтных хрячков и свинок бонитируют в возрасте от четырех месяцев и старше одновременно с животными основного стада. Во время бонитировки проверяют ушные номера у каждого животного, взвешивают, берут промеры, оценивают экстерьер, проводят выбраковку. Суммарный класс ремонтного и племенного молодняка устанавливают: до 6-месячного возраста по живому весу и классности родителей, с 6-месячного возраста по классу за живой вес, длину туловища и по классности родителей. Если родители имеют за экстерьер, продуктивность или развитие оценку ниже первого класса, то полученных от них хрячков на ремонт не оставляют и в случку не допускают.

После бонитировки проводят анализ показателей стада и уточняют распределение животных по производственным группам. В ведущую (селекционную) группу племенных заводов, племенных совхозов и племенных ферм хозяйств отбирают хряков и маток, лучших по происхождению, конституции, экстерьеру, развитию, продуктивности, в соответствии с планом племенной работы. Составляют план индивидуального подбора хряков и маток, чтобы у потомства улучшить конституцию, экстерьер, повысить плодовитость, способность к откорму (скороспелость, оплата корма, мясные качества). Для этого анализируют не только результаты проведения бонитировки, но и эффективность предыдущих спариваний хряков и маток, выявляют, в каких сочетаниях получены наиболее высокие показатели продуктивности и лучшее по качеству потомство. Лучшие сочетания повторяют в дальнейшей племенной работе. Особое внимание обращают на подбор хряков к маткам ведущей группы, чтобы получить ремонтный молодняк из определенных линий и семейств желательного типа и качества.

4. Племенная работа в овцеводстве имеет свои особенности. Основным методом разведения является чистопородное. В отдельных случаях допускается прилитие крови при обязательном сохранении конституциональных и продуктивных качеств, присущих материнской породе.

В племенных фермах ведется индивидуальный учет происхождения, племенного использования, показателей продуктивности баранов и маток селекционной группы, их потомства. Для элитных маток практикуется индивидуальный отбор и подбор с оценкой их потомства.

В пользовательных стадах, где главной задачей является получение возможно большего количества и лучшего качества шерсти, мяса и другой продукции, используют чистопородное разведение. Если чистопородные животные не отвечают требованиям, то применяют скрещивание с баранами одного направления продуктивности, с тем чтобы увеличить количество и улучшить качество основной продукции — шерсти. Индивидуальный учет живой массы и настрига шерсти в этих стадах ведется только в группах баранов и лучших маток.

Бонитировка и основные селекционируемые признаки в овцеводстве. Технические, или физические, свойства шерсти характеризуются тониной, длиной, извитостью, крепостью, растяжимостью, упругостью, эластичностью, цветом, блеском, влажностью и выходом чистого волокна (рис. 4).

1. Тонина — основной показатель качества шерсти. Ее определяют по диаметру поперечного сечения шерстянки в микронах. В зависимости от тонины однородную шерсть по Брадфорской системе делят на 13 классов. Тонкая шерсть, имеющая тонину от 14,5 до 18,5 мкм, относится к 80-му классу, от 18,1 до 20,5 — к 70-му, от 20,6 до 23,0 — к 64-му и от 23,1 до 25,0 — к 60-му классу тонины. Полутонкая шерсть имеет классы тонины от 58-го (25,1—27,0 мкм) до 32-го (55,1—67,0 мкм). От тонины шерсти

зависит тонина пряжи и качество шерстяных тканей. Из 1 кг тонкой мытой однородной шерсти 60—64-го класса можно выработать 3—4 м² легкой ткани, а из шерсти 40—36-го класса только 1 м².

2. **Длина** шерсти может быть естественной (высота шерстинок в шапеле или косице с извитостью) и истинной (длина распрямленных шерстинок). Длина шерсти тонкорунных овец 6—11 см, полутонкорунных 12—40 см, грубошерстных 20—30 см. Чем длиннее и гуще шерсть, тем больше настриг; из длинной шерсти изготавливают тонкую и прочную нить.

3. **Крепость** шерстинки на разрыв определяют динамометром.
4. **Растяжимость** — свойство шерстинки растягиваться сверх истинной длины;
5. **Упругость** — свойство восстанавливать первоначальную форму после сжатия;
6. **Пластичность** — свойство сохранять форму, приданную под воздействием влаги и тепла (глажение);
7. **Блеск** — свойство шерстяных волокон отражать лучи света зависящее от расположения чешуек верхнего слоя; цвет предпочтается белый.

2.3 Лабораторная работа 3 (ЛР-3) **Организация племенной работы в России.**

2.3.1 Краткое описание проводимого занятия:

Одним из основных условий эффективного ведения селекционно-племенной работы в животноводстве является четкое взаимодействие всех структурных элементов селекционной схемы. Организации, координирующие, обслуживающие и непосредственно осуществляющие деятельность по воспроизведству племенных генетических ресурсов, должны быть однозначно идентифицированы с указанием их функций и принципов. Очевидно, что в условиях рыночных отношений государственные органы по управлению племенным животноводством не должны, как прежде, жестко управлять деятельностью предприятий этой отрасли.

В современных условиях схема управления племенной работой должна обеспечить принцип разделения исполнительных и контрольных функций между государственными органами и негосударственными предприятиями.

Общая структурная схема организаций племенного животноводства РФ, молочного скотоводства и схема организаций племенного животноводства области приведены на рисунке 1 , 2 и 3.

В соответствии с разработанной схемой государственную племенную службу представляют:

- Минсельхоз России и государственные органы по управлению племенным животноводством субъектов Российской Федерации (разработка законодательной и нормативной базы ведения племенного животноводства);
- Федеральная служба и региональные органы племинспекций (осуществление контрольных функций за соблюдением норм и правил в области племенного животноводства);
- Федеральное агентство по сельскому хозяйству и региональные органы по управлению племенной работой (реализация федеральных и региональных программ развития племенного животноводства, осуществление государственной поддержки племенных организаций).

К числу негосударственных структур относятся:

- ассоциации (союзы, объединения) племенных организаций по совершенствованию пород животных (разработка селекционных программ, осуществление сертификации и др. услуги);
- информационно-селекционные центры породного уровня управления (разработка и ведение баз данных животных, информационно-анатомические услуги ассоциациям и

другим племенным организациям);

- региональные организации по племенному делу (организация внедрения селекционных программ в регионе, консультационные и др. услуги);
- региональные вычислительные центры (сбор данных племенного и зоотехнического учета для формирования баз данных регионального уровня, подготовка аналитических сводок в регионе);

Организационная структура племенного молочного скотоводства в Российской Федерации

- Организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных [обеспечение генетическим материалом (спермой, эмбрионами) владельцев маточных стад];
- Лаборатории генетической экспертизы (контроль достоверности происхождения);
- Лаборатории по определению качества молока (измерение селекционных характеристик молока: жир, белок, соматические клетки и т. д.);
- Племенные заводы и репродукторы (воспроизводство племенных ресурсов, получение животноводческой продукции).

Отдел племенных ресурсов с госплеминспекцией

Задачи отдела

- Осуществление единой государственной политики в области племенного животноводства.
- Участие совместно с органами управления АПК субъектов РФ в организации племенного дела.
- Осуществление государственно-инспекторского контроля за соблюдением норм и правил ведения племенного животноводства организациями независимо от их подчиненности и форм собственности в соответствии с Федеральным законом "О племенном животноводстве".

Общая структурная схема организаций в области племенного животноводства

- Государственный надзор за использованием племенных ресурсов, биотехнологий в животноводстве, развитием сети племенных организаций.
- Контроль за международным обменом племенной продукцией (материалом) сельскохозяйственных животных и соблюдением требований по охране прав патентообладателей по ввозимому племенному материалу с территории Российской Федерации. Организация и проведение Всероссийских отраслевых конкурсов, выставок, семинаров по племенному животноводству

Отдел нормативной документации, лицензирования

Задачи отдела

- Проведение единой государственной политики в области племенного животноводства.
- Управление племенным животноводством в Российской Федерации, контроль за соблюдением норм и правил ведения племенного животноводства организациями независимо от их подчиненности и форм собственности, гражданами и лицами без гражданства - владельцами животных и племенной продукции.
- Координация деятельности систем информационного обеспечения в области племенного животноводства.
- Организация разработки, экспертизы, утверждения, государственной регистрации стандартов, норм и правил по племенному животноводству.
- Проведение работ по лицензированию деятельности в племенном животноводстве.
- Организация испытаний пород (типов, кроссов, линий) сельскохозяйственных животных. Проведение работ по сертификации племенного материала (продукции) сельскохозяйственных животных

Отдел федеральных государственных племенных организаций и господдержки

Задачи отдела

- Внесение предложений по Реестру объектов федеральной государственной собственности и организационно-структурным изменениям подведомственных федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений, принимает участие в оформлении этих изменений в установленном порядке.
- Организация подготовки проектов уставов подведомственных федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений для утверждения их в установленном порядке.
- Участие в проведении аттестации руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и их конкурсному замещению.
- Осуществление контроля за сохранностью и надлежащим использованием основных средств и имущества, закрепленного за подведомственными организациями.
- Анализ отчетов руководителей подведомственных федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений.

Отдел федеральных отраслевых программ, систем и технологий

Задачи отдела

- Разработка и реализация федеральных и отраслевых программ, систем и технологий в отраслях животноводства.
- Совершенствование форм экономических взаимоотношений товаропроизводителей животноводческой продукции с перерабатывающими и торговыми предприятиями, организациями сервисного обслуживания и финансовыми структурами.
- Определение приоритетных направлений и тематик по научно-техническим программам и хоздоговорным работам в отраслях животноводства, участие в подготовке и согласовании договоров на их выполнение и финансирование.

Отдел информации, анализа и прогнозирования

Задачи отдела

- Анализ состояния отраслей животноводства и прогнозирование производства животноводческой продукции в стране на долгосрочную и краткосрочную перспективу.
- Подготовка оперативной, общей и справочной информации по вопросам состояния и мерам по стабилизации отрасли животноводства.
- Участие в разработке концепций и перспективных программ отрасли, интегрированных структур, мер по защите интересов отечественных производителей животноводческой продукции от массированного импорта продукции животного происхождения, в организации и проведении отраслевых семинаров, совещаний, конференций, выставок, конкурсов и реализации мер по государственному регулированию производства животноводческой продукции.
- Доведение информации о проведении мероприятий Всероссийского значения по вопросам животноводства до субъектов Российской Федерации.

Повышение эффективности работы отрасли

Отдел рационального использования кормовых ресурсов

Задачи отдела

- Разработка и осуществление мер по рациональному использованию кормовых ресурсов, организация испытания новых видов кормов и кормовых добавок.
- Разрабатывает совместно с научно-исследовательскими учреждениями современные зоотехнические и организационно-технологические параметры индустриальных технологий в отраслях животноводства.
- Осуществляет контроль за соблюдением Федерального закона "Об охране окружающей природной среды" в части организации экологически безопасной работы животноводческих объектов.

Селекционные центры осуществляют управление селекционным процессом со всем массивом животных отдельных пород. Совместно со специалистами региональных и

областных племобъединений:

1. Отбираю маток и ремонтных производителей;
2. Составляют план подбора для получения ремонтных производителей;
3. Координируют работу по оценке и отбору производителей на всех этапах селекции;
4. Составляют регламент использования спермы проверяемых и оцениваемых производителей;
5. Составляют и размножают материалы по оценке производителей, наличию спермы с указанием их племенной ценности и линейной принадлежности;
6. Составляют и размножают годовой отчет по племенной работе с породой;
7. Разрабатывают программу селекции и план племенной работы с породой.

Работники региональных и областных племобъединений под руководством селекционеров проводят племенную работу с породами в своей зоне. Совместно со специалистами селекционных центров и племенных заводов:

1. Отбирают маток для получения ремонтных производителей;
2. Составляют план заказного спаривания;
3. Комплектуют племпредприятия ремонтными производителями;
4. Проводят оценку и отбор производителей по развитию, воспроизводительной способности и качеству потомства;
5. Создают запас замороженной спермы от проверяемых производителей;
6. Регламентируют использование спермы проверяемых и оцененных производителей.

Основная задача племенных заводов и племенных хозяйств – получение ремонтного молодняка для станций искусственного осеменения с высоким генетическим потенциалом продуктивности.

Основные направления деятельности государственной племенной службы области Государственная племенная служба области в соответствии со ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации "О племенном животноводстве" и постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 1996 года № 244:

1. Проводит единую научно-техническую политику в области племенного животноводства;
2. Организует разработку и реализацию областных программ развития племенного животноводства в соответствии с федеральными программами;
3. Обеспечивает надлежащую экспертизу продукции (материала);
4. Контролирует соблюдение стандартов, норм и правил в области племенного животноводства;
5. Регистрирует племенных животных и племенные стада соответственно в государственной племенной книге племенных животных и государственном племенном регистре;
6. Выдает лицензии на осуществление деятельности в области племенного животноводства;
7. Выдает сертификаты (свидетельства);
8. Определяет виды организаций по племенному животноводству, контролирует их деятельность, разрабатывает предложения о мерах по государственному стимулированию племенного животноводства;
9. Осуществляет сотрудничество с другими регионами Российской Федерации и другими государствами в области племенного животноводства;
10. Устанавливает сотрудничество с научно-исследовательскими учреждениями страны, занимающимися вопросами разведения и генетики сельскохозяйственных животных, биотехнологии искусственного осеменения животных и трансплантации эмбрионов;

11. Организует и проводит учебу специалистов по племенному делу в животноводстве, пропагандирует научно-технические достижения в племенном животноводстве, проводит выставки, аукционы животных;
 12. Выдает разрешение на проведение искусственного осеменения животных и трансплантации эмбрионов по заявкам юридических и физических лиц;
 13. Осуществляет контроль за сохранением и поставкой семени для проведения искусственного осеменения сельскохозяйственных животных;
 14. Комплектует и создает запас семени производителей в специальном биохранилище согласно принятым системам разведения животных в области;
 15. Проводит оценку племенных животных-производителей;
 16. Обобщает данные о проведении бонитировки животных и информирует заинтересованных лиц о ее результатах;
 17. Осуществляет закупку и продажу племенных животных внутри области и других регионах Российской Федерации для поставки их юридическим и физическим лицам, занимающимся разведением сельскохозяйственных животных;
 18. Вносит предложения по расширению племенной базы всех видов сельскохозяйственных животных;
 19. Выполняет иные функции в соответствии с положениями, утвержденными соответствующими органами исполнительной власти, за исключением тех, исполнение которых отнесено к ведению госплемслужбы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации.
- Основные права и функциональные обязанности в деятельности главного государственного инспектора области племенного животноводства
- Главный государственный инспектор в области племенного животноводства в пределах своей компетенции имеет право:
1. Беспрепятственно посещать организации по племенному животноводству и получать от них безвозмездно необходимую информацию;
 2. Давать организациям по племенному животноводству предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации в области племенного животноводства и осуществлять контроль за выполнением указанных предписаний;
 3. Приостанавливать реализацию племенной продукции (материала) при условии, если выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области племенного животноводства;
 4. Определять государственный надзор за применением в области селекции и воспроизведения племенной продукции (материала) новой технологии, инструментов, оборудования, материалов и биотехнологических методов;
 5. Не допускать реализацию и иного использования племенной продукции (материала) без сертификата (свидетельства);
 6. В случае нарушения норм и правил в области племенного животноводства аннулировать лицензии на осуществление деятельности в области племенного животноводства или приостанавливать действие указанных лицензий;
 7. Давать заключения по спорам, возникающим между гражданами (крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), юридическими лицами при осуществлении деятельности племенного животноводства;
 8. Привлекать к административной ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в области племенного животноводства.
 9. Контролировать выполнение селекционных программ;
 10. Контролировать использование племенного скота, семени племенных животных-производителей и эмбрионов для разведения сельскохозяйственных животных;
 11. Контролировать реализацию племенной продукции (материала);
 12. Определять надзор за применением в области селекции новых технологий,

инструментов, оборудования и биотехнологических методов;

13. Не допускать реализации и иного использования племенной продукции материала) без сертификата (свидетельства);

14. Контролировать выполнение предписаний главного государственного инспектора в области племенного животноводства.

2.4 Лабораторная работа 4 (ЛР-4) Деятельность организаций по племенному животноводству. Перспективные планы селекционно-племенной работы.

2.4.1 Краткое описание проводимого занятия:

1. Племенной завод:

- Располагает стадом высокопродуктивных животных определенной породы, в котором все поголовье чистопородно не менее, чем в четырех поколениях;
- Численность поголовья обеспечивает воспроизводство селекционируемого типа животных на заявленный срок действия лицензии;
- Производит племенной материал (продукцию), как правило, для племенных репродукторов, а также достоверно превосходит последние по показателям продуктивности и племенной ценности, животных в регионе, зоне, стране (необязательно при разведении генофондной породы и исходной линии кросса);
- При отсутствии в организации самцов-производителей в связи с использованием искусственного осеменения завозится семя (сперма) от производителей селекционируемого в стаде организации типа, причем не менее 70% из них относится к категории улучшателей по результатам оценки по качеству потомства;
- Использование в стаде племенного материала другой породы отвечает требованиям статьи 31 федерального закона "О племенном животноводстве" (скрещивание племенных животных разных пород допускается только по согласованию с Департаментом животноводства и племенного дела Минсельхоз России).

2. Племенной репродуктор:

- Разводит (размножает) животных в целях обеспечения потребностей в племенной продукции граждан и юридических лиц, осуществляющих сельскохозяйственное производство;
- Имеет стадо, созданное путем завоза племенного материала из племенного завода или поступления по импорту, а также созданное на другой основе, но отвечающее при первом лицензировании требованиям органа госсплемслужбы. При работе с кросом линий допускается укомплектование стада из других племенных репродукторов (первого порядка);
 - Достоверно превосходит по продуктивности животных определенной породы ее показатели при разведении на фермах граждан и юридических лиц, осуществляющих сельскохозяйственное производство в намечаемой зоне деятельности репродуктора;
 - Ежегодно реализует сертифицированную племенную продукцию или имеет официальные заявки на ее приобретение.

В целях лицензирования к категории племенных репродукторов относятся заводские конюшни.

3. Организация по искусственноому осеменению сельскохозяйственных животных:

- Содержит племенных животных-производителей определенных пород, которые используются для получения семени;
- Проводит работы по получению, обработке, контролю качества, хранению и поставке семени (спермы) для проведения искусственного осеменения сельскохозяйственных животных;
- Ведет работу по проверке производителей по качеству потомства.

Новая организация создается и лицензируется по согласованию с Департаментом животноводства и племенного дела Минсельхоз России

4.Организация по трансплантации эмбрионов:

- Проводит работу по организации заказных спариваний маточного (донорского) поголовья;
- Получает, обрабатывает эмбрионы и осуществляет контроль их качества;
- Проводит трансплантацию по заказам и (или) реализует эмбрионы другим сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Новая организация создается и лицензируется по согласованию с Департаментом животноводства и племенного дела Минсельхоз России

5. Организация по учету, контролю, оценке уровня продуктивности и качества продукции, племенной ценности животных:

а) Организация осуществляет обслуживание племенного животноводства путем регистрации генотипических и фенотипических признаков животных для использования полученных данных в селекции животных при наличии лицензии на один или несколько перечисленных ниже видов деятельности:

- Контрольно-испытательная станция животноводства испытывает породы (типы, исходные линии и кроссы линий) и стаде животных с целью выявления и оценки их показателей в оптимальных условиях содержания, кормления и ухода;
 - Лаборатория селекционного контроля качества молока, шерсти и другой продукции животноводства осуществляет свою деятельность на основе установленных стандартов и правил;
 - Лаборатория иммуногенетической экспертизы проводит контроль происхождения животных и генетических аномалий, выявляет генетическую разницу между породами и стадами в соответствии с установленными правилами и методиками;
 - Центр информационного обеспечения ведет банк данных о поголовье, его происхождении, воспроизводстве и бонитировке животных, проводит оценку племенной ценности стад и отдельных животных, получая исходные данные от государственных племенных служб и организаций по племенному животноводству, и участвует в деятельности федеральных
 - Систем информационного обеспечения животноводства;
- б) Организация по племенной работе осуществляет комплексно указанные в п.5(а) виды деятельности;
- в) Ипподром - проводит испытания племенных лошадей на резвость и силу по устан **Станции по племенной работе и искусенному осеменению**
сельскохозяйственных животных – это основные центры организации и проведения племенной работы по качественному улучшению разводимых пород животных. Они руководят размещением, воспроизводством и рациональным использованием племенных ресурсов в товарном и племенном животноводстве.

Их основная материально–техническая база – станции по искусственному осеменению, на которых сосредоточены лучшие производители разводимых пород животных.

Достигнутый уровень племенной работы с породами и массовое применение искусственного осеменения требуют обоснованного подхода к планированию племенной работы, правильного выбора методов разведения и селекции животных по основным хозяйствственно полезным признакам.

Главная задача в работе станций – получение в каждом последующем поколении потомства, превосходящего по продуктивным качествам своих матерей. Для этого по каждой области и зональной станции по племенной работе и искусственному осеменению должен быть составлен план племенной работы. В нем анализируется состояние развития скотоводства зоны и намечаются меры по дальнейшему совершенствованию животных.

Внутризональное породное районирование и организация племенной сети.

В зонах деятельности ряда областных и межрайонных станций по племенному делу и искусственно осеменению сельскохозяйственных животных, а также в отдельных хозяйствах имеется по нескольку плановых пород скота. Встречается также разведение неплановых пород, завезенных в зоны без учета плана породного районирования или для экспериментальных целей.

Многопородность в зоне усложняет плановую работу с отдельными породами, затрудняет комплектование станций искусственного осеменения производителями нужных пород и линий, снижает эффективность их племенного использования.

Ценные племенные стада неплановых пород могут быть оставлены в зоне для репродукции племенного молодняка в другие области, а стада животных, не представляющие племенной ценности, подвергаются поглотительному скрещиванию с основной плановой породой.

Породное районирование на перспективу оформляют по каждому хозяйству, отделению и ферме с указанием численности маточного поголовья на начало и конец планируемого периода.

Особенности селекционной работы в племенных и товарных стадах. Вся система племенной работы в племенных хозяйствах нацелена на увеличение количества реализуемой племенной продукции и повышение ее качества. Остальная продукция животноводства (молоко, мясо) является сопутствующей.

В таблице 1 приведены в сжатой форме характеристика особенностей селекционной работы в племенных и товарных стадах.

Перспективные планы селекционно-племенной работы

Перспективные планы селекционно-племенной работы составляются как правило на 5 лет. Основная цель такого планирования заключается в том, чтобы наметить наиболее эффективные пути быстрейшего улучшения животных - в стаде, районе, области или породы в целом по главным хозяйственно полезным признакам. Первым этапом составления перспективного плана с породой является разработка задач для отдельных хозяйств по каждому виду животных. Второй этап – разработка плана племенной работы для зоны деятельности головного предприятия. Далее идет разработка областных комплексных планов племенной работы по всем видам животных.

Завершается планирование составлением плана племенной работы с породой в пределах региона.

Таблица 1 - Особенности селекционной работы в племенном и товарном молочном скотоводстве

Показатели	Племзаводы	Племсовхозы и племфермы	Товарные хозяйства
1	2	3	4
Цели селекции	Выведение ценных быков-производителей с устойчивой наследственностью для племпредприятий и станций искусственного осеменения с.-х. животных; совершенствование существующих и создание новых пород, типов, заводских линий и семейств	Размножение и проверка племенного материала, созданного в племзаводах, выведение быков-производителей для племпредприятий, реализация племенного маточного поголовья, совершенствование линий и семейств, выведение новых породных типов	Максимальное производство молока и мяса при наименьших затратах средств и труда

	Признаки отбора	Удой, жирность и белковость молока, плодовитость, желательный тип, живая масса, долголетие, устойчивость к заболеваниям, морфофункциональные качества вымени, племенная ценность предков	Удой, жирность и белковость молока, плодовитость, желательный тип, живая масса, долголетие, устойчивость к заболеваниям, морфофункциональные качества вымени, нрав, качество родословной	Продуктивность (удой и % жира), воспроизводительные качества, интенсивность молокоотдачи, пригодность к машинному доению
	Дифференцировка животных по их назначению	Селекционная группа (матери быков) Группа воспроизводства (племядро) Животные на выранжировку Животные на выбраковку	Коровы – матери быков, отцы коров. Группа воспроизводства. Животные предназначенные на выранжировку и выбраковку	Племядро. Производственная группа, животные на выбраковку
	Методы разведения	Чистопородное. Заводское и вводное скрещивание	Чистопородное, прилитие крови	Поглотительное скрещивание, чистопородное, промышленное и переменное скрещивание
	Система разведения	Основная – по линиям, дополнительная – межлинейные кроссы	Основная – по линиям, межлинейные кроссы	Ротация генеалогических групп или линий
Типы подбора		Индивидуальный, однородный по генетическому сходству и фенотипу	Индивидуальный, групповой, разнородный, однородный по фенотипу или генетическому сходству	Линейно-групповой
Спаривание		Родственное: внутрилинейный инбридинг в умеренных и близких степенях при выведении быков производителей; инбридинг умеренный и отдаленный для закрепления и усиления ценных особенностей у потомства выдающихся мужских предков и при консолидации новых линий; аутбридинг при выведении новых линий	Родственное: внутрилинейный инбридинг в умеренных и близких степенях на лучших коровах племядра для закрепления и усиления ценных качеств выдающихся предков; аутбридинг на остальной части животных племядра и группы воспроизводства	Неродственное спаривание, исключающее стихийный инбридинг и ведущее к повышению гетерозиса у потомства
Технология отбора		Поэтапный: по качеству родословной, качеству родителей и боковых родственников, линейной и семейной принадлежности, собственному фенотипу (комплексу признаков) и качеству потомства	Поэтапный: по качеству родословной, боковых родственников, собственному фенотипу (комплексу признаков) и качеству потомства	По племенной ценности отцов и матерей, по собственной продуктивности

Формы отбора	Направленный по всему комплексу выдающихся признаков	Направленный по продуктивности и тем технологическим признакам, которые необходимо улучшить	Направленный по удою и телосложению, стабилизирующий по технологическим признакам
Методы отбора	Комбинированный: индексный по комплексу основных хозяйственно полезных признаков, по остальным согласно установленным минимальным стандартам	Комбинированный: индексный по уровню удоя и качеству молока, по другим признакам – по независимым уровням	По независимым уровням

Однако необходимо, чтобы областные планы племенной работы и планы по породе были увязаны между собой, так как породным районированием в области предусматривается разведение только 1 – 2 пород одного вида сельско **Принципы породного районирования.** Для нашей страны породное районирование имеет большое значение. Каждую породу следует разводить в наиболее подходящих для нее общехарактеристиках условиях. В то же время лучшие мировые породы сельскохозяйственных животных отличаются большими адаптационными способностями к самым разнообразным природно-климатическим и технологическим условиям. Животные всех пород в новых условиях эксплуатации изменяются под их влиянием, приспособливаются к ним, но при соответствующем кормлении и содержании сохраняют хозяйственно полезные качества.

В современных условиях районирование пород по крупным природно-экономическим регионам страны, областям и хозяйствам должно строиться с соблюдением следующих принципов:

- порода, планируемая для разведения в конкретных хозяйственных условиях, должна обеспечивать получение максимального количества животноводческой продукции при наименьших затратах труда и материальных средств;
- животные плановой породы должны быть наилучшим образом приспособлены к природным и экономическим условиям конкретного региона;
- план породного районирования должен обеспечивать возможность организации оптимальной программы селекции животных разводимой породы;
- возможность организации племенной базы (если ее нет) породы в данной области или регионе.

Основное условие, позволяющее упростить выполнение перечисленных требований, — ликвидация многопородности. Наиболее эффективных результатов можно достичь в том случае, если в одном хозяйстве или административном районе разводится одна порода, в области или в природно-экономическом регионе — не более двух. Действующий в настоящее время план породного районирования сельскохозяйственных животных не догма. Он постоянно уточняется и совершенствуется

Прежде чем приступить к составлению плана, нужно подготовить данные о состоянии и перспективах развития животноводства, о породном районировании зоны, области и т.д., иметь материалы бонитировки скота, документацию на племенных производителей и племенной маточный состав, и планы работы с породами в целом.

Для более удобного пользования планом основные формы аналитических таблиц следует использовать из сводного отчета по бонитировке животных и годовых отчетов. В таблицах перечисляют в алфавитном порядке хозяйства с подведением итогов по каждой группе, каждому району и зоне в целом.

овленным правилам.

2.5 Лабораторная работа 5 (ЛР-5) Определение племенной ценности животных.

Оценка и эффективное использование производителей.

2.5.1 Краткое описание проводимого занятия:

Пример 1: Перспективный план селекционно-племенной работы по состоянию и перспективы развития молочного скотоводства зоны.

В первом разделе плана отражают основные показатели, характеризующие состояние сельского хозяйства зоны, излагают направление его развития на перспективу, определяют место, удельный вес и задачи молочного скотоводства.

По растениеводству указывают урожайность и себестоимость центнера зерновых и кормовых культур, по животноводству – плотность скота и производство молока, удои коров, оплату корма и себестоимость получаемой продукции. Фактические данные за три года, предшествующие начальному периоду составления плана, берут из годовых отчетов хозяйств, а перспективные – из планов организационно – хозяйственного устройства.

Такой принцип расположения данных в таблицах дает возможность сопоставить динамику показателей по годам по каждому хозяйству со средними показателями по группам хозяйств и общим итогом.

В тексте после таблиц анализируют показатели и указывают основные мероприятия, намечаемые на перспективу по повышению урожайности, и снижению себестоимости продукции растениеводства и дают характеристику показателей развития молочного скотоводства с обоснованием плановых заданий. Выделяют отдельные хозяйства, достигшие более высокого уровня интенсификации, с изложением их опыта и намечаемых мероприятий по развитию молочного скотоводства зоны.

Анализ качественного состояния товарного скотоводства и племенных ресурсов зоны деятельности станций. Качественная характеристика стад крупного рогатого скота занимает в плане важное место. От полноты анализа породности и продуктивности маточного стада и быков зависит и эффективность отбора и подбора, правильность выбора методов разведения и т.д. Основными документами, по которым анализируют стада каждого хозяйства, являются планы племенной работы, сводные отчеты по бонитировке скота, племенные свидетельства и заводские книги, журналы регистрации использования быков, каталоги, ГПК и другие данные зоотехнического учета. Для лучшей последовательности второй раздел плана излагают в следующем порядке.

Породный состав и породность стад. Их указывают за последние три года по породам и поколениям. В таблицу вносят данные бонитировки скота из сводных отчетов. При наличии в хозяйстве двух и более пород таблицу соответственно увеличивают группой колонок на каждую породу. Для анализа показателей по возрастным группам целесообразно дать в приложении заполненные таблицы отдельно по коровам, нетелям и телкам. Расчеты повышения породности по годам планируемого периода производят составлением подсобных таблиц по обороту стада.

Классный состав стада определяет общее качество стада по комплексу признаков – породности, живой массе животных, продуктивности, экстерьеру и конституции. По этому важно сопоставить классность в динамике за последние годы. В плане указывают классность по годам и каждой породе в целом по стаду, а в приложениях – по возрастным группам.

В тексте дают анализ материалов классного состава стада и излагают мероприятия по повышению породности и классности.

Характеристика племенного ядра. В каждом хозяйстве нежно иметь племенное ядро для репродукции ремонтных животных. В эту группу отбирают 50-60% коров и телок с лучшими показателями породности и продуктивности. Данные по племенному ядру характеризуют численность, и классность животных лучшей части

стада и вместе с тем дают возможность решить вопрос о необходимости завоза ремонтных телок из других хозяйств.

В плане нужно предусмотреть повышенные требования по породности и продуктивности с учетом максимального использования внутрихозяйственных и зональных племенных ресурсов, повышения уровня кормления коров и ремонтного молодняка и других мер.

Живая масса коров и молодняка. Эти данные рассматривают отдельно. Они показывают соответствие возрастных групп стада с требованиями стандарта по породе.

Известно, что между живой массой коров и их продуктивностью существует высокая корреляционная зависимость. С ростом живой массы увеличиваются удои коров и коэффициент молочности.

В плане нужно показать живую массу коров в первую, отдельно во вторую и отдельно в третью и выше лактации. Исключительно важное значение имеет живая масса для ремонтных телочек и бычков по периодам выращивания. Самыми высокими продуктивными качествами и воспроизводительными свойствами обладают коровы, которые достигают к 15-18 –месячному возрасту их выращивания полной половой и физической зрелости и оплодотворяются в этот период. Показателем развития молодняка служит живая масса телок и бычков при рождении, в 6, 12 и 18 мес.

Под итогом по зоне необходимо прописать требования инструкции по бонитировке, предъявляемые к первому классу, по возрастным группам телок и бычков и лактациям коров.

Плановые задания по живой массе устанавливают с учетом роста породности и повышения уровня кормления.

В тексте дают краткое описание условий выращивания, показывают достижения лучших хозяйств.

Удой и жирность молока. Их указывают по каждой породе за первую, вторую, третью и другие лактации в сравнении с требованиями первого класса инструкции по бонитировке.

По каждому хозяйству по годам и лактациям прописывают удои за 300 дней лактации и разницу (+ или -) с требованиями первого класса инструкции по бонитировке. В итоге по зоне в графе «Требования первого класса бонитировки» указывают стандарт удоя, а в следующей – разницу с показателем по последнему из анализируемых годов. По хозяйствам, где ведут селекцию на повышение жирномолочности или белковомолочности, целесообразно дать в приложении распределение коров по этим показателям по форме предусмотренной сводным отчетом по бонитировке.

Продолжительность производственного использования коров определяется средним возрастом коров в лактациях. Чем больше этот показатель, тем выше достоверность выявления пожизненных продуктивных способностей коров, их конституциональной крепости и тем полнее используются воспроизводительные способности животных.

При законченном обороте стада по мере повышения его породности и продуктивности возраст коров в лактациях должен увеличиваться.

Использование воспроизводительных способностей телок. Они оцениваются по бонитировочным данным. Для этого у всех первотелок отмечают возраст к первому отелу. Там, где первый отел поздний у значительного числа животных, нужно планировать отбор телок для ремонта, прежде всего коров, первый раз отелившихся в более молодом возрасте и имеющих высокие показатели продуктивности.

Генеалогическая структура маточного стада. Для правильного использования быков и поддержания линейного разведения необходим генеалогический анализ маточного стада по каждому хозяйству. Из племенных свидетельств, журналов

выращивания молодняка или бонитировочных описей делают выборки, внося их в соответствующую таблицу.

После распределения животных по линейной принадлежности нужно проанализировать семейства коров, дать основную характеристику линий и семейств по продуктивности и другим показателям, выделив наиболее перспективные, намечаемые для дальнейшей репродукции.

Генеалогическая структура быков. Дают полную характеристику быков, используемых станцией искусственного осеменения и племенными хозяйствами, приводят показатели продуктивности дочерей, сведения о продуктивности родителей и ближайших предков, о воспроизводительных способностях и другие данные.

В начале подраздела дают краткую характеристику племенных и продуктивных качеств линий быков, используемых для воспроизводства стад в зоне. Дальше проводят бонитировочную описание быков и генеалогические схемы.

План племенной работы в свиноводстве.

Перспективный план состоит из двух частей.

Первая часть — анализ предшествующей племенной работы, куда входят: общие сведения о хозяйстве, общие сведения по развитию животноводства, характеристика племенного стада свиней по данным бонитировки, история комплектования стада, выходное поголовье животных, генеалогический анализ стада, характеристика линий, семейств, анализ предшествующего отбора, характеристика кормления и содержания животных.

Вторая часть — перспективный план селекционно-племенной работы и мероприятия по его осуществлению:

- основные задачи и направление племенной работы со стадом свиней;
- план развития свиноводства и реализация племенного молодняка свиней;
- план повышения качественных показателей племенного стада и завоза племенного молодняка;
- план проверки хряков-производителей и свиноматок по качеству потомства;
- работа с линиями хряков-производителей;
- работа с семействами свиноматок, завоз племенного молодняка;
- условия совершенствования стада;
- ветеринарно-санитарные мероприятия.

Вышеуказанные вопросы являются основными в конструкции перспективного плана селекционно-племенной работы. При необходимости содержание плана может быть расширено.

Общие сведения о хозяйстве. В этом разделе приводятся краткие сведения о местоположении хозяйства, его природно-климатических условиях, производственной структуре хозяйства и т. д.

Приводятся данные о землепользовании хозяйства, ее структуре. Общая земельная площадь (га), в том числе сельскохозяйственных угодий; из них пашни, естественных пастбищ, сенокосов, многолетних насаждений.

В этом разделе указываются также урожайность основных культур и структура посевных площадей, мероприятия по росту урожайности, обеспеченность кормами, кормовой баланс, дающие сведения об обеспечении поголовья скота помещениями, кадрами основных животноводческих профессий.

Общие сведения по развитию животноводства. При характеристике животноводства описываются сведения о распределении поголовья по отделениям и фермам хозяйства, росту поголовья по годам, структура стада, воспроизводство, выполнение производственных планов, экономические показатели. Здесь же даются сведения по выполнению основных задач предшествующего плана селекционно-племенной работы.

Характеристика племенного стада свиней по данным бонитировки. В этом разделе приводится характеристика племенного стада свиней по данным последней бонитировки: возрастной и классный состав стада, развитие, хряков-производителей и свиноматок, продуктивность маточного стада, откормочные качества, классность и развитие ремонтного молодняка, описание хряков-производителей и свиноматок селекционной группы.

История комплектования стада. В этом разделе даются сведения о завозе животных в хозяйство, их породность, линейная принадлежность. Следует указать также линии, семейства и какие животные оказали существенное влияние на формирование стада свиней. В этой части отражают связь между хозяйствами, из которых были завезены племенные животные. Следует проанализировать работу по созданию генеалогической структуры стада.

Выходное поголовье скота. В этом разделе приводится характеристика хряков - производителей основных и проверяемых свиноматок, ремонтного молодняка по состоянию на 1 января, по происхождению, развитию, экстерьеру, продуктивности, мясным и откормочным качествам.

Выделяют селекционную группу, предназначенную для ремонта собственного стада, классную — для выращивания молодняка племенного, проверяемую — для проверки по результатам продуктивности и ремонтную — для замены выбракованных свиноматок. Опись животных делается в соответствии с принадлежностью к определенной линии или семейству.

Генеалогический анализ стада. Этот раздел является основным для разработки дальнейшего направления совершенствования стада и внутрилинейного подбора. Принадлежность к генеалогическим группам определяется на основании анализа родословной. Генеалогические таблицы строятся по линиям и семействам. При внутрилинейном подборе и постоянном закреплении определенных семейств за линиями необходимо включать свиноматок в генеалогические схемы, составленные для линий. Целесообразно включать в схемы и ремонтный молодняк.

После проведения генеалогического анализа дается зоотехническая характеристика линий и семейств, описываются родственные группы, определяются основные продолжатели линий, семейств, родоначальники новых родственных групп. В этом разделе анализируется сочетаемость генеалогических групп, линий и семейств. Дается оценка общей и специфической комбинационной способности. Составляют генеалогические таблицы минимум по 8 поколениям животных.

Характеристика кормления и содержания. Продуктивность животных в значительной мере зависит от условий кормления и содержания. В связи с этим в этом разделе дается характеристика условий кормления и содержания племенного стада свиней. Анализируются рационы кормления, условия, методы и система содержания животных, конструктивное решение зданий, оборудования. Даётся их оценка. Здесь же производится санитарно-гигиеническая и ветеринарная оценка стада. Указывается проведение профилактических мероприятий.

Основные задачи и направление племенной работы со стадом свиней. Основная задача племенных хозяйств — совершенствование существующих пород свиней и выведение специализированных линий, гарантированно сочетающихся в условиях промышленного свиноводства. В связи с этим для каждого хозяйства определяются конкретные задачи, которые должны быть частью общей селекционной программы как по совершенствованию пород свиней, так и по увеличению промышленного производства свинины.

В этом разделе определяется направление селекционно-племенной работы и дается методическим подход к решению программы. Разрабатываются модель животного и целевой стандарт.

План развития свиноводства и реализация племенного молодняка свиней. В этом разделе приводятся количественные показатели дальнейшего развития свиноводства в хозяйстве. Указывается производство мяса, его реализация, выращивание и продажа племенного молодняка, его классность, возраст при реализации. Планируется число основных и проверяемых свиноматок, ремонтного молодняка, количество опоросов, план получения поросят.

План повышения качественных показателей стада и завоз ремонтного молодняка. Планирование повышения качественных показателей стада проводится на основании определения коэффициента наследуемости, интенсивности отбора и селекционного дифференциала. Желательно определение коэффициента наследуемости в стаде по каждому поколению.

План повышения качественных показателей стада рассчитывается по развитию хряков - производителей и свиноматок в различные возрастные периоды, продуктивности свиноматок по одному, двум опоросам и более, скороспелости, среднесуточному приросту, оплате корма, толщине шпика над 6—7-м грудным позвонком, площади «мышечного глазка», массе задней трети полутуши.

В этом разделе указывается также повышение показателей развития ремонтного молодняка и его классности.

План проверки хряков - производителей и свиноматок по качеству потомства. В соответствии с качеством хряков-производителей, их принадлежностью к специализированным линиям предусматривается проверка хряков-производителей и свиноматок методом контрольного откорма. Как правило, этим методом проверяют хряков - производителей и свиноматок, отнесенных к отцовской линии. Все хряки-производители должны оцениваться по массе потомства в 2- или 4-месячном возрасте. Хряков-производителей и свиноматок, материнских линий обязательно оценивают по продуктивности дочерей.

Выращивание и реализацию племенного и ремонтного молодняка от отцовских линий необходимо проводить только от тех животных, которые дали хорошую оценку на контролльном откорме, и от материнских линий, получивших положительную оценку по продуктивности дочерей.

В последнее время при оценке используют данные контрольного выращивания племенного молодняка. При этом методе оценивается скороспелость, среднесуточный прирост, оплата корма (ориентировочно) и толщина шпика, измеренная прижизненно по достижении живой массы 85—110 кг.

При высоком коэффициенте наследуемости этих признаков точность оценки генотипа по собственной продуктивности высокая. При этом отпадает необходимость прибегать к сложному методу оценки — контролльному откорму.

При селекции в материнских линиях основным методом отбора должна стать оценка по качеству дочерей, так как показатели воспроизводительных качеств наследуются невысоко.

Работа с линиями хряков-производителей и семействами свиноматок. Основной метод разведения пород свиней по линиям в высших категориях хозяйств — внутрилинейный подбор, при котором все свиноматки постоянно работают в строго определенной линии. Основы этой методики заложил М. Ф. Иванов при выведении украинской белой степной породы свиней. При таком методе разводимая линия становится относительно гомозиготной.

Постоянное закрепление свиноматок за линией целесообразно проводить на уровне семейства. Это вносит определенный порядок в систему организации селекционно-племенной работы со стадом.

Основной задачей селекционного процесса в стаде является создание или совершенствование отцовских или материнских линий.

Селекция на отцовские линии направлена на достижение высоких показателей по мясным и откормочным качествам при умеренных показателях воспроизводительных признаков. При отборе на материнские качества основными селекционными признаками являются многоплодие, молочность, масса гнезда при отъеме, воспроизводительные качества, крепость конституции. Последний признак считается одним из основных при селекции в материнских линиях. В этом разделе на основании генеалогического анализа линий и семейств, характеристики родственных групп, определения продолжателей, анализа оценки общей и специфической комбинационной способности даются основные направления работы в каждой конкретной линии.

На основании зоотехнического анализа делается обоснованный план подбора и закрепления хряков-производителей за свиноматками. Для исключения возможности родственного разведения составляется журнал родственных связей, в котором определяется степень родства животных при всех предполагаемых сочетаниях. Степень родствадается по Шапоружу.

В каждой генеалогической линии выделяются родственные группы, даются подробные сведения по каждой из них. Отмечаются положительные и отрицательные качества, анализируются данные предшествующего племенного отбора, выделяются наиболее удачные сочетания.

Проводится сравнение родительского поколения с дочерним и сверстниками.

Выдающихся по своим продуктивным качествам животных используют в качестве продолжателей линий или родственных групп. При обосновании их можно использовать в качестве родоначальников новых линий и семейств.

Выделение родоначальников заводской линии оформляется актом.

В плане дается схема закладки и принципиальная схема работы с ней. При обосновании в перспективном плане селекционной работы дается использование инбридинга для получения желаемых признаков у животных.

Завоз племенного молодняка. При длительном разведении стада «в себе», изменении направления продуктивности, освежении крови, создании значительного генеалогического разнообразия требуется завоз племенного молодняка из других племенных хозяйств. Как правило, завоз животных должен быть тщательно обоснован и спланирован. Регулярный завоз племенного молодняка без учета племенной структуры ведет к снижению грани между генеалогическими группами и полному прекращению проявления эффекта гетерозиса в кроссах .пиши.

План завоза составляется с учетом специфики каждого конкретного хозяйства. При этом указываются число завозимых животных (хрячков и свиноматок), их генеалогическая принадлежность, хозяйства, из которых планируется завоз. План завоза составляется по годам в соответствии с целями и задачами селекционно-племенной работы. **Условия совершенствования стада.** В этом разделе разрабатываются необходимые условия кормления, содержания, эксплуатации животных, организационные основы ведения отрасли свиноводства, необходимые для дальнейшего совершенствования стада и выполнения плановых показателей перспективного плана селекционно-племенной работы. Разрабатываются рационы и типы кормления животных для каждой конкретной группы.

Указываются технология содержания племенного стада, планируемое строительство, реконструкция свиноводческих помещений и другие мероприятия, обеспечивающие высокую продуктивность племенных животных. К числу важнейших вопросов относится работа с кадрами, повышение уровня профессиональной подготовки.

2.6 Лабораторная работа 6 (ЛР-6) Основные формы зоотехнического и племенного учета в животноводстве. Система мечения сельскохозяйственных животных.

2.6.1 Краткое описание проводимого занятия:

По основным и дополнительным формам зоотехнического учета заполняются формы племенного учета:

1. Карточка племенного быка (форма 1-мол.) В ней отражены все сведения, которые характеризуют индивидуальные и племенные качества быка, его родословную, линейную принадлежность, интенсивность использования.
2. Карточка племенной коровы (форма 2-мол.) Это основной документ индивидуального племенного учета от рождения до конца хозяйственного использования животного. В карточке дается всесторонняя информация о животном: дата рождения, происхождение, породность, развитие, оценка экстерьера и конституции, качество вымени и интенсивность молокоотдачи, удой и химический состав молока по месяцам лактации, за полную лактацию и за 305 дней, даты запусков, отелов и осеменений, классность, сроки и причины выбытия. Карточка является основанием для записи животного в ГПК, определения цен на племенной молодняк и проведения бонитировки стада.
3. Журнал осеменений и отелов коров (форма № 3-мол). В него заносят сведения о воспроизводительных способностях животного: дата последнего отела и осеменения в прошлом году, фактическое осеменение в текущем году с указанием даты и номера быка, результаты ректального исследования стельности, дата предполагаемого отела, а затем фактическая дата отела, пол приплода, его живая масса при рождении, кличка и инвентарный номер
4. Журнал регистрации приплода и выращивания молодняка (форма № 4-мол). Первоначально в этот журнал переносят все сведения о теленке из «Акта приплода», в последующем записывают результаты ежемесячного взвешивания животного, по которым судят о его развитии. Журнал ведут по каждой ферме и сводный в целом по хозяйству.
5. На племенной молодняк заводят Карточку племенного быка или Карточку племенной коровы, телки.
6. Зоотехнический отчет о результатах племенной работы с крупным рогатым скотом молочного направления продуктивности (форма 7-мол.) В него заносят итоговые результаты бонитировки стада.
7. При автоматизированной обработке данных на ЭВМ перечень необходимых форм зоотехнического и племенного учета рассматривается государственной инспекцией индивидуально для хозяйства.

Учет и мечение коров по показателям воспроизводительной способности. В условиях интенсивной технологии необходима повседневная информация о местонахождении каждого животного, его физиологическом состоянии. Для обозначения физиологического состояния коровы удобно использовать цветные бирки, которые крепят на ошейнике. Например, при переводе коровы из цеха отела в цех раздоя и осеменения на ошейник прикрепляют белую бирку, после ее осеменения бирку заменяют другой, на которой выжжен или оттеснен месяц и дата осеменения. При вторичном осеменении вешают бирку с повторной датой осеменения. После трех и более осеменений на ошейнике крепят бирку красного цвета, стельным коровам после их проверки – зеленую. Больных коров отмечают синей биркой.

Для контроля своевременного выявления коров в охоте и учета результатов осеменения ведется картотека. Картотека делится на 12 ячеек по месяцам года и дополнительно на ячейки для карточек коров, подлежащих ректальному обследованию, многократно осеменяемых и намеченных к выбраковке. После определения стельности коровы ее карточку помещают в ячейку предполагаемого месяца отела. На основании данных картотеки составляют план запуска и отелов коров в текущем месяце. В нем указывают дату запуска и предполагаемого отела. Учитывают результаты осеменения и

записывают их в «Контрольный листок осеменения». Для этого можно пользоваться также рейтерными карточками с цветными метками.

Для повседневного контроля и своевременного осеменения коров ведут нательный календарь техника по искусственному осеменению. Календарь представляет собой лист размером 100×55 см из плотного и прочного материала (фанера, картон, брезент и т.д.) на него нашивают 32 кармана размером 12×12 см (31 карман для каждого дня месяца и последний 32-й для ветврача). На всех коров изготавливают карточки, соответствующие размерам карманов в календаре, и хранят их в специальной картотеке по порядковым номерам коров.

В конце рабочего дня техник по искусственному осеменению записывает в карточки отелившихся в этот день коров и помещает их в карманчик календаря, соответствующего дате предполагаемого наступления охоты (через 18 дней после отела). Утром техник осматривает коров, которые по данным, записанным в карточке, должны прийти в охоту в этот день, и при выявлении охоты осеменяет их. Если какая-либо корова в этот день не пришла в охоту, ее карточку перекладывают в следующий, соседний карман, и так далее в течение 10 дней. Если за этот период корова не приходила в охоту, то ее карточку помещают в 32-й карман с надписью «Ветврачу». В этот же карман помещают карточки коров, нуждающихся в ветеринарном осмотре. Для быстрого определения местонахождения коров по секциям при их перемещении в зависимости от физиологического состояния может служить «Карточка движения коровы». Карточки размещают в картотеке по номерам коров в порядке возрастания цифр, что позволяет быстро найти нужное животное. При изменении местонахождения коровы в карточке делают соответствующую отметку. Такая система зоотехнического учета позволяет иметь точную и информацию о состоянии воспроизводства стада, местонахождения каждого животного в помещениях, своевременно составлять планы осеменений, отелов и запусков коров в течение года и своевременно принимать необходимые меры по профилактике заболеваний и лечению животных. Эту трудную и кропотливую работу частично может облегчить специализированные компьютерные программы по первичному учету документов (например по системе Селекс).

Дополнительными формами зоотехнического учета в овцеводстве и козоводстве являются следующие формы:

1. Акт о ходе окота маток (форма 10 - окз)
2. Заключительная ведомость о результатах ягнения маток (форма 12-окз);
3. Заключительная ведомость о результатах стрижки овец, чески коз (форма 16-окз)
4. Заключительная ведомость на отбивку ягнят, козлят (форма 13-окз)
5. Ведомость учета окончательного назначения производителей к маткам (форма 9-окз);
6. Заключительная ведомость по осеменению маток (форма 11- окз)

1. По основным и дополнительным формам зоотехнического учета заполняются формы племенного учета:

1. Карточка племенного барана (форма 1-о), козла (форма 1-кз)
2. Карточка племенной матки (форма 2-о), козы (форма 2-кз)
3. Журнал индивидуальной бонитировки овец и коз (форма 5-окз)
4. Журнал искусственного осеменения маток (форма 3-окз)
5. Сводный отчет о результатах бонитировки овец и коз (форма 6-окз)

Дополнительными формами зоотехнического учета в свиноводстве являются следующие:

1. Станковая карточка подсосной свиноматки (форма 8-св)
2. Журнал регистрации оценки телосложения племенных хряков и маток

По основным и дополнительным зоотехническим формам заполняются формы племенного учета:

1. Карточка племенного хряка (форма 1 -св)
2. Карточка племенной свиноматки (форма 2-св)
3. Карточка учета продуктивности хряка (форма 3-св)
4. Журнал учета случек и осеменений свиней (форма 4-св)
5. Книга учета опоросов и приплода свиней (форма 5-св)
6. Книга учета выращивания ремонтного молодняка (форма 6-св)
7. Сводная ведомость бонитировки свиней (форма 7-св).

В конных заводах и на племенных фермах в России обязательно составляют следующие первичные племенные документы на лошадей:

Племенная документация и система отчетности в племенном коневодстве.

Первичный зоотехнический учет основан на ведении следующих форм и документов:

1. Заводской книги жеребцов-производителей;
2. Журнала учета развития молодняка;
3. Заводской книги кобыл;
4. Журнала пробы и случки кобыл.

В хозяйстве необходимо иметь также бонитировочные карточки на всех племенных лошадей двух лет и старше.

В процессе работы ведут отчет об изменении численности лошадей (по половым и возрастным группам). Кроме того, составляют:

1. Акты на родившихся жеребят,
2. Ведомости о выжеребке и случке,
3. Ведомости подбора кобыл к жеребцам-производителям,
4. Акты на выбраковку и выранжировку лошадей,
5. Поименные списки лошадей на начало года по форме сводной ведомости бонитировки. Ежегодно составляют сводную ведомость бонитировки, которую высыпают в настоящее учреждение и во Всероссийской научно-исследовательский институт коневодства..

Заводские книги ведут по форме бонитировочной карточки. В них записывают всех племенных жеребцов и кобыл и весь племенной молодняк под матками. В заводскую книгу вносят сведения о поступлении и выбытии лошадей — в течение недели; данные о случке — в течение месяца после окончания случной кампании; изменение рекордов, выигрыш призов, результаты выставочной экспертизы — в течение месяца.

В течение случного сезона в заводе ведется журнал пробы и случки кобыл. Для отметок в журнале принятые условные обозначения: не в охоте - Н, в охоте - ОХ, крыта - К, крыта утром - Ку, крыта вечером - Кв, больна - Б, жереба по результатам ректального обследования - Рж, холоста по результатам ректального обследования - Рх, ожеребилась - Ож, в отбое - От; состояние фолликулов: Л - 1, П - 1, Л - 2, П - 2, Л - 3, П - 3, Л - 4, П - 4, Л - Ов, П - Ов, Л - Ж, П - Ж (Л -левый; П - правый; 1 - 4 - степень зрелости фолликула; Ов - овуляция; Ж - желтое тело).

Сведения в журнал пробы и случки заносят в день их получения.

По окончании случного сезона составляют заключительную ведомость учета выжеребки и случки кобыл и до 1 августа высыпают ее вышестоящей организации (по подчиненности) и во Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства.

В течение первых суток после рождения жеребенка составляют акт на приплод в двух экземплярах: один оставляют в конной части, другой сдают в бухгалтерию.

Кроме перечисленных документов в заводах ведут журнал тренировки лошадей (по произвольной форме), в которой тренер ежедневно записывает данные об объеме и напряженности тренировочной нагрузки каждой лошади.

Все ипподромы ведут:

1. Поименный список лошадей, проходящих испытание;

2. Журнал тренировки лошадей (по тренерским отделениям);
3. Карточки учета испытаний на каждую лошадь с отметками о результатах выступления каждой лошади;
4. Протоколы испытаний;
5. Журнал промеров лошадей (молодняка);
6. Книгу рекордов и достижений;
7. Книгу победителей традиционных призов.

Карточки учета испытаний, программы испытаний и протоколы испытаний ведут по формам, принятым в правилах проведения испытаний.

Основные документы первичного заводского учета в конных заводах и на племенных фермах следующие:

- 1) План подбора маток к жеребцам-производителям;
- 2) Журнал пробы и случки кобыл;
- 3) Акт на приплод, составленный на новорожденных жеребят на 3-й день после их рождения;
 - 4) При достижении жеребенком 6—8-месячного возраста перед отъемом жеребят повторно описывают, уточняют масть, приметы, отметины, таврят или татуируют. Составляют акты таврения или акты на идентификацию по международным правилам, где отметины, приметы и завитки волос отмечают топографически. По международным правилам акты на отъем и идентификацию жеребят дублируют на местах и в центральном банке данных;
- 5) Племенные свидетельства (паспорта) на жеребят, впервые бонитируемых в возрасте 1,5—2 лет. Для лошадей чистокровной верховой, арабской и тракененской пород дополнительно из центрального банка данных выдают международный паспорт. При этом должно быть указано не менее пяти отличительных признаков. В международном паспорте приводятся сведения о профилактических прививках. В паспорте фиксируют изменение владельцев лошади;
- 6) Карточка испытания, если лошадь поступает на испытания на ипподром;
- 7) Бонитировочные карточки, заведенные на лошадей при назначении в производящий состав. В карточках кобыл подробно записывают результаты плодной деятельности — дату последней случки, дату выжеребки, кличку и пол приплода, его масть, кличку отца, а впоследствии и назначение. В карточках жеребцов результаты плодной деятельности дают обобщенно;
- 8) Специальные заводские книги, дублирующие сведения, занесенные в бонитировочные карточки. В заводских книгах жеребцов сведения о приплоде более подробные, чем в карточках;
- 9) Некоторые формы племенного учета обязательно дублируют как в хозяйствах, так и в центральных банках данных племенного учета. К их числу относят сводные ведомости о результатах случки и выжеребки, сводные ведомости о результатах бонитировки и поименные списки лошадей на начало года.

В центральном банке данных дублируют основные сведения о каждой племенной лошади. Здесь же обрабатывают данные племенного учета и испытаний лошадей в масштабах породы. При этом официально издают следующие документы, имеющие окончательный законодательный статус:

1. Справочники и каталоги результатов испытаний племенных лошадей;
2. Регистры и каталоги жеребцов-производителей с материалами их фенотипической и племенной ценности с учетом оценки по качеству потомства;
3. Результаты оценки по качеству потомства с учетом отчетного года и за все время использования жеребцов;
4. Государственные племенные книги лошадей заводских пород.

В птицеводстве в «Ведомость ежедневного учета яйценоскости» записывают по вертикали номера кур а по горизонтали числа месяца отмечают число снесенных яиц в том числе с дефектами, дату выбытия птицы (пала или выбракована),

В «Ведомость учета массы яиц» против номера несушки записывают массу взвешенного яйца.

В «Журнал кольцевания кур» записывают крыловой и ножной номера, живую массу, а для мясной птицы и форму телосложения.

«Журнал инкубации яиц» предусматривает по каждой партии отдельно учет заложенных индивидуально от курицы яиц, неоплодотворенных яиц в погибших на разных стадиях эмбрионов, отбракованных слабых цыплят и закольцованных здоровых.

В «Журнал выращивания молодняка», кроме показателей живой массы и сохранности цыплят в различные возрастные периоды, записывают отклонения от стандарта, что является показателем однородности стада.

В «Журнал продуктивности птицы» по возрастам (за каждый месяц продуктивного использования) указывают поголовье на начало месяца, количество кормодней, валовой сбор яиц, яйценоскость на начальную и среднюю несушку, массу яиц, пало и выбраковано птицы, сохранность поголовья и т. д.

Учет яйценоскости от птицы селекционных гнезд и испытателя осуществляют ежедневно. В «Ведомость ежедневного учета яйценоскости» (ведомость заполняется за каждый месяц отдельно) против номера несушки проставляют порядковый номер яйца в день снесения. В прародительском и родительском стадах в ведомости проставляют общее количество снесенных яиц птицей. В период инкубации на яйцах от селекционной птицы на остром конце простым карандашом ставят номер гнезда и номер курицы-несушки.

Срок хранения яиц для инкубации от птицы селекционных стад не должен превышать 7 дней и только в отдельных случаях допустим более длительный срок — 10-14 дней. Яйца закладывают в середине недели с тем, чтобы перенос яиц и вывод цыплят не приходились на выходные дни. От прародительских и родительских стад птицы яйца хранят 3 - 4 дня.

Основные формы племенного учета в звероводстве являются:

1. Форма 1-зв — «Карточка самца основного стада».
2. Форма 2-зv — «Карточка самки основного стада».
3. Форма 3-зv — «Трафаретка самца основного стада».
4. Форма 4-зv — «Трафаретка самки основного стада».
5. Форма 5-зv — «Трафаретка щенка».
6. Форма 6-зv — «Производственно - бонитировочный журнал».
7. Форма 7-зv — «Ведомость поголовья на 1 января».
8. Форма 8-зv — «Журнал выращивания и бонитировки молодых пушных зверей».

Указанные формы учета на племенных и товарных фермах заполняют на зверей всего стада. У норок вместо трафаретки щенка допускается использование жетона с номером. На щенков пользовательной части стада индивидуальные трафаретки не заполняются.

При заполнении форм учета применяют единые сокращенные обозначения видов зверей: норка - «Н», песец - «П», лисица - «Л», соболь - «С», нутрия (болотный бобр) - «Б», хорек - «Х», енотовидная собака - «Е». Породы и различные типы одного вида также имеют свои обозначения.

Завезенным зверям в племенных документах (в том числе и на трафаретках) записывают название хозяйства, из которого сделан завоз, и присваивают последние неиспользованные заводские номера хозяйства

Формы племенного учета рассчитаны на обработку зоотехнических данных как с применением, так и без применения компьютера.

Племенные книги являются центральным звеном в системе племенной работы с породами. В каждой стране для каждой породы, как правило, ведут свою племенную книгу. В концентрированном виде она сводит первичную информацию о племенных животных, возникающую в местах их разведения.

Эти книги являются главным документом, подтверждающим племенную ценность животных и характеризующим уровень племенной работы с породой. Сюда включены все сведения о происхождении, фенотипической и племенной ценности животного, даны полные сведения о результатах плодной деятельности. Эти сведения обобщены и статистически обработаны.

Правила записи животных в племенные книги подробно изложены в специальных инструкциях. О записанных в племенные книги животных даются следующие сведения: кличка, инвентарный номер, родословная, дата и место рождения, живая масса, комплексный класс, хозяйство. Наряду с этим приводят данные о принадлежности животных к линиям, генеалогическим группам.

Кроме того, в предисловии к ГПК дают анализ генеалогической структуры пород, характеристику лучших племенных хозяйств, а также современное состояние и пути дальнейшего совершенствования породы. Изучение животных, записанных в племенные книги, дает представление об эволюции породы в целом, о методах создания генеалогической структуры и путях ее совершенствования. В этом отношении племенная книга - история и паспорт породы, без знания которых невозможно правильно построить племенную работу с отдельным стадом и породой в целом. Знание племенной книги облегчает и исключает ошибки при подборе животных, дает возможность устанавливать взаимосвязь и объединять племенную работу всех хозяйств, разводящих ту или иную породу животных.

На основе племенных книг составляют перспективные планы селекционно-племенной работы с отдельными стадами и породами в целом.

Государственные племенные книги могут быть двух типов: открытые и закрытые.

В первом случае в книгу могут быть записаны высококровные помеси, полученные в результате поглотительного скрещивания, соответствующие требованиям стандартов породы, и ценные помеси, полученные при вводном скрещивании, предусмотренном селекционной программой.

Во втором случае в племенную книгу записывают только тех животных, предки которых были занесены в предшествующие тома. (Например: К таковым относят племенные книги чистокровной верховой, чистокровной арабской, ахалтекинской и орловской рысистой пород)

Таким образом, значение племенных книг в племенной работе велико. Период времени от выпуска одного тома и следующего очередного иногда составляет от 4 до 10 лет и более. Несвоевременное издание очередных томов снижает возможность рационального использования высокопродуктивных племенных животных.

Зоотехнический учет в племенных хозяйствах

Зоотехнический учет в племенных хозяйствах ведут по утвержденным формам.

При работе с формами следует соблюдать ряд общих требований.

1. Формы зоотехнического учета - основные документы племенного хозяйства, их ведут в одном экземпляре и хранят в сейфе или в металлических запирающихся шкафах. Все формы подписывает зоотехник- селекционер, а периодически проверяет и подписывает руководитель хозяйства.

2. Основа зоотехнического учета - правильная нумерация и своевременное мечение приплода.

3. В формах все графы заполняют четко и разборчиво.

4. Исправления, помарки при заполнении зоотехнического учета не допускаются.

В исключительных случаях ошибочная запись может быть аккуратно зачеркнута (так, чтобы была видна первоначальная запись) и сверху написаны правильные сведения. Рядом с исправленной записью (или на полях формы) должна стоять подпись лица, внесшего исправление.

5. Каждый из учитываемых в формах признаков записывают определенным числом знаков цифр в зависимости от точности его измерения. (с точностью до 1 кг и 1 см). Затраты кормов на 1 кг прироста указывают с точностью до 0,01 корм. ед.

6. При расчете средних величин перечисленных признаков точность записей не меняется. При определении суммарного класса пробонитированного животного средний балл рассчитывают с точностью до 0,1.

7. Округление до требуемой точности проводят по общепринятым правилам. Если при регистрации показателей после запятой нет значащих цифр, то ноль пишут обязательно.

Мечение сельскохозяйственных животных

Пометка условным обозначением или цифрой сельскохозяйственных животных, позволяющая вести учёт их происхождения, развития, физиологического состояния, продуктивности, поступления, перемещения и выбытия; один из методов зоотехнического учёта. Способствует правильной организации воспроизводства стада, рационального кормления и содержания животных. Способы мечения сельскохозяйственных животных:

1) Татуировка на ушах специальными щипцами. Делают ее специальными щипцами со вставными цифровыми печатками, имеющими острые выступы, расположенные на контурах цифр. Нужный набор таких цифр вставляют в щипцы, сжатием которых наносят ранки на внутренней поверхности уха животного, а затем втирают специальную татуировочную краску или приготовленную в самом хозяйстве смесь, состоящую из спирта, туши и глицерина. Для животных, у которых внутренняя поверхность уха имеет светлую окраску, применяют краску черного цвета, а если эта поверхность темная (чёрная), то красного. Хорошо нанесенная татуировка сохраняется на ухе животного всю его жизнь.

Неудобство этого способа состоит лишь в том, что номер животного можно прочитать, только взглянув на внутреннюю поверхность уха;

2) Выщипы или пробоина ушах по условной системе-ключу, где каждый выщип обозначает определенную цифру. В неплеменных хозяйствах широко применяется способ мечения, при котором на ушных раковинах животных специальными щипцами делают выщипы. Каждый из них в зависимости от места нанесения имеет определенное числовое значение. Суммированием чисел, соответствующих выщипам определяется номер животного;

3) Прикрепление к ушам металлических или пластмассовых бирок, кнопок, клипов с вытисненными на них цифрами (метки периодически проверяют и в случае потери восстанавливают). Рекомендуется, кроме татуировки, вставлять в ушную раковину металлические или пластмассовые бирки, кнопки, сережки с нанесенными на них номерами, дублирующими татуированный индивидуальный номер. Их фиксируют на ухе тоже специальными щипцами. Индивидуальный (инвентарный) номер животного ставят на правом ухе. У крупного рогатого скота при переводе молодняка в маточное стадо этот номер дополнительно выжигают на правом роге. Крупный рогатый скот, овец и свиней, записанных в ГПК, дополнительно метят порядковым номером по племенной книге на левом ухе или у рогатых животных на левом роге;

4) Применение ошейников с нанесёнными на них цифрами (используют для мечения коров на крупных комплексах и молочных фермах);

5) Таврение (клеймение) горячее - выжигание раскалённым металлическим клеймом (на крупе или лопатке) номера или знака (тавра), холодное - мечение металлическим клеймом, охлаждённым в жидком азоте;

6) Кольцевание - надевание металлических или пластмассовых колец с номерами. Номера вносят в индивидуальные карточки на животных и инвентарную книгу. Порядок и техника мечения разных видов животных имеют свои особенности.

Крупный рогатый скот метят в день рождения. Индивидуальный номер ставят на правом ухе, применяя татуировку, таврение холодом, выжигание номеров на рогах, бирки, клипсы или выщипы. Если молодняк выращивают в специализированных хозяйствах, на бирке или при татуировке, кроме того, ставят шифр (букву или номер) хозяйства-поставщика. В 6-месячном возрасте тёлке на левом ухе ставят вторую ушную метку - дублёр (бирку или клипсу) с обозначением индивидуального номера и шифра хозяйства. При достижении случного возраста тёлок метят ошейником из картовой резины с нанесённым на нём инвентарным номером. На молочных комплексах с доильными установками «ёлочка» или «карусель» коров дополнительно метят ножным браслетом на задней ноге, на котором дублируют номер ошейника.

Наиболее удобно и надежно в молочном скотоводстве мечение животных выщипами на ушах по ключу Иванова (рис. 4). Отрицательная сторона этого способа — недостаточное число номеров для крупных стад, возможное зарастание с возрастом отверстий в ушах некоторое снижение эстетического вида животного. Дополнительно к этим номерам используют ушные бирки (металлические, пластмассовые) с номерами, ремни-ошейники и сигнальные цветные бирки. При любом способе мечения недопустимо, чтобы в одном хозяйстве номера повторялись.




Рис. 4. Мечение крупного рогатого скота выщипами

Кроме мечения, в племенных хозяйствах животным обязательно присваивают клички. Клички облегчают обслуживающему персоналу обращаться с животными и могут нести дополнительную информацию — линейную, семейную принадлежность пробанда, год его рождения и т. д. В связи с этим разработано несколько вариантов присвоения кличек.

Наиболее распространенные варианты присвоения кличек маточному поголовью следующие: 1) по кличке матери; 2) в каждом году клички животных начинают с разных букв алфавита. Для племенных хозяйств наиболее удобен первый вариант, поскольку он позволяет одновременно определить принадлежность телки или коровы к конкретному семейству, а для товарных стад — второй вариант, поскольку он уменьшает возможность ошибки при утере животным номера. Животных лучше маркировать путем установления минимального и максимального номера для каждого календарного года.

Клички должны быть простыми, благозвучными, без использования человеческих имен. В современных условиях, когда в молочном скотоводстве все большее внимание уделяют селекции на желательный тип в заводских стадах, на элеверах по выращиванию ремонтных бычков и на племпредприятиях, неотъемлемым звеном селекции должно быть фотографирование племенных животных

Мечение свиней. Поросят метят не позже третьего дня после опороса. На левом ухе татуировочными щипцами ставят гнездовой номер (по порядку опороса), начиная каждый год с первого, и порядковый номер животного в гнезде. В возрасте 1-2 мес племенным свиньям на правом ухе ставят заводской номер. Метят свиней татуировкой и

выщипами. Татуировку применяют главным образом при мечении свиней белой масти. Выщипами можно метить свиней любой масти. Татуируют свиней на ушах особыми щипцами, в которые вкладывают пластинки с полуострыми металлическими стержнями, образующими цифры. Для нанесения номера набирают в гнезда татуировочных щипцов необходимые цифры, затем тщательно моют теплой водой участок уха и накладывают щипцы, сжимая их рукоятки. Прокол делают резко и уверенно. Щипцы с уха снимают после их раскрытия. Места прокола смазывают специальной мастикой, тщательно втирая ее в образовавшиеся ранки. Мастику готовят из сажи (копоти) на денатурированном спирте или на 3%-ном растворе карболовой кислоты, разведенной до консистенции сметаны. Для лучшего сохранения номера в мастику добавляют несколько капель глицерина. Мечение выщипами производят специальными щипцами по ключу, где каждому выщипу соответствует определенная цифра (рис 5.). Выщипы на правом ухе обозначают: на кончике - 100, на верхнем крае - 1, на нижнем крае - 3, круглое отверстие в середине - 400; на левом ухе: на кончике - 200, на верхнем крае - 10, на нижнем крае - 3, круглое отверстие в середине - 800




Рис. 5. Ключ для шифровки и мечения номеров при нумерации свиней выщипами

Этими условными знаками легко обозначить тот или иной номер. Например, нужно поставить номер 544. Для этого делают круглое отверстие в середине правого уха (400), на копчике правого уха (100), на нижнем крае левого уха (30), на верхнем крае левого уха (10), на нижней части правого уха (3) и на верхнем крае правого уха (1). В итоге получим 544 (400 + 100 + 30 + 10 + 3 + 1).

Прежде чем делать выщипы, уши животных дезинфицируют денатурированным спиртом, 3,5%-ным раствором карболовой кислоты или 20%-ным раствором креолина. Места выщипов смазывают настойкой йода. При мечении татуировкой 2—3-дневным поросятам на левое ухо наносят гнездовой номер (порядковый номер опороса и календарном году), в 2-месячном возрасте на правом ухе ставят заводской (инвентарный) номер. В свиноводстве принято присваивать заводские номера хрячкам нечетные, а свинкам четные. При мечении выщипами гнездовой номер не ставят, а в 2—3-дневном возрасте сразу ставят заводской (инвентарный) номер.

В овцеводстве применяется мечение овец индивидуальными номерами с помощью татуировки, металлических и пластмассовых бирок и выщипов на ушах, а также выжигания номеров на рогах.

Татуировка производится с помощью металлических щипцов, в которые вставляют игольчатые металлические цифры. Номера ставят на бесшерстной поверхности внутренней стороны уха. Цифры располагают параллельно длине уха и посередине его. Мечение татуировкой можно применять на всех овцах кроме тех, которые имеют цветные уши. Металлические или пластмассовые бирки ставят на ушах с помощью специальных щипцов.

При временном мечении овец на ухе ставят цветные пластмассовые бирки с номерами. Такой способ мечения удобен при проверке баранов по качеству потомства, линейном разведении, производственных опытах и других работах.

По форме бирки бывают продолговатые и круглые, с набитыми номерами и без них. Если номера на бирке нет, то его набивают перед тем, как поставить бирку

животному. Чтобы мухи меньше беспокоили животных, биркование их следует проводить в прохладный период года.

Выжигание на рогах. Этот способ применяется для мечения рогатых баранов. С помощью сильно нагретых на огне металлических номеров выжигают на рогах нужную цифру, которая легко потом читается.

Выщипы на ушах. Нумерация животных с помощью выщипов на ушах применяется в хозяйствах с небольшим поголовьем овец. Выщипы делают небольшими металлическими щипцами. Каждый выщип имеет свое условное обозначение: один выщип на нижнем крае левого уха обозначает 1, а на верхнем крае этого же уха — 3; один выщип на нижнем крае правого уха обозначает 10, а на верхнем крае этого же уха — 30; выщип на конце левого уха обозначает 100, а на конце правого — 200; круглый выщип в середине левого уха обозначает 400, а в середине правого уха — 800.

Овец всех пород и направлений продуктивности при бонитировке распределяют на классы, которые обозначают соответствующими выщипами на ушах, за исключением животных, имеющих индивидуальные номера, сделанные выщипами.

Тонкорунных, полутонкорунных, курдючных, жирнохвостых овец с грубой и полугрубой шерстью, отнесенных при бонитировке к различным классам, метят на правом ухе следующим образом:

- элита - один выщип на конце уха
- I класс - один выщип на нижнем крае уха
- II класс - два выщипа на нижнем крае уха
- III класс - один выщип на верхнем крае уха
- IV класс - один выщип на верхнем крае и один выщип на нижнем крае уха
- Овцам, не отвечающим требованиям классных животных, обрезают конец правого уха.

В тонкорунном и полутонкорунном овцеводстве маткам селекционных групп дополнительно делают выщип на конце левого уха.


При бонитировке курдючных и жирнохвостых овец перед весенней стрижкой устанавливают качество рунной шерсти, которое отмечают выщипами на левом ухе следующим образом:

- шерсть соответствует лучшей части I класса - один выщип на конце уха

- шерсть I класса — один выщип на нижнем крае уха

- шерсть II класса — два выщипа на нижнем крае уха

- шерсть III класса — один выщип на верхнем крае уха



- шерсть не соответствует задаче селекционной работы обрезают конец уха

Сельскохозяйственную птицу метят кольцами: глухими, которые надевают на ногу молодняка через сложенные в вытянутом положении пальцы: застёгивающимися, которые обертывают вокруг плюсны и зажимают: цветными пластмассовыми, представляющими собой упругую спираль в 2-3 завитка (главным образом для группового мечения птицы); крыловыми, или крылометками (для мечения молодняка).

Весь выведенный молодняк кольцают семизначными крылометками, на которых имеются: номер отца (номер гнезда), номер матери (порядковый номер несушки в гнезде) и порядковый номер цыпленка (утенка, индюшонка, гусенка).

Цыплятам и индюшатам крылометки надевают на правое крыло (прокалывают острым концом крылометки перепонку крыла), а утятам и индюшатам надевают на ногу и по мере их роста диаметр крылометки увеличивают.

На каждую гнездовую самку в комплекте колец имеется 30 крылометок. Один комплект содержит; ножное кольцо для самца, 18 ножных колец для самок и 540 крылометок для цыплят. Для кольцевания молодняка, получаемого от селекционной птицы из семейной селекции, имеются пятизначные крылометки, например от А0001 до А9999. Крылометки для кольцевания молодняка селекционной птицы развешивают на специальных стендах или барабанах.

Для мечения молодняка, отводимого не от селекционных гнезд, используют цветные пластмассовые ножные кольца. Например, молодняк линии А кольцают красными, а линии В — зелеными кольцами. При переводе в птичники для содержания взрослой птицы молодняк кольцают пятизначными кольцами.

Мечение в звероводстве. Каждому животному стада присваивают индивидуальный (татуировочный) номер (четные - самкам, нечетные - самцам). Присвоение номеров обычно ежегодно возобновляют с первого номера. Молодняку татуировочные номера присваивают при отсадке от матерей независимо от предполагаемого их использования. При переводе в основное стадо в качестве заводских номеров берут татуировочные или присваивают номера подряд в течение 5 - 15 лет в зависимости от сроков использования зверей. Перед номером ставят последнюю цифру года, чтобы при одинаковых номерах в родословной не происходило путаницы.

Татуировочный номер записывают на трафаретку щенка, прикрепленную к клетке. Лисиц и песцов татуируют в возрасте в 2—3,5 месяца. После перевода зверя в основное стадо на него заполняют новую трафаретку с присвоенным ему заводским номером.

2.7 Лабораторная работа 7 (ЛР-7) Контроль воспроизводства сельскохозяйственных животных.

2.7.1 Краткое описание проводимого занятия:

Современные методы воспроизводства сельскохозяйственных животных.

Современное ведение сельского хозяйства базируется на интенсивном использовании только лучших генотипов всех видов животных, что подразумевает получение максимальной прибыли при одинаковом уровне финансовых вложений. Т.е. предпочтение будет отдаваться тем породам, которые при одинаковом с другими породами финансовыми и материальными затратами производят больше продукции (мяса, молока, шерсти и пр.) (рис. 9.)

Методы, позволяющие повысить репродуктивный потенциал животных путем повышения относительного содержания в популяции генетических признаков высокопродуктивных животных. Это достигается распространением зародышевых клеток (спермы, ооцитов, ранних зародышей) с помощью приемов: искусственного осеменения; трансплантации эмбрионов; клонирования; трансгенеза.

Искусственное осеменение

В настоящее время под **методом искусственного осеменения** подразумевают комплекс мероприятий, взаимное применение которых обеспечивает возможность плодотворного осеменения большого количества самок спермой избранного самца независимо от времени взятия семени и локализации самца и самки. Это важнейший метод наиболее быстрого и качественного совершенствования товарного и племенного маточного животноводства.

Результаты искусственного осеменения зависят от многих условий:

1. Организации работы станций;
2. Их материально-технической оснащенности и состава производителей;
3. Уровня подготовки специалистов;
4. Применяемой технологии производственных процессов по подготовке, перевозке и хранению спермы;
5. Способов осеменения;
6. Состояние маточных стад;
7. Рационального использования репродуктивного потенциала самца (спермы);
8. Взятия, разбавления, замораживания и длительного хранения спермы самцов-производителей;
9. Регистрации половой охоты и введения размороженной спермы в половые пути самки.

Срок и кратность осеменения. Осеменяют самок в первую охоту после нормальных родов, при отсутствии послеродовых заболеваний и полном завершении процесса инволюции половых органов.

Например. В течении одной половой охоты коров и телок осеменяют дважды – первый раз сразу после выявления и второй раз через 10-12 с. допускается однократное осеменение в конце охоты при ректальном определении степени зрелости фолликула или при выявлении охоты быком-пробником. Осеменяют в станках на пункте искусственного осеменения не ранее чем за 1,5 ч до дойки и через 1,5-2 ч после нее.

Стимуляция и синхронизация половой функции коров и телок. Стимуляция половых функций и синхронизация охоты позволяют интенсифицировать процесс размножения животных, планировать отелы, рационально использовать родильные отделения и помещения для молодняка. Однако к использованию биологически активных веществ необходимо подходить с осторожностью, так как произвольное регулирование половой цикличности самок при помощи гормональных препаратов может привести к неудачам и отрицательным явлениям. Нельзя применять гормональные препараты в хозяйствах, неблагополучных по заразным заболеваниям и со слабой кормовой базой, животным ниже средней упитанности и имеющим воспалительные процессы в половых органах или заболевания внутренних органов.

Для синхронизации охоты используют ряд препаратов (прогестероны, простагландины, релизинг-гормон, СЖК). Синхронизация охоты позволяет в сжатые сроки осеменять животных. Лучшие результаты наблюдаются при использовании простагландинов на телках. Существует несколько схем обработки животных. В условиях комплекса хорошие результаты дает двукратное (с интервалом в 11 дней) введение 2 мл (500 мкг) или 4 мл (1мг) эстрофана с последующим осеменением животных в эти же сроки. По другим схемам проводят однократную обработку животных простагландином и осеменяют по мере прихода в охоту в течение 5 дней, вторично обрабатывают остальных животных и такие осеменяют по мере прихода в охоту или же простагландин вводят двукратно с интервалом в 11 дней, а животных осеменяют через 80 ч после второй инъекции.

Выявление сельскохозяйственных животных в охоте. Охоту выявляют в основном техники по искусенному осеменению путем визуального наблюдения за

поведением животных и состоянием половых органов. Животные в охоте возбуждены, они часто переступают с ноги на ногу, плохо едят, мало лежат, выгибают спину, у них снижается удой. Слизистая оболочка влагалища покрасневшая, влажная, из шейки матки и влагалища выделяется слизь. В начале охоты слизь прозрачная и жидккая, к концу мутноватая и густая.

Помимо визуального наблюдения выявляют с помощью вазэктомированного или с отведенным в сторону половым членом производителя - пробника. Одним из наиболее точных методов определения оптимального времени осеменения самок – ректальная пальпация состояния фолликулов.

Основные способы осеменения. Существуют четыре основных способа искусственного осеменения коров и телок: визо-цервикальный, ректо-цервикальный , мано-цервикальный и эпи-цервикальный.

Способы диагностики беременности. На сегодня достаточно разработанными являются три способа определения беременности: гормональный, ректальный, ультразвуковой.



Рис.10. Результаты УЗ-сканирования половых путей коровы после искусственного осеменения.

Из лабораторных методов исследования наибольшее применение имеет **радиоиммунологический или гормональный способ**. Базируется на определении уровня гормона **прогестерона** в крови или молоке животных. Например: Наличие стельности определяют по уровню данного гормона в крови животных на 18-22 день (день предположительной охоты при неуспешности оплодотворения), Стельной считается корова, у которой на 19-23й день после осеменения количества гормона в молоке составляет более 8 мг/мл, а в крови - более 2 мг/мл, у нестельной- соответственно 6 и 1,5 нг/мл. Уровень гормона прогестерона в крови беременных животных составляет - 12-20 и выше нг/мл. Уровень этого гормона в стадию половой охоты составляет - 0,1-0,5 нг/мл. Точность определения стельности этим методом по молоку составляет 65-85%, а по крови- 85-95%. Точность определения отсутствия стельности в этот срок по крови и молоку – 90-97%. Недостатком данного метода является значительная вариабельность показателя содержания прогестерона у различных животных. Имеется также метод

определения стельности по наличию в сыворотке молока или крови (для телок) **специфического белка**. Точность метода 93-95%. Метод разработан в УкрНИИРИО (Украинский НИИ разведения и искусственного осеменения крупного рогатого скота) и позволяет диагностировать или бесплодие с 20-го дня после осеменения.

Ректальный способ определения беременности животных наиболее доступный способ. Способ заключается в прощупывании матки и рогов матки через прямую кишку с целью определения ее морфологии. Ректальное исследование, основанное на пальпации шейки, тела и рогов матки, плода, яичников и маточных артерий через прямую кишку.

Ультразвуковой способ определения беременности (рис. 10). Способ заключается в ультразвуковом тестировании состояния матки и рогов матки с помощью прибора для ультразвукового сканирования (т.н. УЗ-сканера). Это - наилучший способ тестирования. Недостатком данного способа является то, что его применение возможно при ранних сроках беременности, т.к. позже плод становится слишком большим и, кроме того, опускается в брюшную полость, уходя из рабочей зоны датчика прибора.

2.8 Лабораторная работа 8 (ЛР-8) Сохранение генофонда сельскохозяйственных пород и применение иммуногенетики в селекции животных.

2.8.1 Краткое описание проводимого занятия:

Ознакомившись с основными закономерностями наследственности и изменчивости, мы вправе задаться вопросом в какой мере эти закономерности помогают понять законы эволюции. Если биологическая эволюция – процесс изменения и дивергенции организмов во времени, то необходимо определить элементарную единицу этого процесса, удовлетворяющего следующим требованиям:

1. Она должна быть далее неделима, и выступать во времени и пространстве, как некое единое целое;
2. Она должна быть способна наследственно изменяться во времени, измеряемом биологическими поколениями;
3. Она должна существовать в конкретных природных условиях.

Однако согласно этим требованиям отдельные организмы не являются единицами эволюции, поскольку смертны, и каждый из них представляет лишь одно биологическое поколение. Индивидуальные вариации даже наследственные, могут не проявляться у данной особи и могут проявиться или не проявиться в следующих поколениях в соответствии с доминантно – рецессивными отношениями аллелей. Т.о. единицу эволюции на протяжении поколений составляет некая группа особей.

Виды непрерывно распределены в пространстве, чаще всего в форме локальных популяций, которые разобщены территориально. По этой причине, а также из-за огромной численности и гетерогенности (в силу внутривидовой изменчивости) вид не может быть элементарной единицей эволюционного процесса.

Т.о. популяция является элементарной эволюционной структурой, удовлетворяющей требованиям.

Понятием "популяция" в генетическом смысле обозначается совокупность плодовитых при скрещивании друг с другом особей, обладающих наибольшим сходством между собой, нежели с особями других популяций. Природные популяции отличаются также общностью заселяемой территории. Типичным примером популяции в животноводстве является порода. Сохранение и усиление хозяйствственно-полезных признаков в популяции происходит благодаря получению нового поколения. Чем короче интервал между поколениями, тем быстрее будут получены животные с желательными признаками и тем быстрее можно будет достичь нужного результата. Достижение поставленной цели в селекции зависит не только от времени, в течение которого ведется

работа, но и от численности популяции. При этом во внимание берется не вся популяция, а только та ее часть, которая участвует в размножении, т.е. эффективная численность популяции.

Популяцией называется общность индивидуумов определенного вида, связанных происхождением (родством), скрещиванием (гибридизацией) и общность территории.

Учение о популяции впервые сформулировал В.Иогансен (1903). Понятие «популяция» было предложено им в 1907 г. Генетика популяций служит территориальной основой для создания пород животных разных видов и их совершенствования.

С генетической точки зрения **популяцию** можно рассматривать как совокупность животных одного вида, содержащихся в определенных условиях и на определенной территории и отличающихся от других групп данного вида своими фенотипическими и генетическими свойствами.

Однако популяция может рассматриваться под разными аспектами. В животноводстве под **популяцией** понимают группу животных одной породы, имеющих фенотипические и генотипические различия и размножающихся путем скрещивания. Популяция может находиться на разных уровнях, начиная от породы и кончая стадом или линией, она может быть закрытой и открытой. Следует особо подчеркнуть, что популяции сельскохозяйственных животных в отличие от растений-самоопылителей состоит из генетически разнородных животных со сложным наследственным разнообразием, вследствие этого и проведенного отбора популяции отличаются друг от друга генетической структурой.

Свойства генетической популяции:

1. Пластиность её генетической структуры, изменяющейся под воздействием факторов естественного и искусственного отбора;
2. Способность генетической структуры популяции приспособлено реагировать и изменяться при смене условий среды обитания;
3. Сохранение общей генетической структуры, соответствующей условиям среды и проявление генетического гомеостаза (постоянства) за счет наличия приспособительных способностей этой структуры;
4. Способность к неограниченной эволюции.

Генетическая структура популяции изучается путем установления в ней концентрации генов и соотношения генотипов. При этом совокупность генов, характеризующихся определенной частотой и находящихся в гаметах всех животных одной популяции, рассматривается как **генофонд**.

Изучение особенностей наследственно – обусловленных признаков популяции животных и определения частоты различных генов имеет большое значение в селекции, особенно при разработке мероприятий по сохранению и улучшению генофонда локальных пород сельскохозяйственных животных и птицы.

Внутри породы структурные единицы – линии, отродья и семьи также различаются генофондом. В процессе селекции происходит преобразование наследственности пород животных, совершающее через изменение генетической структуры популяции. Факторами такой эволюции является: отбор, миграция, способ спаривания, мутация и генетико-автоматические процессы или дрейф генов.

2.9 Лабораторная работа 9 (ЛР-9) Апробация селекционных достижений.

2.9.1 Краткое описание проводимого занятия:

Основанием для подведения итогов работы по созданию селекционного достижения являются следующие данные:

1. Требуемое число племенных чистопородных животных и животных гибридного происхождения от межвидового скрещивания одновременно.

2. По всем видам животных поголовье в каждой заводской линии соответствует установленным требованиям к ее численности.
3. Наличие достаточного числа племенных хозяйств и ферм (репродукторов) в государственных предприятиях по разведению сельскохозяйственных животных апробируемых пород, породных групп, типов, линий, комплексов сочетающихся линий.
4. Минимальное наличие структурных единиц в представляемых к аprobации селекционных достижениях на момент аprobации: в птицеводстве в новой породе должно быть не менее 6 заводских линий и 100 семейств; в новой породной группе - не менее 3 заводских линий и 60 семейств; в новой заводской линии - не менее 20 семейств; в новом комплексе сочетающихся заводских линий - не менее 2 заводских линий и 40 семейств.
5. Наличие у сельскохозяйственных животных апробируемой породы или ее структурной единицы продуктивных, экстерьерных, биологических, хозяйственных и других свойств, по которым они превосходят разводимые в этой зоне породы, породные группы, типы, линии, комплексы сочетающихся заводских линий того же направления продуктивности животных или отличаются по этим свойствам от других пород, породных групп, типов, линий, комплексов сочетающихся заводских линий.
6. Стойкая передача потомству продуктивных, экстерьерных и других свойств при межпородном скрещивании и межпородных кроссах сочетающихся заводских линий.
7. Наличие зоотехнической документации, подтверждающей происхождение, уровень продуктивности и племенные качества животных; описание методов создания новой или улучшенной существующей породы, новой породной группы, внутрипородных (зональных) заводских типов, заводских линий, комплекса сочетающихся заводских линий, а также утвержденные в установленном порядке план племенной работы и методика работы с породой, породной группой, типом, линией или комплексов сочетающихся заводских линий.
8. Данные о высокой экономической эффективности вновь созданных или улучшенных существующих пород, породных групп, типов, линий, комплексов сочетающихся заводских линий.
9. Основанием для аprobации является превосходство животных апробируемого селекционного достижения над стандартом породы и животными-сверстниками по одному или комплексу селекционируемых свойств, которое должно быть следующим.

14. Число животных, необходимых для аprobации селекционных достижений

Вид и пол сельскохозяйственных животных	Категория сельскохозяйственного достижения				
	Вновь созданная или улучшенная существующая порода	Новая породная группа	Новый или улучшенный внутрипород-ный тип	Новый заводской тип	Новая Заводская линия
1	2	3	4	5	6
Крупный рогатый скот					
Коровы	6000	3000	3000	1000	500

Быки производители	150	100	100	30	10 улучшателей
Свиньи					
Матки основные	5000	3000	3000	500	100
Хряки-производители	500	300	300	50	10 улучшателей
Овцы скороспелых и грубошерстных пород					
Матки	10000	5000	5000	3000	500
Бараны-производители	200	100	100	60	10 улучшателей
Овцы тонкорунных и других пород (кроме каракульских)					
Матки	25000	10000	10000	5000	500
Бараны-производители	500	200	200	60	10 улучшателей
Овцы каракульской породы окрасок бурой, черной, серой					
Матки			5000	3000	500
1	2	3	4	5	6
Бараны-производители			100	60	10 улучшателей
Овцы редких оригинальных пород					
Матки				1000	250
Бараны-производители				20	10 улучшателей
Козы					
Матки	10000	6000	5000	3000	500
Козлы-производители	200	100	100	60	10 улучшателей
Лошади					
Матки	2000	1000	500	200	50
Жеребцы-производители	100	50	25	10	6 улучшателей

Продолжение таблицы 14

1	2	3	4	5	6
Птица					
Куры	40000	12000	12000		3500
Гуси	15000	10000	10000		500
Утки	15000	10000	10000		1000
Индейки и другая птица	15000	10000	10000		1000

15. Число линий для апробации новых категорий животных

Категория селекционного достижения	Число		
	заводских линий	ветвей в линиях	семейств в линиях
Новая порода	6	12	12
Новая породная группа	3	6	6

Внутрипородный (зональный) тип	3	6	6
Новый заводской тип	2	4	4
Новая заводская линия	-	2	2
Новый комплекс сочетающихся заводских линий	2	4	4

По крупному рогатому скоту молочных и молочно-мясных пород: превосходство по надою молока коров апробируемого селекционного достижения над сверстницами на 10% при одновременном надое сверстниц не ниже 150% стандарта породы; содержание МДЖ в молоке на 10% и белка на 5% выше стандарта породы; скорость доения не ниже 2 кг/мин.; оплата корма молоком, жиром и приростом массы на 10% выше, чем у сверстниц. При апробации селекционного достижения по одному какому-либо селекционируемому свойству, кроме молочности (скорость доения, оплата корма продукцией, формы телосложения, формы вымени, комолость, устойчивость к отдельным заболеваниям и др.), молочная продуктивность коров должна быть не ниже 150% стандарта породы, а жирность и содержание МДБ в молоке - не ниже стандарта породы.

По крупному рогатому скоту мясных пород: превосходство животных апробируемого селекционного достижения над сверстницами (сверстниками) по энергии роста (прирост массы) на 5%, по массе в 15-мес. возрасте - на 10%, по молочности - на 10% при соответствующих показателях сверстниц (сверстников) на 15% выше стандарта 1-го класса; по затратам корма на единицу прироста массы на 10% ниже, чем у сверстниц (сверстников), при затрате корма на 1 кг прироста с 8-9- до 15-мес. возраста - до 7 корм. ед. При апробации селекционного достижения по любому другому селекционируемому свойству (экстерьер и конституция, устойчивость к неблагоприятным факторам среды и болезням, комолость и т. д.) уровень энергии роста (прироста массы), масса в 15-мес. возрасте и молочность должны превышать стандарт 1-го класса на 15%.

По свиньям всех групп пород по направлениям продуктивности: превышение требований класса элита животными апробируемого селекционного достижения по энергии роста на 5%; по затрате корма на 1 кг прироста массы меньше на 10%; толщине шпига над 6-7-м грудным позвонком на 15% меньше; превосходство над сверстниками (сверстницами) по массе задней трети туловища на 15%; площадь «мышечного глазка» не менее 35 см², плодовитость не менее 11 жизнеспособных поросят; молочность, определенная на 21-е сут. после рождения поросят, не менее 60 кг. При апробации селекционного достижения по одному или нескольким селекционируемым признакам (свойствам) другие показатели должны быть не ниже требований класса элита.

По овцам: селекционные достижения по животным всех пород, кроме романовской и каракульской, апробируют на фоне продуктивности сверстников (сверстниц), превышающей требования 1-го класса по настригу мытой шерсти на 20%, по массе - на 10%. При этом животные апробируемого селекционного достижения должны превосходить сверстников (сверстниц) по настригу мытой шерсти на 10%, по массе - на 5%; по овцам курдючных, жирнохвостых и других грубошерстных мясосальных пород превосходство по массе на 20%.

Апробируемые взрослые животные должны иметь, длину шерсти годичного роста: тонкорунных пород у маток не менее 9 см, баранов - не менее 11 см; мясо-шерстных тонкорунных пород - длинношерстных типа линкольн - у маток не менее 16 см, баранов - не менее 18 см; короткошерстных тонкорунных и полутонкорунных пород - у маток не менее 8,5 см, баранов не менее 9,5 см. Шерсть по тонине и уравненности должна быть характерна для породы при достаточном количестве качественного жиропота; животные должны иметь правильные формы сложения, высокую скороспелость и мясную продуктивность.

По овцам романовской породы селекционные достижения апробируют при условии соответствия всей апробируемой группы животных требованиям высшего бонитировочного класса по всем свойствам (признакам) и при наличии качественного своеобразия (статистически достоверного превосходства) по одному или даже целому ряду селекционируемых свойств.

По овцам каракульской породы апробируют селекционные достижения на животных всех окрасок, оттенков и расцветок жакетного, плоского и ребристого смушковых типов при условии соответствия всей апробируемой группы требованиям 1-го класса и класса элита, из них класса элита не менее 20%; апробируемые животные должны иметь превосходство по всем свойствам; обладать качественным своеобразием (статистически достоверным превосходством) по одному или ряду селекционируемых свойств.

По козам: селекционируемые достижения по козам пуховых и шерстных пород апробируют при условии соответствия животных апробируемой группы требованиям высшего бонитировочного класса по всем свойствам и наличию качественного своеобразия (статистически достоверного превосходства) по одному или даже целому ряду селекционируемых свойств или признаков.

По лошадям: селекционные достижения по лошадям апробируют при условии соответствия апробируемой группы требованиям высшего бонитировочного класса по всем признакам и наличию качественного своеобразия (статистически достоверного превосходства) по одному или ряду селекционируемых свойств.

По птицам: селекционные достижения по породе, породной группе, внутрипородному типу, комплексу сочетающихся заводских линий по всем видам птиц апробируют при условии соответствия апробируемой птицы (по основным и дополнительным признакам) требованиям класса элита, а по отдельным заводским линиям требованиям высшего бонитировочного класса и превышение этих требований апробируемой птицей всех категорий селекционных достижений по одному из следующих и признаков: по яйценоскости на среднефуражнуюнесушку на 5%; по массе яиц на 3%; по массе молодняка в убойном возрасте (для мясной птицы) по курам на 15%, по другим видам птицы на 5%; по комплексу сочетающихся заводских линий уток на 3%.

Птица нового селекционного достижения, апробируемая по хозяйственно полезным свойствам, не указанным в перечисленных требованиях (устойчивость к заболеваниям, высокие качества яиц, аутосексность и др.), по основным и дополнительным признакам должна быть не ниже 1-го бонитировочного класса.

2.10 Лабораторная работа 10 (ЛР-10) **О проектах отраслевых программ «Развитие мясного скотоводства» и «Развитие молочного скотоводства и стимулирование производства молока» О проектах отраслевых программ «Развитие свиноводство», «Развитие овцеводства», «Развитие коневодства».**

2.10.1 Краткое описание проводимого занятия:

Селекция – это современная система племенной работы, отличительной чертой которой служит изменение масштаба действия системы племенной работы, применение достижений популяционной генетики, использование глубокозамороженной спермы и ЭВМ.

Сочетаемость пар и линий	Популяционная генетика, аддитивная наследственность
Естественное спаривание	Искусственное осеменение
Работу выполняли только специалисты животноводства	В обеспечении крупномасштабной селекции участвуют специалисты разных отраслей народного хозяйства и науки
Приобретение племенных животных	Приобретение гамет и зигот
Ручная обработка данных и ведение племенных книг	Обработка, хранение и анализ данных на компьютере.

Вся система племенной работы в племенных хозяйствах нацелена на увеличение количества реализуемой племенной продукции и повышение ее качества. Остальная продукция животноводства (молоко, мясо, шерсть, яйца и т.д.) является сопутствующей.

На современном этапе развития племенного дела в систему крупномасштабной селекции, например, молочных пород скота входят:

8. Оценка и отбор матерей и отцов ремонтных производителей по единой программе для всей породы, независимо от ее ареала и численности;
9. Выращивание, оценка и отбор ремонтных производителей по развитию, экстерьюру, показателям воспроизводительной способности и другим признакам;
10. Накопление запаса спермы проверяемых производителей;
11. Оценка производителей по качествам потомства;
12. Регламентация использования спермы проверяемых и оценка по качеству потомства производителей;
13. Создание системы сбора, накопления и обработки данных племенного учета по породе с применением современных компьютерных программ и генетико-математических методов;
14. Использование в селекции достижений биотехнологии: иммуногенетическая аттестация происхождения племенных животных, цитогенетическая оценка производителей, трансплантация эмбрионов и др.

Выполнение мероприятий по крупномасштабной селекции осуществляется по следующей схеме:

- В каждой породе или отдельной зоне ее разведения все племенные хозяйства объединяют в небольшое число групп, в которых отбор и подбор осуществляют по единому плану. Каждую группу племенных стад специализируют на разведении определенных линий, неродственных линиям других групп племенных стад. Отечественный и зарубежный опыт показывает, что для популяции от 100 до 500 тыс. коров таких групп желательно иметь не более 5-6.
- Из каждой группы племенных хозяйств ежегодно выделяют по одному быку-лидеру, спермой которых осеменяют наиболее ценных коров этой же группы для получения от них ремонтных быков. При составлении плана заказного спаривания рекомендуется применять родственное спаривание в различных степенях инбридинга. При осеменение коров товарных стад для получения ремонтных телок применяют аутбридинг с общепринятой ротацией линий или родственных групп;
- Для оценки быков по развитию (с 1 до 12-месячного возраста) и воспроизводительной способности (с 12 до 18-месячного возраста) при головных племпредприятиях создают специальные элеверы;
- Для оценки и отбора быков по оплодотворяющей способности спермой каждого проверяемого производителя в сжатые сроки (в течение 3-6 мес) осеменяют не менее 200-300 коров активной части популяции. В активную часть породной популяции входят племенные хозяйства, а также лучшие товарные стада, в которых проводится

оценка быков по качеству потомства. В дальнейшем это позволяет оценить каждого быка по продуктивности 40-60 и более дочерей. Общее число коров, осеменяемых спермой проверяемых быков, должно составлять около 20-30% активной части породной популяции. Остальных коров активной части и всех коров пассивной части популяции осеменяют спермой быков - улучшателей, отобранных после оценки по качеству потомства.

На каждого проверяемого быка в течение 2-3 лет создается запас спермы до 20 – 30 тыс. доз, затем производителя выбраковывают на мясо. Часть производителей, наиболее высоко оцененных по происхождению, после этого переводят в группу «ожидающих» без дальнейшего накопления банка спермы. Если эти быки окажутся улучшателями, то у них возобновляются взятие спермы и общий спермбанк увеличиваются до 50 – 100 тыс. доз и более.

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что лучший результат по крупномасштабной селекции молочных пород скота можно достичь при следующих параметрах (табл. 2).

Таблица 2

Нормативы для основных мероприятий по крупномасштабной селекции молочных пород скота (размер популяции 100 тыс. коров)

Мероприятия	Значение параметров
Размер активной части популяции коров, % ко всему поголовью	50
Число коров в быкопроизводящих стадах, % ко всему поголовью	10
Число отцов быков, гол.	5-10
Число ремонтных производителей, гол.	100
Число быков-улучшателей, отобранных после оценки по потомству, гол.	20-30
Банк спермы на каждого проверяемого быка, тыс. доз	20 – 30
Число коров активной части популяции, осеменяемых спермой проверяемых быков, %	20-30
Число эффективных дочерей на одного проверяемого быка, гол.	40-60
Ежегодный эффект селекции в расчете на одну корову, кг молока	40-50

В породе со слабо развитой племенной базой и в регионах с недостаточными условиями реализации генетического потенциала скот эффективнее внедрять вариант программы селекции с ограниченным запасом долговременного хранения спермы проверяемых быков с последующим переходом на вариант при условии улучшения племенной базы и условий кормления и содержания животных. Согласно второму варианту, все мероприятия крупномасштабной селекции соблюдаются, за исключением того, что на каждого проверяемого быка создается ограниченный запас спермы (500 – 1000 доз) с целью отбора отцов быков. Молодых производителей, отобранных по племенной ценности родителей, развитию и воспроизводительной способности, начиная с 1,5 – летнего возраста интенсивно используют, не дожидаясь результатов оценки по качеству потомства. После оценки по потомству решается вопрос о дальнейшем использовании этих производителей.

Для повышения эффективности крупномасштабной селекции по породам с широким ареалом целесообразно на базе областей и регионов с развитой племенной базой и удовлетворительными условиями по оценке генетического потенциала скота создавать зональные центры по племенной работе и искусственноому осеменению скота при более рациональном использовании быков-улучшателей. В области (регионе) с развитой племенной базой создается запас спермы от быков-улучшателей для осеменения коров не только своей области (региона), но и других областей (регионов). При этом зону обслуживания одним племобъединением можно увеличить до 1 млн

коров и более. При создании таких центров снижаются затраты на содержание малоценных быков и увеличиваются темпы генетического улучшения скота в результате осеменения коров спермой быков -улучшателей.

В соответствии со схемой крупномасштабной селекции включают следующие мероприятия:

1. Организация поэтапной селекции матерей быков. Среди элитной части племенных коров выделяют группу МБ, предназначенную для получения быков производителей. Для получения одного проверяемого быка требуется 10 потенциальных матерей. Отбор матерей быков проводят в несколько этапов. На ЭВМ по индексу племенной ценности среди первотелок отбирают наиболее высокопродуктивных коров. Затем из этой группы выранжировывают худших животных по содержанию жира и белка в молоке, экстерьеру и воспроизводительной способности и т.д. Индекс племенной ценности потенциальных матерей быков включает также информацию по происхождению. После второй лактации коров – будущих матерей быков – уточняют их племенную ценность и составляют план спаривания с таким расчетом, чтобы проверяемые бычки были получены от них по 3-му отелу и позже.

При отборе матерей быков их тщательно осматривают и оценивают по телосложению, крепости конституции, пригодности к машинному доению, состоянию здоровья и т.д. Учитывают также метод выведения и линейную принадлежность. При такой системе оценки и отбора племенную ценность матерей проверяемых быков возрастает.

2. Отбор нескольких наиболее выдающихся производителей в группу отцов быков ОБ. Согласно программе КС всю породную популяцию разбивают на небольшое число неродственных между собой групп и из каждой группы ежегодно выделяют быка-лидера. Также как и матери быков, отцы быков проходят длительный процесс оценки и отбора по происхождению, собственной продуктивности (скорость роста), спермопродукции и качеству потомства.

3. Составление плана заказного спаривания для получения проверяемых бычков. План осеменения матерей быков спермой отцов быков предусматривает происхождение обеих партнеров из одной родственной группы и применение родственного спаривания в различных степенях инбридинга. Д.А.Кисловский (1965) отмечал, что проверять надо не случайно подвернувшийся материал, выбранный лишь по фенотипу или даже по родословной, а полученный с определенной целью путем соответствующих спариваний и подбора.

План заказного спаривания составляют таким образом, чтобы в течение 3-6 мес отобрать необходимое число проверяемых бычков в соотношении минимум 3:1, т.е. на одного производителя, сперма которого должна использоваться для осеменения коров, должно быть не менее трех проверяемых бычков.

4. Создание элеверов по выращиванию и проверке молодых производителей. Элеверы целесообразно создавать при головных племпредприятиях. Комплектуют элеверы ремонтными бычками в возрасте 1-2 мес.

5. Организация поэтапной оценки проверяемых бычков. Племенные качества проверяемых бычков оценивают по собственным показателям (развитие по живой массе до 12-месячного возраста, телосложение, воспроизводительная способность) и по качеству потомства. Отбор быков по собственным качествам способствует генетическому улучшению скота по скороспелости и крепости конституции. У бычков, отобранных по развитию, оценивают половую активность, количество и качество спермы, способность ее к замораживанию.

От проверяемых бычков получают необходимое для оценки по качеству потомства число дочерей. Контрольное осеменение проводят в возможно короткие сроки, по его результатам быков оценивают также по оплодотворяющей способности их

спермы. В дальнейшем создают необходимый запас замороженной спермы.

На основании оценки быков по качеству потомства решают вопрос об использовании спермы. Сперма быков-улучшателей используют для осеменения коров, а сперму ухудшателей уничтожают. С целью сокращения генерационного интервала и повышения эффективности селекции сперму отобранных быков расходуют для осеменения коров в течение только одного года. В следующем году используют сперму новой партии проверенных и отобранных производителей. Среди быков-улучшателей выделяют быков-лидеров для получения от них ремонтных бычков следующей генерации.

Считается, что в основном генетическое улучшение популяции и ее прогнозирование при КС зависит от интенсивности отбора отцов и матерей быков. Темпы генетического прогресса в популяции обусловлены тем, в какой степени используются современные достижения науки и практики при выведении производителей-лидеров.

Как известно процесс передачи генетической информации от родителей к потомкам в популяции осуществляется по 4-м путям передачи генов и интенсивность отбора каждой категории племенных животных неодинакова (табл 3).

Таблица 3

Категории племенных животных.

Пути передачи наследственной информации	Интенсивность отбора категории	Генетический вклад в результат селекции
от отца к сыновьям	3-5 %;	41 %
от отцов к дочерям	10-15 %;	10 %
от матерей к сыновьям	3-10 %;	33 %
от матерей к дочерям	60-90 %.	7 %

Генетическое улучшение хозяйственно полезных признаков животных в процессе селекции зависит от ряда факторов:

- биологическими особенностями популяции;
- структурой селекционных мероприятий;
- системой разведения скота;
- методами определения племенной ценности.

Создание информационной системы в животноводстве России

Основой технологического взаимодействия племенных организаций является система информационно-аналитического обеспечения племенной работы, которая является необходимым условием для повышения генетического потенциала животных и экономической эффективности производства продукции.

На современном этапе развития молочного скотоводства в России организационная структура информационной системы (ИС) допускает два принципа формирования баз данных для сертификации племенного материала и решения селекционных задач:

- централизованный, когда информационная база создается непосредственно в региональных вычислительных центрах и с определенной периодичностью поступает на федеральный (породный) уровень;
- децентрализованный, при котором исходные базы данных формируются непосредственно в племенных хозяйствах, затем передаются на машинных носителях в региональный вычислительный центр, после чего объединенные массивы информации о племенных животных региона поступают в Головной информационно-селекционный центр, где формируются базы данных породного уровня. Технологии формирования баз данных по указанным принципам имеют ряд важных отличий, однако, учитывая

современное состояние инфраструктуры племенных организаций в России, в настоящее время они могут быть допущены к использованию с учетом степени их внедрения в конкретных регионах страны.

Вместе с тем следует отметить, что централизованная система имеет ряд существенных преимуществ, а именно:

- минимизирует затраты на техническое и программное обеспечение;
- повышает степень достоверности учета исходных данных при формировании информационных баз регионального и породного уровня;
- упрощает и удешевляет технологию обмена информацией между базами данных на уровне регионов и пород;
- обеспечивает более оперативную актуализацию данных для региональных организаций и породных ассоциаций по племенной работе;
- в наибольшей степени соответствует международным требованиям по регистрации и идентификации племенных животных Технология организации системы сбора информации при централизованном принципе построения ИС выглядит следующим образом.

На начальном этапе вся информация о племенных животных, имеющихся в племенных хозяйствах, заносится в региональную базу данных. Этот массив служит в качестве исходной базы данных для дальнейшей актуализации и решения селекционных задач. В дальнейшем при рождении теленка в племенном хозяйстве в региональный вычислительный центр (РВЦ) поступает информация об отелившейся корове, которая содержит: идентификацию хозяйства и коровы, дату отела, кличу и идентификационный номер приплода. При этом в региональной базе данных автоматически создается новая запись о новорожденном животном (поскольку вся информация присутствует в записях об отце и матери теленка). В дальнейшем в процессе онтогенеза животного в РВЦ поступает следующая информация: данные о развитии (живая масса, промеры, оценка экстерьера), воспроизводительных качествах животного (даты осеменения, номера быков, спермой которых осеменялась корова, результаты ректальных исследований, легкости отелов, клички и номера приплодов); показатели продуктивности (даты контрольных доек, суточные удои). Указанная информация поступает в РВЦ непосредственно из племенного хозяйства. Точность поступаемой информации контролируется государственной племенной инспекцией, региональными организациями по племенной работе, а также при помощи логических программ формирования баз данных непосредственно в РВЦ. Наряду с этим выборочно (в соответствии с регламентирующими документами) осуществляется периодическая проверка достоверности происхождения животных, осуществляемая через лаборатории иммуногенетической экспертизы.

В случае выявления недостоверности исходных данных соответствующая информация в региональных базах данных подлежит корректировке (или удалению). Из лаборатории по определению качества молока непосредственно в РВЦ поступают данные о качественных характеристиках молока (содержание жира, белка и т. д.) каждой зарегистрированной коровы. Анализ осуществляется на основе отбора проб молока, организуемого лабораторией по договору на проведение соответствующей работы с каждым племенным хозяйством региона. Контроль за качеством отбора проб и точностью определения характеристик молока осуществляется также органами Госплеминспекции региона. Таким образом производится регистрация каждого племенного животного и актуализация информации о нем в региональной базе данных.

Несколько иная организационная взаимосвязь предусматривается при обмене информацией между РВЦ и организациями по искусенному осеменению сельскохозяйственных животных. При поступлении быка (спермы быка) на племпредприятие вся информация о нем из племенного сертификата переносится в базу

данных самого предприятия, а оттуда поступает в РВЦ, где формируется справочник быков-производителей. Этот справочник содержит лишь ту информацию о быке, которая необходима для его оценки (по росту и развитию, воспроизводительной способности и продуктивности дочерей) и формирования сертификатов племенных животных (телок, бычков, коров). Вся оперативная актуализация базы данных быков-производителей (информация о количестве и качестве накопленной спермы, объемах реализации и др.) осуществляется непосредственно в организациях по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.

Информационная база данных, создаваемая в РВЦ, служит массивом для решения следующих селекционных задач:

- оперативное управление стадом (выдача сводок, анализов, прогнозов владельцам племенных животных);
 - формирование племенных сертификатов животных при племпродажах;
 - свод и анализ результатов бонитировки на уровнях хозяйства, района, региона;
 - формирование информации для осуществления контрольных функций (для органов Госплеминспекции);
 - решение селекционных задач по запросу племенных хозяйств;
 - формирование исходных массивов для актуализации базы данных племенных животных породного уровня управления.

На уровне управления племенной работой в породе (популяции) информационная база предназначена для:

- определения селекционно-генетической ситуации в породе (популяции) и ее анализа;
 - сравнительной характеристики пород, регионов, экономических районов по уровню развития племенной базы;
 - разработки селекционных программ в области племенного животноводства;
 - оценки племенных качеств животных по различным параметрам и с учетом целей селекционной работы;
 - оценки генетических трендов по селекционным признакам в породе, популяции;
 - формирования основных селекционных групп животных (отцов быков, отцов коров, матерей быков);
 - краткосрочного и долгосрочного прогнозирования динамики развития племенного животноводства в России.

Перспективы применения современных интернет технологий в информационных системах агропромышленного комплекса РФ

В настоящее время невозможно представить себе область человеческой деятельности, где бы ни применялись компьютеры, информационные системы и технологии. Не является исключением и сельское хозяйство, где во многих отраслях накоплены огромные массивы данных, которые требуют современные технологии обработки информации.

Создание баз данных и их анализ не являются чем-то новым. Однако технология баз данных предоставляет соответствующий современности, более эффективный, удобный и быстрый подход к анализу проблем и решению различных задач. В связи с наличием на рынке большого количества разнообразных систем управления базами данных (СУБД) особый интерес в настоящее время приобретает именно выбор таких систем. Они должны быть, во-первых, доступны по стоимости, во-вторых, должны содержать полный набор стандартных операций, выполняемых СУБД, в-третьих, обеспечивать доступ к данным через глобальную сеть интернет, при условии соблюдения требований защиты информации.

3.3. Современные направления в селекции молочного скота и оценке быков-производителей. Системы информационных технологий в молочном скотоводстве (СЭЛЭКС, BLUP).

Прогноз племенной ценности даже в его наипростейшей форме основывается на знании фенотипической и аддитивной генетической дисперсии признаков или коэффициента наследуемости. Для большинства российских популяций сельскохозяйственных животных эти параметры неизвестны. Однако для эффективного управления селекцией необходима как можно более полная качественная и надежная информация как об отдельном животном, так и о популяции в целом. Для получения и обработки такой информации требуется определенная система обработки данных.

Предложенная профессором В. М. Кузнецовым схема информационного процесса управления селекцией показана на рис. 2.



Концепция информационного процесса управления селекцией выглядит следующим образом:

1. Подход к селекции как к динамической системе управления процессом генетического совершенствования больших и малочисленных популяций. (Система должна быть гибкой и быстро реагировать на различные, сторонние изменения).
2. Ориентация на современные методы селекции. (Математическое обеспечение системы должно базироваться на теории селекции животных, обобщенных линейных моделях и экономико-математических методах).
3. Ориентация на фермеров, селекционеров хозяйств, специалистов племпредприятий, селекционных центров или ассоциаций по породам. (Система должна предоставлять лицам, принимающим решения необходимую информацию в понятной форме).
4. Ориентация на максимальную генетическую и экономическую эффективность. (Система должна обеспечить лиц, принимающих решения, такой текущей и перспективной информацией, которая бы гарантировала максимальную эффективность разведения животных).
5. Независимость системы от ведения учета данных. (Программное обеспечение должно работать с любой базой данных).

В информационной системе управления селекцией выделяют следующие блоки задач:

- статистический анализ данных,
- генетическая оценка животных, генетический анализ популяций,
- оптимальная программа селекции,

- оптимизация отбора и подбора животных,
- оценка эффективности.

Основой любой системы селекции является оценка племенной ценности потенциальных родителей. Цель оценки - получить как можно более точный прогноз генетической ценности особи. Чем достовернее генетическая оценка, чем строже отбор на основе этой оценки, и чем интенсивнее использование генетически лучших животных, тем больше будет уверенности у селекционеров в улучшении животных от поколения к поколению. В России племенную ценность рассчитывают только у быков, расчет ее ведется методом сравнения со сверстницами, предложенным Альтшулером и Сухановым в 1936 году.

При использовании этого метода продуктивность дочерей быка сравнивается с продуктивностью лактировавших в аналогичных условиях сверстниц. Этот метод легко применим на практике, но имеет ряд недостатков. В частности, он эффективен и обеспечивает безошибочные оценки племенной ценности быков только в случае:

- 1) если средняя генетическая ценность отцов сверстниц одинакова для дочерей всех оцениваемых быков;
- 2) все оцениваемые быки выбираются из одной популяции (закрытая система разведения);
- 3) в популяции нет генетического тренда, то есть эффект селекции равен 0.

При разведении отечественных пород молочного скота, когда для генетического улучшения животных используется семя производителей разных стран, эти условия не соответствуют действительности, поэтому прямой метод сравнения со сверстницами не исключает возможности неточностей и ошибок при классификации быков по их племенной ценности.

Точный прогноз племенной ценности играет важную роль в программах генетического улучшения сельскохозяйственных животных. Это особенно важно для категории животных, малочисленность и высокий уровень воспроизводства, которых имеет преобладающее влияние на генетическую ценность популяции. Исследования показали, что вклад отцов в генетическое улучшение молочной продуктивности может достигать 40% и более.

Системы управления базами данных (СУБД) позволяют манипулировать собранными данными и переработать их в необходимую для оценки и прогноза информацию. Для анализа таких данных используются статистические модели смешанного типа (ММЕ). Эти модели включают в себя фиксированные и случайные (рандомизированные) факторы. Результатом решения (обработки ММЕ) является наилучший несмещенный линейный прогноз (Best Linear Unbiased Prediction) BLUP для рандомизированных, и наилучшая несмещенная линейная оценка (Best Linear Unbiased Estimation) BLUE для фиксированных факторов. Первый показывает вероятность проявления того или иного случайного фактора, а вторая - важность учета и силу действия того или иного фиксированного фактора. Эти методы разработаны американским ученым Ч. Хендersonом.

Методы оценки быков производителей постоянно совершенствуются. Наиболее совершенная оценка методом BLUP. Этот метод тоже освоен в системе СЕЛЭКС.

Для достижения наиболее точного прогноза необходимо учитывать следующие требования:

1. Привлечь все имеющиеся данные.
2. Определить, оценить и устраниТЬ из оценки значимые или наиболее значимые факторы окружающей внешней среды.
3. Использовать статистические методы, обеспечивающие несмещенный прогноз генотипа. Исследованиями было установлено, что генетическая оценка молочного скота по методу BLUP способствует повышению идентификации генотипа на 12-40% и более.

Таблица 4

выборка	метод оценки	число быков	повторяемость		% к СС	
			удой, кг	жир, %	удой	Жир
20 племенных хозяйств	СС	116	0,45	0,30	-	-
	BLUP	116	0,53	0,44	118	147

Например в таблице 4 приведены данные расчета повторяемости оценок племенной ценности быков, проведенного методами сравнения со сверстницами и BLUP, в 20 племенных хозяйствах Ленинградской области (по данным ВНИИ разведения и генетики сельскохозяйственных животных). Видно, что повторяемость (а, следовательно, и молочность, и содержание жира в молоке) BLUP-оценок была выше, чем оценок по методу СС. Использование BLUP повышало достоверность оценки быков по удою на 18%, по жиру - на 47%. Однако по данным ВНИИРГЖ свойства BLUP в большей степени реализуются при оценке быков, по данным массового учета молочной продуктивности не только в племенных, но и в обычных молочно-товарных хозяйствах. При этом достоверность оценки в сравнении с методом СС может достигать 25-37%.

Статистические модели, требующиеся для метода BLUP, составляются для каждой популяции индивидуально, однако в общих чертах эту модель можно описать.

Например:

удой дочери быка = среднее по стаду + эффект года - сезона отела + эффект отца + другие неучтенные факторы.

Модель - это уравнение, которое показывает, как независимые переменные (стадо, год, сезон отела) влияют на зависимую переменную - признак (удой, % жира). Она необходима для того, чтобы описать фактическую ситуацию в популяции, то есть, как можно полнее и точнее показать факторы, влияющие на продуктивность животного. Решение статистической модели обеспечивает наилучший несмещенный линейный прогноз 1/2 аддитивной генетической ценности быка, не зависящий от влияния содержания и кормления дочерей на ферме, года и сезона отела, а также всех взаимодействий между этими факторами. В настоящее время истинная генетическая ценность особей не может быть оценена со 100% точностью, поэтому непосредственно измерить эффективность того или иного метода невозможно. Можно лишь сравнить разные методы с методом, который изначально считается более точным. С точки зрения математики, статистики и селекции метод BLUP считается наиболее обоснованным и имеет под собой лучшую теоретическую базу.

Оценки племенной ценности, рассчитанные по методу BLUP, имеют минимальную дисперсию ошибки. Поэтому можно считать, что, при прочих равных условиях оценки племенной ценности по BLUP будут с наибольшей вероятностью отражать истинную генетическую ценность особи. На самом первом этапе этой работы необходимо привлекать данные хозяйств, ведущих племенной учет в своих стадах. Чем больше данных будет привлечено в обработку на первом этапе, тем точнее будет оценка, сделанная на их основании, и более оправданная программа селекции, принятая на основе анализа этих данных. Примерная форма создаваемой базы данных представлена в таблице 2 (количество строк и столбцов в базе может варьироваться в зависимости от полноты данных, имеющихся в хозяйствах). Системы управления базами данных (СУБД), уже разработанные в настоящее время, позволяют выполнять многие задачи. Наиболее приемлемы для этих целей СУБД FOX PRO и ее аналоги. Эта СУБД позволяет создавать файлы DBF, которые потом можно обрабатывать в программных пакетах Microsoft Office - Excel, а также программами статистической обработки данных SAS, HARVY. Кроме этого повсеместно используемая программа СЕЛЭКС-Россия может использоваться для первоначального сбора и накопления данных и дальнейшей их обработке в FOX PRO, однако использование недокументированного материала при создании этой программы может вызвать некоторые трудности у рядового пользователя

при работе по совмещению баз данных этих двух программ. Дальнейшая работа с данными должна быть направлена на то, чтобы селекционер мог оптимизировать результативность своего труда в прошлом, продолжая эффективно осуществлять оценку, отбор и использование лучших животных в настоящем и разрабатывать оптимальные программы селекции в будущем. Управление селекцией - непрерывный процесс, включающий планирование реализацию и контроль. Поскольку сбор первичных данных в хозяйствах происходит по различным системам, а конечный результат работы должен быть доступен и понятен каждому селекционеру для реализации программ селекции на местах, встает актуальная проблема - совместимость программного обеспечения - ведь разные хозяйства используют различный soft для своих ЭВМ, как правило, несовместимый между собой. Оценка компонентов фенотипической изменчивости, вычисление коэффициентов наследуемости, а также составление статистических моделей для оценки племенной ценности животных в каждом конкретном случае - это работа научно-исследовательских организаций, однако сбор информации, ее хранение, а затем и реализация разработанных программ должна осуществляться селекционерами племзаводов и племрепродукторов, которые работают над улучшением той или иной породы крупного рогатого скота. Поэтому необходимо рекомендовать внедрять единый пакет программ для сбора, обработки и анализа данных (некоторым примером этого может служить применение системы СЕЛЭКС и пакеты программ приведенных выше). Это очень важно, так как в племенную работу включены, как правило, различные учреждения организации предприятия и хозяйства.

Современное состояние крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направления продуктивности в России и Оренбургской области.

Пробонитированное поголовье относится к 24 породам и 2 типам, среди которых доминирующее положение по численности поголовья занимают животные чернопестрой породы - 2516,87 тыс. гол. (52%), на 2-м месте животные симментальской - 757,29 (15,6%) и на 3-м месте по численности находятся животные холмогорской породы - 396,18 тыс. гол. (8,18%).

Наивысшую молочную продуктивность в нашей стране имеет скот чернопестрой породы. Удельный вес этих коров составляет 48,5% от общего поголовья, а доля валового производства молока - 53,1%. Для сравнения: доля симментальских коров - 19,4%, молока - 15,7%; швицких и ярославских соответственно - 3,2 и 2,5% и 2,2 и 1,9%.

В 230 племенных заводах и 909 племенных репродукторах содержится соответственно 3,1 и 7,9% коров от общего поголовья на сельхозпредприятиях.

Совершенствование племенных и продуктивных качеств отечественного скота молочного направления продуктивности в Российской Федерации осуществляется 239 племенными заводами и 815 племенными репродукторами, в которых содержится 1129,6 тыс. голов животных, в том числе 620,6 тыс. коров. Количество племенных заводов в сравнении с предыдущим годом снизилось на 11, а племрепродукторов на 80 единиц. Численность скота в племенных заводах выросла на 6,62 тыс. гол., а в племрепродукторах сократилась на 113,3 тыс. гол. За 2001 – 2006 гг. в стране стало меньше на 35 племзаводов и один племрепродуктор. Численность скота в них снизилась соответственно на 8,6 и 0,2%, в том числе коров на 7,3 и 1,2%.

Вследствие систематической племенной работы на племпредприятиях продуктивность животных содержащихся в них значительно выше, чем в товарных хозяйствах. Средний удой коров по племзаводам составил 5720 кг, по племрепродукторам - 4411, что выше показателей предыдущего года соответственно на 253 и 234 кг. Поголовье коров с удоем более 7000 кг и содержанием жира в молоке 4% и выше в племенных заводах составило 7824 гол., в племрепродукторах - 3481 гол., что выше уровня предыдущего года на 2298 и 857 гол. соответственно.

Возрос показатель реализации племенного молодняка по племзаводам на 1366

гол., по племпродукторам - на 3345 гол. и составил 11199 и 22419 гол. соответственно. За год объем племпродаж вырос в племзаводах на 6,8%, в том числе ремонтных бычков на 10%, в племпродукторах - соответственно на 9,6 и 9,2%.

Состояние отрасли - молочное скотоводство в Оренбургской области, как и в целом по России, в результате многолетней неблагополучной экономической ситуации в агропромышленном комплексе произошло резкое падение объемов производства животноводческой продукции, а само производство стало убыточным. Тем не менее, АПК Оренбургской области - крупнейший сектор народного хозяйства, от эффективной работы которого во многом зависит стабильность экономической, социальной и политической ситуации региона. Не зря наша область в Приволжском Федеральном Округе - на четвертом месте по объемам производства молока и реализации на убой скота и птицы, среди сельхозпредприятий в целом - на шестом, по численности КРС - на третьем (уступает лишь Республикам Татарстан и Башкортостан). Администрация области, департамент АПК совместно с районными администрациями, активом аграрников на местах постоянно ищут пути сохранения и повышения эффективности аграрного сектора. Это делается и ради тех 954 тыс. человек, проживающих на селе, которые составляют 42% населения Оренбуржья.

Так, в 2012 г. было выделено 253 млн. руб., в т. ч. на производство мяса КРС - 30,8 млн. руб. свиней 19,5 млн. руб.; на развитие мясного скотоводства - 20,7 млн. рублей, овцеводства и козоводства - 19,1 млн. руб.; на производство молока - 163,0 млн. руб. Кроме того, 30 млн. руб. пошло на поддержку племенного дела с целью компенсации части затрат связанных с выращиванием племенного молодняка, птицы и получением племяиц при реализации продукции на племенные цели. Не случайно объем племпродаж скота в товарные хозяйства племенными репродукторами и заводами области в 2004 г. был по меркам сегодняшнего дня достаточно весомым. Реализация молодняка КРС составила 1416 гол, свиней - 950 гол, овец- 1895 гол., коз - 40 гол., лошадей – 20 гол. Следует подчеркнуть, что все виды финансовой поддержки Сельхозпредприятий действуют на возвратной основе (кроме дотации на животноводческую продукцию и субсидирования процентных ставок по привлекаемым кредитам), поэтому деньги областной финподдержки постоянно работают, ибо единственное ее условие своевременный возврат заемных средств. Федеральная поддержка несколько скромнее областной.

Отметим: в 2006 г. сельхозпредприятиями области произведено (выращено) скота и птицы в живом весе общим объемом в 60 тыс. т. Среднесуточные привесы молодняка КРС - 323 г, Свиней - 156 г, что говорит о необходимости серьезной работы в этом направлении. Отрадно заметить: в 2004 г произведено 19,3 тыс. т мяса птицы или 200% к уровню 2011-го, что стало возможным благодаря пуску в строй птицефабрики ЗАО «Оренбургский бройлер», увеличившей производство мяса птицы с 4,5 тыс. т в 2011 г. до 14,1 тыс. т в 2004 г., производство яиц достигло 484 млн штук при средней яйценоскости кур-несушек в 300 шт. Сельхозпредприятиями области в прошлом году произведено 257,6 тыс. т. Молока (при надое на одну фуражную корову 1872 кг). В лучших районах области продуктивность дойного стада выше: так, в Октябрьском районе надаивают в среднем по 2546 кг на одну корову, Сакмарском - 2533 кг, Ташлинском - 2484 кг В 2004-м в области производится 420 т овечьей шерсти, 318 т козьего пуха. Средний настриг с овец - 3,1 кг, начес пуха с козы - 257 г.

В сельхозпредприятиях области на начало 2005 г. поголовье КРС составляло 405,7 тыс. гол., в т. ч. 153,9 тыс. коров. Из них поголовье КРС специализированных мясных пород - 61,2 тыс. гол. (в т. ч. коров - 23,9 тыс.). Характеризуя породный состав скота молочного направления КРС Оренбуржья, отметим, что 52% приходится на симментальскую породу, 41% - на красную степную и 7% - на черно-пеструю.

Племенную базу молочного скотоводства составляет скот племенного завода

ФГУП ПЗ им. Свердлова (руководитель М. И. Шоков) и 14 племенных репродукторов, 7 из которых занимаются разведением животных красной степной породы и 8 - симментальской. Численность племенного поголовья - 10,4 тыс. коров или 7% от поголовья коров общественного стада области. Средняя продуктивность коров в племхозяйствах - 2943 кг, что на 57% выше среднеобластного показателя. Наивысшая молочная продуктивность коров в ОАО «Оренбургское» по племенной работе - 5205 кг, ФГУП ГПЗ им. Свердлова - 4120 кг и ЗАО им. Калинин - 3527 кг.

Значение мясных пород в интенсификации производства говядины

В настоящее время в России разводится 9 пород скота данного направления развития, численность его не превышает 400 тыс. гол. Для обеспечения потребностей отрасли в племживотных создана сеть племхозяйств (18 племзаводов и 99 племрепродукторов), где численность племскота - 150,1 тыс. гол., в т. ч. 67,4 тыс. коров. Наибольшее количество мясного скота России представлено калмыцкой породой - 55%, на долю герефордов приходится 25,2%, казахской белоголовой - 14,6%, абердин-ангусской - 1,4%, лимузинской - 1,3%, обрак - 0,7%, салерс - 0,6% и шаролезской - 0,5%. Основной массив племенного калмыцкого скота размещен в Республике Калмыкия - 61%, в Оренбургской области - 42% и в Ростовской - 34,8%. В настоящее время «Программой развития мясного скотоводства России до 2010 г.» предусматривается увеличить количество племенных коров в 3,5-4,0 раза, что позволит ежегодно выращивать до 40~45 тыс. плембычков.

Современное состояние мясного скотоводства в России

В сельскохозяйственных предприятиях Российской Федерации на 1 января 2006 года по данным Госкомстата содержалось 395376 голов крупного рогатого скота мясного направления продуктивности, в том числе 157721 коров. По сравнению с предыдущим годом общая численность мясных животных увеличилась на 0,8 %, а коров снизилась на 1,2 %. В РФ по-прежнему роль мясного скотоводства в производстве говядины остается невысокой (около 2%), однако в этой отрасли имеется значительный потенциал, реализация которого может существенно улучшить ситуацию на продовольственном рынке России. В 2006 году было пробонитировано 150,1 тыс. животных мясного направления продуктивности, принадлежащих к 9 породам, разводимым в 30 регионах Российской Федерации. Из приведенных материалов видно, что наибольший удельный вес имеют калмыцкая (55,0%), герефордская (25,2%) и казахская белоголовая (14,6 %) породы. В целом относительная численность перечисленных групп скота составляет 94,8 % от разводимого в России мясного поголовья. Остальные породы мясного скота (абердин-ангусская, обрак, головейская, салерс, лимузинская и шаролезская) занимают незначительное место в развитии отрасли. В настоящее время совершенствование генетических и продуктивных качеств крупного рогатого скота мясных пород осуществляется 18 племенными заводами и 99 племенными репродукторами. По сравнению с 2002 годом количество племзаводов сократилось более чем на 18%, а численность племрепродукторов - на 2%, при этом удельный вес животных, которые содержатся в племенных хозяйствах, возрос с 26,1%, до 28,7%. Как известно, основное предназначение племенных хозяйств - поставка племенного материала товаропроизводителю. В 2002 году в различные категории хозяйств из племхозов было продано 6710 голов племенного молодняка, в том числе 1416 ремонтных бычков. По сравнению с 2002 годом объемы племпродажи возросли на 36,9%, а по производителям - на 13,4%.

Овцеводство и козоводство РФ обладают богатым генофондом, насчитывающим более 30 тонкорунных и полутонкорунных пород овец и около 10 пород коз. В 1990 году в РФ численность овец и коз составляла 61,3 млн, а годовое производство шерсти и пуха достигло 224 тыс. т, что обеспечивало в основном потребности народного хозяйства страны. От овцеводства меховая промышленность

получала более 80% сырья. Производство баранины составляло 884 тыс. т. на мясокомбинаты страны ежегодно поступало на убой более 10 млн. овец и коз.

Однако в условиях перехода к рыночной экономике в отрасли сложилась кризисная ситуация. Численность овец и коз к 2000 году во всех категориях хозяйств сократилась до 14,7 млн, а производство шерсти и пуха — до 40,3 тыс. т, фактически прекращена поставка сортового шубного-мехового сырья отечественной меховой промышленности.

В настоящее время положение несколько стабилизировалось. Так, к 2004 году численность овец и коз по сравнению с 2000 годом возросла на 15%, производство шерсти увеличилось на 10,5%.

Стабилизация и дальнейшее развитие отрасли в современных условиях, в отличие от прошлых лет, требует ее адаптации к внутреннему и внешнему рынкам. Необходимо пересмотреть и уточнить роль и значение овцеводства и козоводства в народнохозяйственном комплексе России. В условиях внедрения регулируемого рынка восстановление этой отрасли должно рассматриваться как необходимость более полного и рационального использования кормовых и трудовых ресурсов страны для производства дешевой продукции овцеводства.

Департамент животноводства и племенного дела МСХ РФ, РАСХН с участием ученых ВИЖ и других научно-исследовательских учреждений разработали федеральную целевую программу стабилизации и развития овцеводства и козоводства России на 1999—2005 годы.

Особое внимание должно было уделяться получению продукции высокого качества, обеспечивающего ее конкурентоспособность при формировании цивилизованного рынка. Важнейшим этапом в этом направлении является сохранение и совершенствование племенных ресурсов и эффективная селекция. Прежде всего это касается меринового, полутонкорунного и романовского овцеводства. Необходимо возродить смушковое и курдючное овцеводство, расширить базу цигайских овец, а также полугрубощерстных пород с белой шерстью для производства ковровых, валяльно-войлокных, шубного-меховых изделий и баранины. Расширить зону разведения коз с однородной ангорской шерстью, пухового и молочного направлений. Создать государственные фермы-заказники для сохранения генофонда исчезающих пород овец и коз.

Дальнейшее развитие отрасли, повышение его конкурентоспособности в большинстве районов РФ не может быть решено без учета мясной продуктивности овец. В связи с этим одной из первоочередных задач является сохранение имеющегося генофонда мясных и мясо-шерстных пород. Особую ценность для овцеводства северных районов России представляют романовские овцы.

Современное состояние коневодства в РФ и области. (рабоче -пользовательное коневодство; продуктивное коневодство; племенное коневодство; спортивное коневодство). Коневодство — нужная и выгодная отрасль. Лошадь используется на внутрихозяйственных транспортных работах, для откорма и получения мяса- конины как непременного компонента высокосортных твердых колбас. Из кобыльего молока приготавливают лечебный напиток — кумыс. Молочная продуктивность кобыл достигает 2—2,5 тыс. кг в год, рекордная — 6,1 тыс. В нашей стране широко развит конный спорт. Конина и спортивные лошади являются предметом экспорта. На аукционах за высококлассную спортивную лошадь платят от 20 тыс. до 1 млн. руб. Но главным направлением в коневодстве остается использование лошадей на различных работах.

Современное состояние коневодства в РФ динамика численности лошадей по категориям хозяйств. Изменение общей численности лошадей в России снижено на 31% (с 2600 до 1800 тыс гол). Кроме того, в России после массового сброса на мясо в 2000-2005 годах

крупного рогатого скота, овец и свиней, начался массовый расход на мясо и другие цели табунных лошадей.

В настоящее время в частном владении населения находится 46 % от всего конского поголовья России и 57 % поголовья кобыл 3-х лет и старше, в крупных сельскохозяйственных предприятиях - соответственно 51 и 38 процентов.

Вторым по значимости направлением является продуктивное коневодство, которое подразделяется на две подотрасли - мясное табунное и молочное. Специализированное мясное табунное коневодство развито в восточных регионах страны, располагающих большими массивами природных пастбищ с невысоким снежным покровом в зимний период, что делает возможным проводить круглогодовой выпас лошадей (Дальний Восток, Сибирь, частично Урал и Поволжье). В этих районах насчитывается около 200 специализированных коневодческих ферм мясного направления и 83 фермы по производству кумыса. Конское мясо занимает здесь значительный удельный вес в мясном рационе населения. Например, в республике Алтай на долю конины в мясном балансе приходится 6-8 %, в Якутии - до 20-25 процентов. В центральных регионах России на мясо идут взрослые лошади, выбракованные из основного конского состава и так называемый сверхремонтный молодняк. Коневодство дает ежегодно около 80 тыс. тонн мяса в живой массе, в том числе половину в районах специализированного табунного коневодства. Молочное коневодство предусматривает получение кобыльего молока на специальных фермах и производство из него высокоценного пищевого, диетического и лечебного продукта - кумыса. Натуральный кумыс, приготовленный из кобыльего молока, является традиционным продуктом питания населения Башкирии и некоторых других районов России. Наша страна является родиной кумысолечения больных туберкулезом. В современной медицине кумыс применяется не только для лечения туберкулеза легких, но и желудочно-кишечных, костных и ряда других заболеваний. Среднегодовое производство кумыса в Российской Федерации в динамике характеризуется следующими показателями: 1981-1990 г.г. - 3,0 и 1991-1998 г.г. - 1,8 тыс. тонн. Этого далеко недостаточно, так как только потребность противотуберкулезных учреждений России составляет около 20,0 тыс. тонн в год.

Племенное коневодство дает племенных и спортивных лошадей для улучшения массового коневодства (рабоче-пользовательного и продуктивного), конноспортивным организациям разного назначения (конноспортивные школы, секции и клубы, пункты верхового и экипажного проката и др.). На территории Российской Федерации функционирует в настоящее время 74 конных завода, 500 племенных коневодческих ферм, 38 ипподромов и 60 государственных заводских конюшен.

В России Племенное коневодство. В целях повышения эффективности племенного коневодства разработана система породного улучшения конского поголовья, которая координирует деятельность племенных государственных конных заводов, государственных заводских конюшен, племенных ферм, ипподромов, госсплемрассадники. Ежегодно в сельскохозяйственные, спортивные и другие организации, конные заводы и племенные коневодческие фермы реализуют внутри страны 5-5,5 тыс. голов племенных лошадей на сумму 50 млн. рублей. Кроме того, ежегодно поставляется на экспорт около 1000 голов племенных и спортивных лошадей на сумму до 20 млн. рублей. Коневодство ежегодно поставляет также до тысячи лошадей предприятиям биопромышленности. В массовом и классическом конном спорте, туризме и прокате, и других организациях социальной сферы используется около 15,0 тыс. лошадей. Вместе с тем, в силу ряда причин, многогранные резервы коневодства в увеличении производства сельскохозяйственной продукции используется не полностью, а коннозаводство отстает от мирового уровня.

В России разводятся 17 заводских пород. К этому числу необходимо добавить недавно утвержденные русскую верховую (курируемую кафедрой коневодства Тимирязевской

сельхозакадемии) и новоалтайскую (создана под руководством специалистов ВНИИКа). В соответствии с Государственным реестром селекционных достижений, допущенных к использованию в России Министерством сельского хозяйства РФ, в стране числится 38 пород. Из них реально существуют и культивируются только перечисленные выше 19 пород. Семь пород, разводимых в других странах (венгерская, казахская, кушумская, литовская тяжеловозная, торийская, украинская верховая), представлены отдельными особями в разных хозяйствах.

Резкое сокращение числа лошадей тяжеловозных пород - прямое следствие того, что в сельском хозяйстве, даже и в маломощных фермерских хозяйствах, лошадь утратила свое значение, несмотря на все виды кризисов - экономического, энергетического и экологического.

Спортивное коневодство. В результате обобщения имеющихся литературных и анкетных данных собраны сведения о развитии спортивного коневодства в Московской, Ленинградской и Рязанской областях (105 конноспортивных организаций).

Установлено, что в своем большинстве это частные организации, оказывающие свыше четырехсот платных услуг населению. Конноспортивные организации оформлены в виде клубов, секций, баз, школ, комплексов, заповедников, оздоровительных центров, полигонов, малых и частных предприятий, фермерских хозяйств, племенных ферм и т.д. (всего 35 наименований). В среднем на одну организацию приходится 14 лошадей, с колебаниями от 10 до 30 голов, на которых представляется населению в среднем по 4 услуги. В распределении услуг по видам преобладают обучение (верховая езда, технология, ветеринария и т.д.) во всех 105 организациях (100 %); конноспортивная подготовка - 85 организаций (81 %); прокат верховой и экипажный - 60 организаций (57 %); аренда денников и постой - 35 организаций (33 %); реализация лошадей - 15 организаций (14 %); разведение и оказание услуг по выжеребке лошадей - 15 организаций (14 %). Во всех конноспортивных организациях,ываемые услуги являются платными. При этом группа услуг по обучению верховой езде, спортивной подготовке и прогулкам на лошадях оценивается от 20 до 160 рублей за один час, обслуживание свадебных и других торжеств 150-450 рублей в час. Услуги по аренде денников составляют в пределах 150-450 условных единиц в месяц, ковка лошадей 10-20 условных единиц за одну голову и т.д.

В текущем году произошли определенные перемены в развитии областного коневодства. В улучшении породности лошадей в области и, особенно, в создании племенного коневодства на сельхозпредприятиях Оренбуржья главная роль принадлежит Оренбургской Госконюшне. Государственная Госконюшня с ипподромом «Оренбургская» переданы в государственной собственность Оренбургской области.

Применяемые Госконюшней зооветеринарные мероприятия, а также квалифицированная подготовка кадров - основа внедрения заводских приемов племенной работы. Как итог, результативное участие верховых лошадей в испытаниях не только на «родном» ипподроме, но и на Московском, Пятигорском, Львовском, Ташкентском; рысистых - на Московском, Свердловском, Саратовском, Ра-менском ипподромах. За летний период испытано 117 лошадей. Гордостью Оренбуржья является конный завод «Спутник».

Лучшую резвость среди 3-леток на Оренбургском ипподроме в 2003 г. показал ЛИСТ - 2.06 (владелец - «Оренбург-Лада») под управлением мастера-наездника В.И. Сапрыкина. В 2004-м лучшая резвость была у РЕЛЬЕФА (рожденного и выращенного на конезаводе «Спутник» Соль-Пленного района - 2.04,4) под управлением мастера-наездника международного класса В.К. Танишина, показанная на Центральном Московском ипподроме. В 2004-м впервые за 115 лет существования оренбургского ипподрома здесь проводились зимние бега.

Сегодня перед ГУ и ГК с ипподромом «Оренбургская» стоят следующие задачи: проведение конно-спортивных соревнований; выращивание и реализация племенных

лошадей тяжеловозной, буденновской, орловской рысистой и тракененской пород; выделение племенных жеребцов-производителей хозяйствам области для улучшения качества конского поголовья в хозяйствах; создание детской конноспортивной школы; производство и продажа кумыса населению города, детским учреждениям, больницам и санаториям. Особо заметим: основатель отечественного кумысолечения (открывший в 1858 г. первую кумысолечебницу) Н.В Постников так характеризует суть действия кумыса на человеческий организм: питает, укрепляет, обновляет. Долгое время кумыс был единственным эффективным средством борьбы с таким коварным врагом человека, как легочный туберкулез. Современная медицина использует кумыс в сочетании с антибиотиками для лечения легочного, костного и почечного туберкулеза, желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых заболеваний, при авитаминозах и нарушениях общего обмена веществ. Кумыс - 100%-но натуральный продукт, производство которого выгодно и рентабельно.

2.11 Лабораторная работа 11 (ЛР-11) Разработка и оптимизация программ селекции по породе.

2.11.1 Краткое описание проводимого занятия:

Разработка методов повышения эффективности селекции овец романовской породы по продуктивности и жизнеспособности

Романовская порода по комплексу хозяйствственно-полезных признаков уникальна. Высокая плодовитость маток сочетается с полигестричностью. Она не уступает мясным породам овец по количеству производимого мяса на одну овцу, хорошо зарекомендовала себя как промежуточная порода при скрещивании.

Ликвидация в 1975 г. мелких колхозных ферм и концентрация овец сначала в специализированных хозяйствах по отраслевому принципу, а затем (в гг.) - на крупных комплексах промышленного типа, что не соответствовало биологическим особенностям романовских овец, привело к резкому сокращению поголовья. Численность романовских овец на сельскохозяйственных предприятиях на начало 2009 г. составила 37,6 тыс. гол.

Оптимизация программы селекции в романовском овцеводстве

Методические основы моделирования селекционных процессов в романовском овцеводстве разработаны на основе современных достижений популяционной генетики и вычислительной техники. Расчет программ селекции осуществлялся на ЭВМ ЕС-1022.

Всего просчитано около 1500 вариантов. В результате обработки материалов оптимизированы основные параметры селекционного процесса с учетом максимализации генетического прогресса в популяции животных романовской породы (на примере Угличского района Ярославской области).

С учетом существующих производственно-зоотехнических условий наиболее перспективен для внедрения вариант, при котором предусматривается получение от заказных спариваний 147 ремонтных баранчиков от 8 отцов; постановка на проверку по потомству 118 баранов при нагрузке на каждого из них по 15 маток и при осеменении одним оцененным улучшателем 50 маток. Основные параметры программ селекции приведены в табл. 16.

Таблица 16. Основные параметры программы селекции

Параметры	Значение
1. Число маток, осеменяемых спермой одного проверяемого барана, гол.	15
2. Число баранов, которых необходимо поставить на выращивание с целью отбора их по типу и интенсивности роста, гол.	147
3. Число баранов, которых следует поставить на проверку по качеству потомства, гол.	118
4. Число эффективных дочерей для оценки одного барана, гол.	10
5. Число маток активной части популяции, осеменяемых спермой проверяемых баранов, гол.	1769
6. Число баранов, отбираемых по качеству потомства, гол.	30

7. Число линий в зоне	4
8. Число отцов в каждой линии, гол.	2
9. Число отцов баранов следующего поколения, гол.	8
10. Число маток, осеменяемых спермой одного оцененного барана, гол.	50
11. Ежегодный генетический прогресс (в расчете на 1 матку):	
- по живой массе, кг	1,27
- по настригу шерсти, кг	0,182
- по плодовитости, гол.	0,047
- по выживаемости, гол.	0,034