

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.В.05 Интенсивные технологии в овцеводстве и козоводстве

Направление подготовки 36.04.02 Зоотехния

Профиль подготовки Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

СОДЕРЖАНИЕ

1. Конспект лекций	3
1.1.Лекция-1	Современное состояние и основные тенденции в овцеводстве и козоводстве
1.2 Лекция -2	Породы овец и коз
1.3.Лекция-3	Понятие о шерсти. Формирование шерстной продуктивности
1.4.Лекция-4	Организация стрижки овец. Факторы влияющие на шерстную продуктивность
1.5.Лекция-5	Меховые, шубные и кожевенные овчины
1.6.Лекция-6	Показатели мясной продуктивности овец
1.7.Лекция-7	Молочная продуктивность овец и коз
1.8.Лекция-8	Племенная работа в овцеводстве и козоводстве
 2. Методические материалы по проведению семинарских занятий	 64
Семинарское занятие	
2.1. Семинарское занятие № С-1	Происхождение и биологические особенности овец
2.2. Семинарское занятие № С-2	Конституция, экстерьер и интерьер овец и коз
2.3. Семинарское занятие № С-3	Породы овец и коз
2.4. Семинарское занятие № С-4,5	Понятие о шерсти. Формирование шерстной продуктивности
2.5. Семинарское занятие № С-6	Классификация отечественной шерсти. Группы и виды шерсти
2.6. Семинарское занятие № С-7	Смушковая продукция овец
2.7. Семинарское занятие № С-8	Показатели мясной продуктивности овец
2.8. Семинарское занятие № С-9	Побочная продукция овцеводства
2.9. Семинарское занятие № С-10,11	Племенная работа в овцеводстве и козоводстве
2.10 Семинарское занятие № С-12	Методы разведения овец
2.11 Семинарское занятие № С-13	Организация и техника разведения овец
2.12 Семинарское занятие № С-14,15	Корм , кормление и содержание овец
 3.Методические материалы по выполнению лабораторных работ.....	 110.
3.1.Лабораторная работа № ЛР-1	Породы овец и коз
3.2.Лабораторная работа № ЛР-2	Понятие о шерсти. Формирование шерстной продуктивности
3.3.Лабораторная работа № ЛР-3	Классификация отечественной шерсти. Группы и виды шерсти.
ЛР-4	Классификация пуха коз
3.4.Лабораторная работа № ЛР-5	Организация стрижки овец. Факторы влияющие на шерстную продуктивность
3.5.Лабораторная работа № ЛР-6	Меховые, шубные и кожевенные овчины
3.6.Лабораторная работа № ЛР-7	Смушковая продукция овец
3.7.Лабораторная работа № ЛР-8	Методы разведения овец

1. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

1. 1 Лекция №1 (2 часа).

Тема: «Современное состояние и основные тенденции в овцеводстве »

1.1.1 Вопросы лекции:

1. Состояние и перспективы развития овцеводства в Российской Федерации
2. Состояние овцеводства в Оренбургской области.
3. Биологические особенности овец разных направлений продуктивности.

1.1.2 Краткое содержание вопросов:

1. Состояние и перспективы развития овцеводства в Российской Федерации и Оренбургской области.

Отрасль овцеводства в последние годы имеет положительную динамику развития. За последний год численность поголовья в хозяйствах всех категорий увеличилась более чем на 1 млн. голов и составила на 1 января 2013 года 23 млн. 861 тыс. голов.

Лидерами по численности овец и коз являются Северо-Кавказский, Южный, Приволжский и Сибирский федеральные округа.

Таблица 1

Федеральный округ	Поголовье овец и коз (тыс. голов)
Российская Федерация	23860,8
ЮФО	5945,5
СКФО	9434,2
ПФО	2928,5

По регионам: на первом месте - Республика Дагестан, на втором – Республика Калмыкия, на третьем – Ставропольский край. Лидер по численности поголовья в Сибирском регионе - Республика Тыва

В сельскохозяйственных предприятиях Российской Федерации разводят 39 пород овец, из них 14 – тонкорунные (численность – 2 млн. 544,8 тыс. голов или 59, %), 11 полутонкорунные (267,4 тыс. голов или 6,3 %), 2 – полугрубошерстные (29,5 тыс. голов, 0,7 %) и 12 – грубошерстные (1 млн. 241,2 тыс. голов, 29,1 %). За последние годы доля тонкорунных овец снизилась на 22 %, полутонкорунных – на 5,3 %, грубошерстных увеличилась на 23 %, появились полугрубошерстные овцы – 0,7 %.

Наиболее многочисленными породами являются: среди тонкорунных пород овец – дагестанская горная, грозненская, ставропольская, советский меринос и забайкальская; среди полутонкорунных – горноалтайская и цигайская; среди грубошерстных – карачаевская, тувинская короткожирнохвостая, андийская, эдильбаевская и лезгинская.

В сельхозпредприятиях Российской Федерации содержится 19,3 % общего поголовья овец и коз, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 33,6 %, в личных подсобных хозяйствах граждан – 47,1 % общего поголовья.

Потенциал наращивания численности овец и коз в таких регионах как Республики Дагестан и Калмыкия почти исчерпан, что связано с максимально допустимой нагрузкой на пастбища. Эти регионы превзошли по поголовью показатели советского периода.

В то же время есть целый ряд регионов, имеющих большой потенциал в наращивании поголовья овец и коз и возвращении или хотя бы приближении к тем показателям, которые они имели 20 – 30 лет назад.

В 2011 году хозяйствами всех категорий было произведено овец и коз на убой в убойном весе 189,0 тыс. тонн, в 2012 году – 190,1 тыс. тонн, то есть производство

баранины практически осталось на том же уровне.

Таблица 2 Производство овец и коз на убой в 2016 году

Регион	Производство овец и коз в убойном весе (тыс. тонн)
Республика Дагестан	28,7
Ставропольский край	20,4
Республика Калмыкия	16,8
Республика Татарстан	11,9
Астраханская область	9,4
Республика Башкортостан	9,0
Ростовская область	6,1
Республика Тыва	5,3

В соответствии с отраслевой целевой программой «Развитие овцеводства и в Российской Федерации на 2012 – 20147 гг. и на плановый период до 2020 года» к 2020 году производство овец и коз на убой в убойном весе должно составить 336,0 тыс. тонн.

Резервами для выполнения индикаторов программы являются: выход ягнят на 100 овцематок, их сохранность, привесы, применение технологических приемов, позволяющих проводить ранний и сверххранний отъем молодняка с его последующим интенсивным выращиванием и откормом; раннее использование овец для воспроизводства, инновационные технологии производства бройлерной ягнятины.

В настоящее время на базе ряда хозяйств Ставропольского края и Республики Калмыкия ведется работа по созданию новой породы овец – российского мясного мериноса. На российских выставках в Элисте и Москве племязавод «Вторая Пятилетка» уже представлял свои первые наработки по использованию производителей австралийского мясного мериноса, обладающего тонкой шерстью и ярко выраженными мясными формами, на матках ставропольской породы.

В тоже время недостаток перерабатывающих предприятий и отсутствие глубокой переработки овец в стране оставляет баранину в категории второстепенных видов мяса, поскольку не вызывает интереса у торговых сетей и ресторанного бизнеса, которые требуют лишь сортовые разruby в вакуумной упаковке, а не полутуши.

Не менее значимой продукцией овцеводства является шерсть.

В 2012 году в России (по предварительным данным) произведено 53000 тонн шерсти. Рост по сравнению с 2011 годом составил примерно 500 тонн.

Таблица 3

Производство шерсти	2015 г.	2016 г.	2017 г.
в физическом весе (тонн)	53521	52575	предварительно 53000
в мытом волокне (тонн)*	23976	23850	24380

Таблица 4 Производство различных видов шерсти в сельхозпредприятиях в 2015 году (количество овцепоголовья – 4,3 млн. гол., средний настриг – 2,2 кг в физ. весе, произведено шерсти – 9,5 тыс. тонн)

Вид шерсти	Количество (тонн)
тонкая мериносовая	7690
кроссбредная, цигайская и полутонкая	1380
полугрубая и грубая	810

Интерес переработчиков к отечественной шерсти проявился благодаря постановлению Правительства Российской Федерации № 269 от 3 марта 2012 года «Об установлении дополнительных требований к участникам размещения заказов при размещении заказов для нужд федеральных органов исполнительной власти», в соответствии с которым до 2014 года форма для федеральных органов исполнительной власти должна прошиваться из отечественных камвольных тканей.

Национальный союз овцеводов вышел с предложением о введении дифференцированного подхода при субсидировании овцеводческих хозяйств с целью стимулирования сельхозпроизводителей к производству качественного сырья для российской текстильной промышленности.

Создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители заинтересованных сторон от производителей и переработчиков шерсти.

Необходимо повысить роль науки в развитии овцеводства, создании новых пород и внутривидовых типов, разработке методических рекомендаций для сельхозпредприятий всех категорий, в том числе ЛПХ и КФХ, по всем имеющимся в России направлениям овцеводства, нет головного научного учреждения. Обеспечение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИИОКР, разработка новых национальных стандартов, регламентов, ГОСТов) должно вестись по следующим направлениям: разработка и внедрение высокоэффективных технологий производства; разработка и внедрение методов создания новых пород, типов и линий овец; разработка адаптивной системы кормопроизводства и кормления высокопродуктивных овец.

В развитии овцеводства и большую роль играет государственная поддержка, которая в 2013 году сохраняется в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.03.2013 № 339-р.

2. Состояние овцеводства в Оренбургской области.

В Оренбургской области распространено грубошерстное смушковое и мясо-сальное овцеводство. На Северном Кавказе особенно большое количество людей занято в отрасли овцеводства - к этому подталкивает наличие огромных территорий для выпаса овец и невысокий процент городского населения. После распада СССР в России традиционная отрасль животноводства переживала не лучшие времена. Но на данный момент в нашей стране предпринимаются шаги для возвращения овцеводства на прежний уровень. Уже сейчас поголовье овец увеличивается с высокой скоростью. Для этого находятся движущие силы. Во-первых, в стране есть все необходимые условия для данного вида деятельности, поэтому глупо ими не воспользоваться. Во-вторых, разведение овец повышает занятость населения. Появляется работа на заводах по обработке шерсти, мяса, овчины и других продуктов овцеводства. Поэтому поддержание данной отрасли выгодно для России в плане экономики. Многие страны импортируют шерсть, а Россия готова предоставить им этот продукт. С середины 2011 года цены на российскую шерсть на мировом рынке заметно увеличились.

Разведение овец является благом для экологии. На пастбищах, благодаря выпасу овец, совершается биологический круговорот. Это помогает сохранить земельные ресурсы нашей страны. Именно овцы приносят пользу земле, где другой рогатый скот уже не может прокормиться. Это обосновано неприхотливостью овец в выборе еды.

Состояние овцеводства в России за последние годы заметно улучшилось. На отечественном рынке возросли цены на баранину и шерсть, благодаря чему в сфере овцеводства появляются новые люди, а опытные овцеводы продолжают увеличивать поголовье овец в своем хозяйстве. Быстрыми темпами этот процесс происходит на юге страны. Овцеводство является рентабельным бизнесом, что объясняет возрождение этой отрасли в России.

3. Биологические особенности овец разных направлений продуктивности.

По разнообразию производимой продукции овцы занимают первое место среди сельскохозяйственных животных. Овцеводство обеспечивает народное хозяйство разнообразными и ценными продуктами: шерстью, шубными и меховыми овчинами, смушками, а также бараниной, салом, молоком.

Самая ценная продукция овцеводства - это тонкая шерсть. Только из нее изготавливают высококачественные текстильные материалы. Сортовой ассортимент козьей шерсти беднее, чем овечьей. Не существует пород коз с руном подобно мериновому, состоящему из одного пуха, или штапельного строения. Козий пух отличается от овечьего, а ангорская шерсть от сходной с ней кроссбредной некоторыми особенностями гистологического строения. Кожа коз более подвижна и эластична, она превосходит овчину по ряду физико-технологических свойств.

Овцеводство - важный источник производства мяса. Среднегодовое производство баранины в убойной массе составляет 6-7% от общего производства мяса в стране. Мясо молодых ягнят характеризуется диетическими свойствами и оптимальным соотношением жира и белка (17:17). По разному происходит у овец и коз жировотложение. Если для овец характерно хорошее развитие мышечной и подкожной жировой ткани, то у коз даже жирной и выше средней упитанности они развиты значительно слабее. При этом у коз на внутренних органах отлагается значительно больше жира, чем у овец. Баранина практически не подвергается туберкулезной инфекции и в большой степени свободна от поражения гельминтами.

Молоко овец отличается высокими питательными и диетическими свойствами. В нем в 1,5-2 раза выше содержание жира и белка, чем в коровьем, а также больше витаминов группы В. Из овечьего молока изготавливают сыры (брынза, рокфор, сулугуни и др.), молочнокислые продукты (айран, творог, мацони и др.).

Сальные железы кожи овцы продуцируют шерстный жир - ланолин, который является ценным и дорогим сырьем для легкой промышленности и для производства лекарственных мазей и косметических кремов. Из гладких мышц тонких кишок овец получают лучшие хирургические нитки.

Важная особенность домашних овец и коз - пластичность, изменчивость и огромный потенциал адаптивности к различным условиям. Благодаря этим особенностям оказалось возможным вывести многочисленные породы овец и коз, разводить их в различных экологических условиях - в зоне пустынь, высокогорий, степей и др.

По сравнению с другими травоядными сельскохозяйственными животными овцы, благодаря крепким конечностям могут использовать пастбища в сильно пересеченных местах (оврагах, балках, на горных склонах). Овцы и козы не только хорошо используют все типы пастбищ, но и неприхотливы к их качеству, поедают наибольшее количество растений, включая горькие, сильнопахнущие, колючие травы, в том числе и сорняки. Объясняется это не только физиологическими, но и анатомическими особенностями животных. Клинообразно заостренная лицевая часть головы, острые косо поставленные зубы и тонкие подвижные губы позволяют поедать низкорослую, изреженную растительность и даже на скудных пастбищах находить себе корм. Козы могут тщательно выбрать колоски, отдельные зерна и травинки на жнивье.

В экстремальных условиях во время перебоев в кормлении и поении овцы многих пород расходуют жир, отложенный в благоприятные в кормовом отношении периоды в теле, на хвосте, в курдюке. Эта ценная биологическая особенность помогает овцам преодолевать критические ситуации, особенно в зимний пастбищный период, когда выпадает много снега.

Хорошей приспособленности овец и коз к холоду и жаре в значительной степени способствует их шерстный покров. В холодное время года он надежно защищает организм от низких температур и порывов ветра, а в жаркий период - от чрезмерного перегрева и ожогов кожи, выполняя роль теплозащитной оболочки. При этом животные сами регулируют свое состояние по отношению к температуре окружающей среды, сбрасывая

шерстный покров (линька) с наступлением тепла. Такой процесс особенно развит у грубошерстных животных.

Овцы и козы характеризуются высокой хозяйственной скороспелостью, проявляющейся в производстве полноценной продукции в раннем возрасте. Так, баранину, козлятину, овчины можно получать от животных в возрасте 6-8 месяцев, пояровую шерсть - в 5 месяцев, смушки - в 1-3-дневном возрасте.

Ценной биологической особенностью овец и коз является ранняя половая зрелость животных. в 5-6-месячном возрасте они могут быть плодотворно осеменены. Но ранняя случка задерживает рост и развитие организма, поэтому в первую случку пускают животных в возрасте 12-18 месяцев.

Плодовитость овец большинства пород составляет 120-150%. Для овец и коз многих пород характерна сезонность в размножении - половая охота обычно проявляется осенью (сентябрь - ноябрь). Исключение составляют овцы романовской породы, финский ландрас, у которых утрачена сезонность в проявлении половой охоты. Продолжительность беременности маток в среднем составляет 5 месяцев (140-150 дней), период подсоса - обычно 3-4 месяца.

Овцы и козы могут жить 10-12 лет, но хозяйственное использование их обычно продолжается в течение 6-8 лет, после чего они выбраковываются, так как в этом возрасте ухудшается состояние зубов, что ведет к ухудшению использования кормов.

У овец развит инстинкт стадности, в связи с чем их содержат группами (отарами). Они пугливы, поэтому нежелательны частые осмотры, обработки, взвешивания животных.

Инстинкт стадности у коз развит меньше, поэтому они могут пастись поодиночке или небольшими группами. При содержании вместе с овцами стараются находиться впереди них.

Вместе с тем козы отличаются от овец по ряду биологических особенностей. Главнейшими из них являются различие диких предков и нескрещиваемость между собой овец и коз в естественных условиях. При искусственном осеменении коз спермой баранов, даже если образовывались зиготы, то через 25-55 дней они погибали, очевидно, по причине того, что овцы имеют 54 хромосомы, а козы - 60.

Козы отличаются от овец по ряду анатомических признаков. У козлов рога более плоские и сближенные у основания, имеющие в поперечном сечении форму треугольника, они спирально закручиваются вокруг вертикальной оси. У баранов форма поперечного сечения рогов ближе к квадратной, рога закручены вокруг горизонтальной оси. Скелет, мышцы и сухожильно-связочный аппарат коз, типично горных животных приспособлены к быстрому передвижению по крутым скалистым пастбищам.

К отличительным признакам коз относятся специфический голос, борода, короткий, голый с нижней стороны хвост и сережки, часто имеющиеся на шее.

1.2 Лекция 2 (2 часа) Конституция, экстерьер и интерьер овец

1.3.1 Вопросы лекции:

1. Понятие об конституции
2. Экстерьер овец
3. Кондиция овец и определение упитанности

1.2.2 Краткое содержание вопросов:

1 Понятие об конституции

Конституция животных зависит от наследственных свойств и факторов окружающей среды (кормление и содержание).

Овцы разных пород и направлений продуктивности существенно отличаются по конституции, так как имеют неодинаковое развитие костяка, мышц, кожи и пищеварительных органов.

У овец шерстного направления по сравнению с мясными и молочными относительно тяжелее кожа (12,9 %), кости и голова (15 %), а мяса у них меньше. У мясных животных, наоборот, сильно развиты показатели мясности (туша и внутренний жир – 59,6 %, мясо без костей – 43,7 %), а вес кожи составляет только 6,2 %, костей – 8,7 %. У овец молочного направления продуктивности очень сильно развиты внутренние органы (50,6 %), но слабо развиты кожа (7,0 %) и показатели мясности (туша и внутренний жир – 36,0 %, а мясо без костей – 25,0 %).

Развитие отдельных органов и тканей у овец различных пород и направлений продуктивности определяет в той или иной степени их конституциональные особенности. Наряду с этим в пределах каждой породы могут встречаться животные разной конституции.

Современные каракульские овцы в нашей стране по основным хозяйственно-полезным качествам делятся на три конституционально-продуктивных типа: крепкий, нежный и грубый.

Овцы крепкого типа по конституции, смушковой продуктивности и приспособленности к условиям зоны разведения являются лучшими в каракульской породе. Они имеют хорошо развитый, но негрубый костяк, тонкую и плотную кожу. Взрослые овцы в большинстве серого цвета. Шерсть средней длины – 812 см, достаточно густая, эластичная, собрана в косицы, распадающиеся в верхней части. Шелковистость и жиропотность шерсти хорошие. Основную массу шерсти составляют переходные волокна и ость средней толщины. Настриг шерсти выше, чем с овец нежного типа, и ниже, чем с овец грубого типа, и составляет за обе стрижки 2,5–3 кг. Весенняя шерсть по заготовительному стандарту в основном относится ко II классу.

Животные подвижны, хорошо используют подножный корм, легко переносят зимнее пастбищное содержание и быстро нагуливаются на пустынных пастбищах. Взрослые матки весят 40–45 кг. От овец крепкого типа относительно больше получают ягнят, шкурки которых относят к самой ценной жакетной группе, отличающейся хорошим блеском, шелковистостью и красивым завитком. Баранов этого типа используют для улучшения смушковой продуктивности и других ценных свойств в стадах других типов каракульской породы, а также при преобразовательном скрещивании с другими грубошерстными породами.

Овцы нежного типа подразделяются на два подтипа: нозык и крык. Овцы подтипа нозык имеют тонкий, но достаточно прочный костяк и относительно тонкую кожу. Шерсть густая, короткая, образует косицы наподобие штапеля. В шерстном покрове большей части овец этого подтипа преобладают пух и переходные волокна. У отдельных животных шерсть совершенно свободна от ости. Шерсть жиропотная, эластичная, преимущественно I класса. Поседение шерстного покрова наступает в раннем возрасте и в сильной степени. По выносливости и приспособленности к зимнему пастбищному содержанию эти животные уступают овцам крепкого и грубого типа. Ягнята от маток подтипа нозык часто имеют мелкий завиток, тонкую и недостаточно плотную кожу.

Овцы нежного типа подтипа крык характеризуются переразвитостью конституции. Туловище у них узкое и неглубокое, кожа тонкая и недостаточно прочная. Шерсть очень короткая с переразвитой извитостью, часто сухая. В шерстном покрове преобладают пух и переходные волокна. Стригут их раз в год весной, так как до наступления зимы шерсть не успевает отрасти на необходимую длину. По смушковой продуктивности овцы этого подтипа наименее желательны. Ягнята часто имеют недостаточно плотную тонкую кожу, сильно извитый вялый волос, завитки мелкого размера с различной деформацией.

Овцы грубого типа (ак-гуль) отличаются более грубым костяком, толстой, плотной или рыхлой кожей. Оброслость головы, брюха и конечностей рунным волосом часто

недостаточная. Шерсть грубая, с большим содержанием толстой, длинной ости и небольшим количеством короткого и очень тонкого пуха, собрана в крупные, слабоизвитые косицы, часто с сильным поседением. Шерсть маложиропотная или без жиропота.

Серые каракульские овцы (ширази) имеют большое разнообразие по цвету, но по своему качеству несколько уступают черным: у них длиннее волос, более крупные и рыхлые завитки, менее густая шерсть и утолщенная мездра. Овцы серой окраски среди цветных наиболее многочисленны. Такая окраска является сложной, она состоит из смеси волос черного и белого цвета. В зависимости от соотношения этих волос окраска меняется. Наиболее ценной является голубая и серебристая расцветка серых смушков. С возрастом серые овцы седеют и становятся почти белыми. Серый цвет сохраняет только кроющий волос головы и конечностей, по которому определяют масть взрослых овец. Конституция овец этой окраски характеризуется некоторой рыхлостью, у них более грубая кожа, меньшая густота, но большая длина шерсти и относительно более высокая требовательность к условиям кормления и содержания по сравнению с черными каракульскими овцами.

Овцы сур отличаются большим разнообразием смушков по окраске шерстного покрова. Методы разведения с целью получения ягнят с различными расцветками имеют свои особенности. Окраска сур у ягнят образуется в результате неравномерного отложения по длине волоса различного по цвету и интенсивности красящего вещества – пигмента. В настоящее время имеются овцы сур следующих основных типов: старый бухарский золотистый и серебристый, кызылкумский сиреневый, сурхан-дарьинский бронзовый, янтарный и платиновый.

Розовая окраска (гулигаз) обусловлена определенным соотношением в шерстном покрове волокон коричневого и белого цвета. Ягнят с такой окраской чаще всего получают от спаривания серых баранов, в потомстве которых встречаются животные с розовой или коричневой окраской, с матками коричневой окраски. Овцы коричневой окраски (комбар) большой хозяйственной ценности не представляют, поэтому в племенной работе и производстве каракуля особого значения не имеют.

2. Экстерьер овец

Экстерьер – внешние формы телосложения животных, которые являются одним из показателей их конституции, состояния здоровья, характера и уровня продуктивности.

Экстерьер оценивают по развитию отдельных статей животного, то есть частей тела, по которым судят о телосложении, выраженности породных и продуктивных свойств, конституциональных особенностях.

В практике применяют два основных способа оценки животных по экстерьеру. Глазомерную оценку экстерьера проводят по специально разработанным для отдельных пород овец шкалам. Шкалы обычно 100-балльные: каждая статья или их группа оцениваются (с учетом значимости) определенным числом баллов, сумма которых в лучшем варианте должна приближаться к 100. Более объективна по сравнению с глазомерной оценка экстерьера по промерам – показателям высоты, длины, ширины и обхвата отдельных частей тела животного. Промеры используют для вычисления индексов телосложения и экстерьерных профилей. Определенное значение при оценке экстерьера имеет фотографирование животных в возрасте бонитировки.

У овец чаще всего оценивают определенные статьи.

Голова может характеризовать многие особенности животных. Нормальная голова имеет отношение ширины к длине, равное $\frac{3}{8}$, что характерно для овец крепкой конституции. У овец грубой конституции голова короткая и широкая, соотношение между шириной и длиной – $\frac{4}{8}$. Голова, удлинённая за счет лицевых костей, суженная в

затылочной части, свидетельствует о нежной конституции, вышеуказанное соотношение при этом составляет $\frac{2}{8}$.

Стати овцы: 1 – рот; 2 – ноздри; 3 – морда; 4 – слезная ямка; 5 – лоб; 6 – глаза; 7 – рога; 8 – уши; 9 – холка; 10 – спина; 11 – поясница; 12 – крестец; 13 – хвост; 14 – лопатка; 15 – бок (ребра); 16 – окорок (ляжка); 17 – скакательный сустав; 18 – плюсна; 19 – мошонка; 20 – брюхо; 21 – копыта; 22 – бабка; 23 – запястье; 24 – соколок; 25 – плечо; 26 – шея

Горбоносость, особенно у баранов, – признак, характеризующий крепость конституции. Нежелательной является так называемая щучья голова с вдавленным профилем, подобное строение лицевых костей отмечается у овец нежной конституции.

Хорошо развитые рога у баранов – признак хорошо выраженного полового диморфизма и крепкой конституции. Наоборот, недоразвитые рога у баранов этих пород – показатель их конституциональной и половой слабости. Для маток желательна комолость.

По цвету кроющего волоса и оброслости головы можно определить породу и тип овец. Каракульские овцы во взрослом состоянии седеют, но кроющий волос на голове остается такого же цвета, как и при рождении. Поэтому можно определить по кроющему волосу, какого типа каракульская овца – араби (черная) или комбар (коричневая). По зубам можно определить возраст овец и конституциональную крепость. Толщина ушного хряща, бархатистость и тонина кожи на ушах – показатель типа конституции. Если уши слабо покрыты шерстью, тонкие, «просвечивающиеся» – это признак конституциональной ослабленности животного.

На зубы следует обращать особое внимание, так как в большинстве случаев, когда нет соответствующих записей, по их состоянию определяют возраст овец.

Костной основой спины является позвоночный столб. Спина должна быть прочной, так как к ней подвешены грудная клетка и брюшная полость с находящимися в них органами. Для овец всех направлений продуктивности желательна ровная широкая и длинная спина. Эти признаки определяют ее прочность. Узкая и провислая спина является пороком. Если такую спину имеют молодые животные, то это характеризует слабость их сложения или переразвитость.

Грудная клетка – место расположения таких важных органов, как сердце, легкие, главные кровеносные сосуды. Грудную клетку образуют: сверху – позвоночник, снизу – грудная кость (соколок), с боков – 13–14 ребер, сзади – диафрагма. При ее оценке измеряют глубину, ширину и длину. Для овец всех направлений продуктивности чем объемистее грудь, тем лучше. Узкая и неглубокая грудь – признак слабого здоровья и ослабленной конституции овец.

Брюхо у овец обычно объемистое, бочкообразное. Это объясняется тем, что органы пищеварительной системы у овец хорошо развиты. Для баранов нежелательно отвисшее брюхо, что часто наблюдается при однообразном кормлении их силосом и грубыми кормами.

Зад (круп) образуют тазовые и отчасти бедренные кости, а также крестцовые и частично хвостовые позвонки. Для овец всех пород наиболее желателен длинный, прямой и широкий круп. Свислый, короткий, узкий и острый (шилозадость) круп – существенные пороки экстерьера. В селекционной работе на устранение этих недостатков надо обращать серьезное внимание.

Конечности у овец должны быть крепкими и хорошо развитыми, особенно у животных горных и степных районов. Постановка конечностей должна быть правильной, суставы хорошо развиты и четко очерчены, бабки крепкие, но непровисшие, копыта блестящие, крепкие.

По состоянию и особенностям конечностей судят о развитии костяка и крепости конституции овец. О недостаточной крепости конституции свидетельствуют сближенность и искривленность ног, утонченность пясти. Конституционально крепкие, здоровые животные обычно имеют крепкие, хорошо развитые, правильно поставленные

конечности. Правильной постановку конечностей можно считать в том случае, когда точки опоры четырех конечностей, если их соединить линиями, образуют правильный прямоугольник. Иксообразная постановка передних и задних ног, саблистость, высоконоготь, особенно если она обусловлена наследственностью (является породным признаком), – экстерьерно-конституциональные недостатки, которые необходимо исправлять.

В современных условиях надо обращать внимание и на крепость копытного рога. Необходимо, чтобы он выдерживал длительные перегоны овец на сезонные пастбища и не повреждался при перегоне на большие расстояния.

У длинножирнохвостых овец хвост может быть прямой или изогнутой формы в виде латинской буквы S. Масса жира на хвосте достигает 15 кг.

Вымя – важная часть животных. При оценке обращают внимание на ее развитие, форму и размер сосков. Вымя должно быть объемистое, с хорошо развитыми сосками.

Половые органы необходимо наиболее внимательно оценивать у баранов. Для этого осматривают и прощупывают мошонку, семенники и препуций. Необходимым условием является наличие обоих семенников. Крипторхов, как односторонних, так и двусторонних, выбраковывают. Семенники должны быть одинаковой величины. При различной величине тестикул, наличии опухолей семенников, жидкости в мошонке, серьезных травм, зачервленности препуция бараны подлежат выбраковке.

Половой диморфизм у овец проявляется в том, что бараны крупнее, имеют хорошо развитые рога, более крепкую конституцию и более высокий настриг шерсти.

Возрастная изменчивость экстерьера овец весьма разнообразна: ягнята более высоконоги, у смушковых ягнят шерсть имеет красивые завитки, с возрастом шерсть каракульских овец седеет, прорастает пухом.

Главные признаки при оценке представителей овец смушковых пород: сухая конституция; хорошо развитый костяк и умеренно развитая плотная мускулатура; туловище глубокое, но плоское; конечности средней длины, с хорошо развитыми суставами, связками и копытами; кожа тонкая, плотная; шерсть грубая неоднородная, состоит из редких косиц.

Измерение статей тела и определение живой массы овец

О величине и формах статей тела, а также животных в целом можно судить по промерам, которые вносят объективность в экстерьерную оценку животных. Наиболее часто используют следующие промеры:

- высота в холке (от высшей точки холки до земли);
- высота в крестце (от высшей точки крестца до земли);
- косая длина туловища (от плечелопаточного сочленения до заднего выступа седалищного бугра);
- глубина груди (от холки до грудной кости);
- ширина груди в плечелопаточном сочленении (между левым и правым плечелопаточными сочленениями);
- ширина в моклоках (между самыми отдаленными точками моклоков);
- обхват груди за лопаткой (обхват груди на расстоянии ладони за лопаткой);
- обхват пясти (обхват в самом тонком месте пясти).

Высоту в холке, высоту в крестце, косую длину туловища, глубину груди измеряют мерной палкой; ширину груди, ширину в моклоках – циркулем; обхват груди, обхват пясти – мерной лентой.

Промеры берут при отбивке в возрасте 12 и 18 месяцев, а у взрослых животных – в возрасте 2–2,5 года и старше.

Для большинства пород желательными являются: длинное туловище при прямой спине; хорошо развитая в глубину и ширину грудь; правильная постановка конечностей; костяк крепкий, но не грубый; отсутствие явно выраженных признаков грубости, нежности; типичная для породы оброслость головы и ног.

При бонитировке овец учитывается их живая масса – важный хозяйственно-биологический признак. У овец большинства пород более высокая живая масса имеет положительную корреляцию с мясной и шерстной продуктивностью, с многоплодием. Высокая живая масса при прочих равных условиях – показатель конституциональной крепости животных.

Взвешивают животных индивидуально до кормления, упитанность их должна быть не ниже средней категории. Овец жирнохвостых пород взвешивают в 12-месячном возрасте. Живую массу, учтенную в другие возрастные периоды, пересчитывают на массу в возрасте, установленном для соответствующих пород овец. Живая масса взрослых овец определяется осенью перед случкой, ягнят – при отъеме их от матерей. Баранов-производителей взвешивают весной перед стрижкой и осенью – перед случкой.

Взрослых животных взвешивают с точностью до 1 кг, молодняк – до 0,5 кг.

3. Кондиция овец и определение упитанности

Под кондицией понимают состояние упитанности животного, т. е. степень развития и характер отложения жировой ткани. Упитанность устанавливают путем осмотра и прощупывания статей овцы, где в первую очередь откладывается жир: область соколки, спины, поясницы, крупа, корень хвоста, между ребрами.

При определении упитанности овец руководствуются следующими стандартными требованиями:

- высшая – мускулатура спины и поясницы хорошо развита, остистые отростки спинных и поясничных позвонков не выступают. Отложение подкожного жира хорошо прощупывается на пояснице, спине и ребрах;
- средняя – мускулатура спины и поясницы развита удовлетворительно, маклоки и остистые отростки поясничных позвонков немного выступают, а остистые отростки спинных позвонков выступают заметно, на пояснице прощупывается умеренное отложение подкожного жира; на спине и ребрах жировые отложения незначительны;

Определение упитанности овцы

- низсредняя – мускулатура развита плохо; остистые отростки спинных и поясничных позвонков и ребра заметно выступают. Холка и маклоки выступают очень заметно, отложение подкожного жира не прощупывается.

Для уточнения определения упитанности по экстерьеру применяют контрольный убой. Упитанность туши животного оценивают после снятия шкуры, при этом пользуются следующими разработанными требованиями (категориями):

- высшая – мышцы развиты хорошо, кости не выступают (за исключением остистых отростков позвонков в области холки); подкожный жир покрывает тушу, допускаются просветы в области холки;
- средняя – мышцы развиты удовлетворительно, подкожный жир покрывает тушу тонким слоем на спине и слегка на пояснице; на ребрах и области крестца и таза допускаются просветы;
- низсредняя – мышцы развиты неудовлетворительно, кости заметно выступают; местами имеется незначительное жировое отложение в виде тонкого слоя.

Выбор овцы при покупке

Существует глубокая связь между продуктивностью животных и их внешними формами, развитием основных тканей, органов и их функций, темпераментом. Каждая порода овец имеет свои продуктивные и биологические признаки, обусловленные условиями содержания. Чаще в личных подсобных хозяйствах разводят овец тех пород, которые рекомендованы для колхозов и совхозов планом породного районирования.

Целесообразно покупать молодых животных. Овец старше шести лет обычно забивают на мясо. Если животные приобретаются в племенных хозяйствах, их возраст устанавливается по записям в журналах или по татуировочному номеру на правом ухе, где

первая цифра является последней цифрой года рождения. Возраст овцы можно установить также по состоянию зубов.

При *осмотре* овцы необходимо обращать внимание на все части тела. Они должны быть пропорционально развиты, костяк крепкий, кожа плотная. Длинная узкая голова или тяжелая и грубая – признак слабой и недоразвитой конституции. У таких животных уши обычно тонкие, без шерстного покрова, просвечиваются. Грудная клетка должна быть широкая и глубокая, шея средней длины, холка невысокая. Спина, поясница и крестец ровные. Ноги у хорошей овцы прямые, широко поставленные, копытный рог прочный. Вымя большое, с двумя хорошо развитыми сосками.

При отборе овец следует обращать внимание на здоровье, костяк, развитие отдельных статей животного, так как высокую мясную, шерстную продуктивность могут иметь только здоровые животные с крепкой конституцией.

При отборе грубошерстных и полугрубошерстных пород **мясо-сального направления продуктивности** основное внимание уделяется их величине и крепости конституции, выраженности мясной продуктивности, размеру и форме курдюка. Ягнята в возрасте 4–5 месяцев должны иметь живую массу не менее 40–45, взрослые матки – не ниже 60–70 кг.

При выборе овец тонкорунных шерстно-мясных пород обращают внимание на показатели, определяющие уровень шерстной продуктивности и технологические свойства шерсти. Более крупные животные, с хорошей оброслостью брюха дают, как правило, больше шерсти.

Овцы шерстно-мясных пород, по сравнению с мясошерстными, имеют большую складчатость кожи. Однако многоскладчатым животным свойственна более короткая шерсть, огрубение ее на складках, повышенная жиропотность, большая требовательность к условиям кормления и содержания. Оптимальным для этих пород считается наличие 1–3 складок на шее и мелких складок (морщин) на туловище.

Оптимальная длина шерсти при стрижке раз в год – не менее 7 см. Такая шерсть идет по 1 классу по наивысшей закупочной цене.

Тонину шерсти в качествах определяют на глаз, при необходимости используя приготовленные в лабораториях эталоны. При отсутствии навыка в определении и образцов (эталонов) для сравнения можно приблизительно определить ее по извитости. Если на 1 см длины волокна 6 извитков, то такую шерсть можно отнести к 60 качеству, 7 – к 64 и 8 – к 70 качеству.

При выборе тонкорунных и полутонкорунных скороспелых овец мясо-шерстного направления наряду с шерстной продуктивностью обращают внимание на выраженность мясных форм.

У овец романовской породы наряду с крепостью конституции, шерстным покровом очень важно учитывать число ягнят. Этот показатель тесно связан с плодовитостью маток.

При отборе маток по многоплодию необходимо учитывать их молочность. Ее определяют путем выдаивания одной половины вымени при одновременном подпускании ягненка ко второй с последующим удвоением количества полученного молока или по приросту ягнят в первые 20–30 дней жизни, учитывая, что на каждый килограмм прироста затрачивается около 5 кг молока.

Более высокой молочностью отличаются матки в возрасте 4–5 лет. У 2-3-летних и старых (более 6 лет) продуктивность ниже. У маток с двойнями молочность на 20–25 % выше, чем у маток с одинами.

1. 3 Лекция № 3 (2 часа).

Тема: «Породы овец»

1.3.1 Вопросы лекции:

1. Классификация овец по зоологическим и производственно-хозяйственным

признакам.

2. Породное районирование овец в Оренбургской области.

3. Тонкорунные породы: грозненская, ставропольская, кавказская, южноуральская, алтайская, прекос.

1.3.2 Краткое содержание вопросов:

1. Классификация овец по зоологическим и производственно-хозяйственным признакам.

В овцеводстве принято подразделять породы овец по зоологическим и хозяйственно полезным признакам. В соответствии с этим различают зоологическую и производственную (хозяйственную) классификации. В основу зоологической классификации положены форма и длина хвоста у овец. Впервые эта классификация была разработана натуралистом Палласом и уточнена профессором Н. П. Чирвинским и академиком М. Ф. Ивановым. По форме и длине хвоста современных овец подразделяют на пять групп:

1) короткотошехвостые — романовская, северная короткохвостая и др.;

2) длиннотошехвостые — почти все тонкорунные породы, цигайская, все скороспелые мясные и др.;

3) короткожирнохвостые — бурятская и большинство сибирских неулучшенных грубошерстных овец;

4) длинножирнохвостые — каракульская и др.;

5) курдючные — гиссарская, эдильбаевская, сараджинская и др.

Вследствие большой изменчивости числа хвостовых позвонков, а также формы и размеров жировых отложений на хвосте эта классификация не имеет большого практического значения.

Производственная, или хозяйственная, классификация разработана академиком М. Ф. Ивановым. Она основана на степени выраженности важных хозяйственных признаков и наиболее полно отражает специализацию современных пород овец.

В зависимости от направления продуктивности породы овец в России подразделяют на следующие группы.

1. Тонкорунные: шерстные — советский меринос шерстного типа, ставропольская, сальская, грозненская; шерстно-мясные — асканийская, кавказская, алтайская, советский меринос шерстномясного типа, забайкальская, красноярская, южноуральская; мясо-шерстные — прекос, вятская, дагестанская горная.

2. Полутонкорунные: шерстно-мясные — цигайская; мясо-шерстные — русская длинношерстная, куйбышевская, острогожская, печерская, северокавказская, советская мясо-шерстная и др.

3. Овчинно-шубные: романовская, северные короткошерстные овцы.

4. Смушково-молочные: каракульская, сокольская, решетиловская, чушка, малич.

5. Мясо-сальные: эдильбаевская, гиссарская, джайдара.

6. Мясо-шерстно-молочные: балбас, тушинская, карабахская, лезгинская, карачаевская, имеретинская.

7. Мясо-шерстные: черкасская, кучугуровская, михновская и др.

Для лучшего использования природных и экономических условий и особенностей районов разведения овец в целях производства продукции овцеводства при наименьших затратах труда и средств, а также рационального использования природных ресурсов в стране разработан план породного районирования:

1) зона тонкорунного овцеводства — степные районы Северного Кавказа (Ставропольский край, Ростовская область), Калмыкия, Дагестан, Нижнее Поволжье, Западная и Восточная Сибирь; степные, сухостепные, горные и предгорные, пустынные и полупустынные районы юга;

2) зона тонкорунного и полутонкорунного овцеводства — Среднее Поволжье, Башкортостан и Татарстан, ряд центральных областей и отдельные районы Западной

Сибири;

3) зона преимущественно полутонкорунного мясо-шерстного овцеводства — центральные, северо-западные и северо-восточные области, горные и предгорные районы Северного Кавказа;

4) зона преимущественного шубного овцеводства — отдельные области Северо-Западного, Центрального, Волго-Вятского и Уральского районов;

5) зона мясо-шерстно-молочного овцеводства — отдельные регионы Северного Кавказа.

Овцеводство России представляет собой специализированную отрасль животноводства с богатым генофондом, насчитывающим около 30 пород и породных групп.

2. Породное районирование овец в Оренбургской области.

3. Тонкорунные породы: грозненская, ставропольская, кавказская, южно-уральская, алтайская, прекос.

Грозненская порода



В 1950 г. в республике Дагестан была успешно завершена работа по созданию грозненской породы овец. Биологической основой для ее выведения стали матки мазаевских и новокавказских мериносов, которых скрещивали с баранами австралийских мериносов. На сегодняшний день существуют два заводских типа породы - нагайский и калмыцкий.

Внешний облик этих животных приближен к австралийским мериносам, у них небольшое плотное туловище, легкий и прочный костяк. Бараны обыкновенно рогатые, а матки сплошь комолые. Присутствует умеренный запас кожи, выраженный во множестве маленьких складок по всему телу и одной продольной или одной-двух поперечных складках на шее. Высотный промер грозненских овец в среднем не превышает 62 см., косая длина туловища достигает 65 см., а обхват груди — 100 см. Живая масса маток составляет 48 - 55 кг., а баранов 80 — 105 кг. Мясные качества грозненской породы находятся на низком уровне, поскольку туши полновозрастных овец едва достигают 20 кг.

Грозненские овцы позднеспелые, их рост прекращается только в 3 года. Зато маток этой породы отличает высокая плодовитость, достигающая 140 ягнят.

Главное достоинство породы — белая шерсть высокого качества, отличающаяся извитостью и густотой. Так, на 1 кв.см. кожи насчитывают от 5100 — до 11200 шерстных волокон, при длине шерсти от 7,5 - до 13 см. У большинства овец тонина шерсти 64 качества (20,6 - 23,0 мкм.), у меньшего количества она 70 качества (18,1 — 20,5 мкм.) и у некоторых особей 58 качества (25,1 — 27,0 мкм.). У баранов тонина шерсти имеет 60 - 64 качество. Руно грозненской породы овец закрытое, штапельного строения. Наружный штапель дощатой, а внутренний цилиндрической (реже конической) форм. Жиропот в основном белый, изредка светло-кремовый. Содержание жиропота в шерсти - примерно 19 %. В среднем с овец получают по 7 кг. шерсти, а с баранов — по 17 кг. шерсти. Выход чистой шерсти составляет 40 — 50 %.

По статистическим данным за 2002 г. численность грозненской породы в России составляла 520,8 тыс. голов. Основное поголовье сосредоточено в Ставропольском крае РФ, а также республиках Калмыкия и Дагестан.

Ставропольская порода



В середине прошлого столетия на территории Ставропольского края селекционерами Советского Союза была выведена новая порода овец, названная в честь Ставрополя, и ставшая наиболее распространенной в нашей стране. Её создание стало возможным благодаря процессу скрещивания маток новокавказских мериносов с баранами рамбулье, а затем с австралийскими мериносами.

Ставропольская порода овец славится своей шерстью, достигающей до 16 см. длины, до 23 мкм. или даже 25 мкм. толщины (что соответствует 70 качеству), а также высокой густотой шерстного покрова (от 5800 — до 7900 шерстных волокон на 1 квадратный см. кожи). С овец получают от 7 – до 13 кг. шерсти, с баранов от 14 - до 25 кг. Выход чистой шерсти при обычных условиях разведения - примерно 50 %, а при содержании в племенных хозяйствах - до 62,5 %. Шерстный покров, как правило, белого цвета, равномерный по длине и толщине. Он хорошо свойлачивается, отличается крепостью, упругостью и красивым природным блеском. Руно имеет штапельное строение. Наружный штапель мелкоквадратной, квадратной или дощатой форм, а внутренний - преимущественно цилиндрической. Жиропот легкорастворимый светло-кремового или белого цвета.

Животные ставропольской породы невелики по размерам, для них характерно гармоничное телосложение и крепкий тип конституции. Спина ровная, умеренно длинная, крестец широкий и немного обвислый. Ноги крепкие и сухие, правильно поставленные в большинстве случаев. Кожа тонкая, но плотная. Матки почти всегда комолые, а бараны за редким исключением рогаты. Средние промеры овец в годовалом возрасте таковы: высота в холке - 62 см., высота в крестце - 63 см., косая длина туловища – 65 см., глубина груди – 26 см. и ширина груди 17 см., обхват груди - 87 см., обхват пясти - 8 см.

Овцы ставропольской породы отличаются значительной плодовитостью. При хороших условиях содержания на 100 маток рождается около 140 ягнят. Живая масса зрелых баранов в среднем составляет 100 - 120 кг. (лучшие особи могут достигать 146 кг.), а овец 50 - 60 кг.

Зонами разведения породы считают Ставропольский и Краснодарский края, Ростовскую, Оренбургскую и Воронежскую области, а также республики Башкортостан и Кабардино-Балкария. Ставропольских овец легко разводить в сухих степных районах, тем не менее, их численность неуклонно сокращается. Так, по данным за 1998 г. численность ставропольских овец в РФ составляла почти 891 тыс. голов, в 2000 г. 635,4 тыс. голов, а в 2002 г. - уже 619,1 тыс. голов.

В настоящее время ведется целенаправленная племенная работа со ставропольской породой, направленная на совершенствование шерстных качеств и ликвидацию изъянов экстерьера. Одним из результатов проделанного труда, явилось утверждение в 1996 г. нового заводского типа ставропольских овец - целинного. По качественным характеристикам шерсти полученных животных, этих овец приравнивают к австралийским мериносам.

Кавказская порода



Работа по созданию этой породы овец была завершена в Ставропольском крае РСФСР в 1936 г. Изначально породу называли кавказским рамбулье, поскольку в процессе выведения участвовали новокавказские мериносы, американский рамбулье и асканийские овцы. Кавказская порода овец завоевала популярность не только в России, но и в других странах (например, СНГ). В 1994 г. в породе был признан южно-степной тип овец, отличающийся высоким качеством шерсти и незначительным потреблением корма на 1 кг. прироста живого веса. Но деятельность по усовершенствованию качественных характеристик шерсти продолжается, а также по увеличению скороспелости животных. В нашей стране основным ареалом разведения данной породы считают Волгоградскую и Ростовскую области, Краснодарский и Ставропольский края. По статистическим данным за 2002 г. численность поголовья кавказской породы составила 305 тыс. овец.

Для кавказских овец характерен крепкий тип конституции и пропорциональное телосложение. Бараны обыкновенно рогатые, а матки - комолые. На шее присутствуют одна-три поперечные складки, и множество мелких по всему телу, однако, бывают случаи их отсутствия. Туловище округлое, продолговатое, холка немного приподнята над линией спины. Конечности крепкие, иногда неправильно поставленные. Вес взрослых баранов в среднем достигает 115 кг., а лучшие представители породы способны набрать даже до 173 кг. живой массы. Показатель среднего веса у овец составляет 66 кг., а некоторые особи могут весить 122 кг.

Шерсть кавказской породы овец белая, хорошо извитая и уравненная. Руно имеет штапельное строение, замкнутое снаружи, дощатое по форме. Жиропот в основном светло-кремовый, изредка белый. Длина шерсти у маток составляет около 8 см., а у баранов - 10 см. Тонина овечьей шерсти обыкновенно равна 20,6 — 23,0 мкм. (соответствует 64 качеству) и от 23,1 — до 27,0 мкм. (58 качества и 60 качества). С баранов удается получить примерно 9,5 кг. мытой шерсти, а с маток - 4 кг. Выход чистой шерсти эквивалентен 55 - 57 %.

У маток кавказской породы высокая плодовитость от 130 — до 150 ягнят. Среднесуточная молочность овец составляет 1,5 кг. молока с содержанием жира в 6,3 %. За 77-дневную лактацию удается получить примерно 115 кг. молока.

Южно-уральская порода



Южно-уральская порода была создана на территории современной Оренбургской области в 1948 - 1968 гг. Первоначально в скрещивании задействовали местных грубошерстных маток с баранами породы прекокс, а

затем цигайской, грозненской, кавказкой и ставропольской породами овец. В результате были выведены животные, хорошо приспособленные к климату юго-восточной России. Основное поголовье южно-уральской породы сосредоточено в Оренбургской области. В 2005 г. общая численность этих овец колебалась на уровне 12,5 тыс. голов.

Южно-уральские овцы крупные, с крепкой конституцией. Средний вес баранов держится на отметке в 90 кг., а маток - 53 кг. Бараны-производители достигают живой массы в 120 кг., а лучшие матки - 60 кг.

Белая шерсть южно-уральских овец хорошо извита и уравнена по руну. Руно замкнутое, штапельного строения. Жиропот светлых оттенков. Длина овечьей шерсти в среднем около 8 см., а бараньей - 9 см. Тонина шерсти у овец составляет от 20,6 - 25,0 мкм. (соответствует 60 – 64 качеству), у баранов она определяется 25,1 - 27,0 мкм. (58 качество). Шерстная продуктивность баранов в среднем около 12 кг., а овец - 5 кг. Выход чистой шерсти часто превышает 55 %

Алтайская порода



В 1948 г., после 20 лет селекционной работы, на территории современного Алтайского края РФ вывели породу тонкорунных овец, названную впоследствии Алтайской. Основой для ее создания послужили мазаевские и новокавказские мериносы, американский рамбулье, а также местные грубошерстные матки. Полученные помеси усовершенствовали кавказкой породой овец и австралийскими мериносами.

Алтайским овцам присущ крепкий тип конституции. У них вытянутое туловище и ровная линия спины. Грудь широкая и глубокая, костяк достаточно развит, крестец слегка обвислый. Запас кожи выражен в складках на шее и мелких морщинах на теле.

Овцы алтайской породы обладают повышенной плодовитостью, принося обычно от 150 — до 165 ягнят на 100 маток. 4-х месячные ярочки достигают массы тела более 28 кг. Взрослые матки в среднем весят до 65 кг. (но, бывают и 120 кг. особи), зрелые бараны легко достигают 125 кг. (рекордный показатель веса - 155 кг.).

Шерсть алтайской породы овец белая, с мелкой извитостью, уравненная по руно. Руно штапельного строения, верхушки штапелей плотно прилегают друг к другу. Жиропот белый или светло-кремовый. Длина шерсти составляет от 7 - до 10 см. Плотность шерсти в среднем почти 6 тыс. шерстинок на 1 кв. см. кожи. Толщина овечьей шерсти преимущественно 20,6 - 23,0 мкм. (соответствует 64 качеству), реже - 23,1 - 25,0 мкм. (60 качество), и незначительное количество - 18,1 - 20,5 мкм. (70 качество). Тонина бараньей шерсти такова: 20,6 - 25,0 мкм. (60 - 64 качество) и отчасти 25,1 - 27,0 мкм. (58 качество). С маток в среднем настригают 6 – 7 кг. шерсти, а с баранов 12 - 14 кг. Выход чистой шерсти достигает 42 %.

Алтайскую породу овец разводят Башкирии, Челябинской области и, конечно, Алтайском крае. В целом, в 2002 г. поголовье алтайских овец составило чуть более 177 тыс. голов. Продолжаемая племенная работа с породой нацелена на повышение стойкость жиропота и достижение уравненной шерсти.

1. 3 Лекция № 4,5 (4 часа).

Тема: «Понятие о шерсти. Формирование шерстной продуктивности»

1.3.1 Вопросы лекции:

1. Строение кожи.
2. Образование шерстяного волокна.
3. Рост и линька шерсти.

1.2.2 Краткое содержание вопросов:

1. Строение кожи.

Масса кожи составляет около 5 % живой массы овцы, а строение кожи овец и ее нормальное функционирование во многом определяют как количество, так и качество производимой шерсти. Вот почему, образно говоря, кожа является той основой, на которой растет шерсть, а потому, чтобы знать, как устроена кожа, нужно понять, как растет шерсть. Кожа состоит из трех основных слоев: эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки.

Эпидермис - верхний слой кожи. Он состоит из 3...4 слоев отмирающих роговых клеток на поверхности и одного ряда подстилающих ростковых клеток в нижней части - ростковый (мальпигиев, базальный).

Поверхностные слои представлены плоскими, горизонтально вытянутыми крупными клетками, а ростковый составлен из более или менее цилиндрических клеток. Наиболее близко располагающиеся к поверхности кожи клетки подвержены процессу кератизации, приводящему к слущиванию ороговевших и потому отмерших поверхностных клеток.

Эпидермис несет защитные функции. Он предотвращает излишнее испарение воды с поверхности кожи и проникновение в кожу вредных веществ. Толщина эпидермиса у овец сравнительно небольшая - 15...35 мм. У пигментированных овец внутри росткового слоя располагаются меланобласты, содержащие меланин.

Дерма - средний слой кожи. Она состоит из эластичных соединительнотканых коллагеновых волокон. В ней различают пилярный (сосочковый, занимающий до 70 % толщины всей дермы) и ретикулярный слои.

В первом располагаются волосные фолликулы, из которых растет шерсть, потовые и сальные железы, кровеносные и лимфатические сосуды, окончания нервных волокон. Ретикулярный слой, лежащий под пилярным, образован переплетением пучков коллагеновых волокон, обеспечивающих плотность дермы.

Иногда в коже различают только два слоя: эпидермис и дерму. Такое деление имеет право на существование, поскольку подкожная клетчатка, являясь важным жировым депо, меняет свои размеры в зависимости от условий питания животного.

Толщина дермы составляет 2300...3500 мкм. Начиная с 70-дневного возраста, у эмбрионов обнаруживается дифференциация дермы на пилярный и ретикулярный слои. К ретикулярному слою примыкает подкожная клетчатка, состоящая из рыхлой соединительной ткани. Толщина этого слоя кожи непостоянна и зависит от упитанности животного. Подкожная клетчатка обеспечивает связь кожи с глубже лежащими тканями и ее подвижность.

Толщина кожи и ее отдельных слоев варьирует в широких пределах у овец разных пород, по сезонам года и у отдельных животных. Она изменяется с возрастом и в зависимости от физиологического состояния животного.

2. Образование шерстяного волокна.

Шерсть - это волосной покров животных: овец, коз, верблюдов. Основную массу шерсти (95-97 %) дают овцы. Шерстяной покров снимают с овец специальными ножницами или машинками. Длина шерстяных волокон от 20 до 450 мм. Состригают почти цельной неразрывной массой, которая называется руном.

Виды шерстяных волокон - это волос и шерсть, они длинные и прямые, и пух - он более мягкий и извитый.

Перед отправлением на текстильные фабрики шерсть подвергают первичной обработке: сортируют, то есть подбирают волокна по качеству; треплют - разрыхляют и удаляют засоряющие примеси; промывают горячей водой с мылом и содой; сушат в сушильных машинах. Затем изготавливают пряжу, а из нее ткани.

В отделочном производстве ткани красят в различные цвета или наносят на ткани различные рисунки. Ткани из шерсти вырабатываются гладкокрашеными, пестроткаными и напечатанными.

Шерстяные волокна имеют следующие свойства: обладают высокой гигроскопичностью, то есть хорошо впитывают в себя влагу, упругие (изделия мало мнутся), стойкие к воздействию солнца (выше, чем у хлопка и льна).

Чтобы проверить шерстяное волокно, надо кусочек ткани поджечь. Во время горения волокно шерсти спекается, образовавшийся спекшийся шарик легко растирается пальцами. В процессе горения ощущается запах жженого пера. Таким путем можно определить ткань: чистая это шерсть или искусственная.

Из шерстяных волокон изготавливают платьевые, костюмные и пальтовые ткани. В продажу шерстяные ткани поступают под такими названиями: драп, сукно, трико, габардин, кашемир и др.

Существует несколько видов бабочек, гусеницы которых перед превращением в куколки выют коконы, используя выделения из специальных желез. Таких бабочек называют шелкопрядами. В основном разводят тутового шелкопряда.

Шелкопряды развиваются в несколько стадий: яйцо (грена), гусеница (личинка), куколка и бабочка. Гусеница развивается 25-30 дней и проходит пять возрастов, разделяемых линьками. Ее длина к концу развития достигает 8, а толщина 1 сантиметра. В конце пятого возраста шелкоотделительные железы гусениц заполняются шелковой массой. Шелковина - тонкая парная нить из белкового вещества фиброина - выдавливается в жидком состоянии, а затем твердеет на воздухе.

Образование кокона длится 3 дня, после чего происходит пятая линька, и гусеница превращается в куколку, а через 2-3 недели в бабочку, которая живет 10-15 дней. Бабочка-самка откладывает грёну, и начинается новый цикл развития.

Из одной коробки грёны массой 29 граммов получают до 30 тысяч гусениц, съедающих около тонны листвы и дающих четыре килограмма натурального шелка.

Для получения шелка естественный ход развития шелкопряда прерывают. На заготовительных пунктах собранные коконы подсушивают, затем обрабатывают горячим воздухом или паром, чтобы предотвратить процесс превращения куколок в бабочек.

На шелковых предприятиях коконы разматывают, соединяя вместе несколько коконных нитей.

2 Рост и линька шерсти.

Растущей, живой, частью волоса, как уже было сказано, является нижняя часть его корня - луковица. Клеточки луковицы питаются за счёт крови, протекающей по разветвлениям кровеносных сосудов кожи в месте её сращения с луковицей. По мере поступления питательных веществ клеточки луковицы растут и размножаются путём деления. Каждая клеточка, вновь образовавшаяся после деления старой, начинает расти, а выросши, образует молодые, новые, клетки. Отсюда следует, что как самый рост, так и скорость роста клеток луковицы обуславливают размеры волоса в длину и толщину. А так как рост клеток зависит от притока к ним питательных веществ, то и на рост шерсти на животном оказывает непосредственное влияние приток питательных веществ к коже, т. е. питание организма животного.

Это имеет большое практическое значение. Зная, что рост шерсти зависит от питания кожи, становится понятным, почему при различного рода заболеваниях овец у них замедляется или полностью прекращается рост шерсти, в результате чего больные

овцы иногда даже линяют. Это значит, что вследствие болезни питание кожи сильно нарушилось или практически почти полностью прекратилось. Наоборот, при хорошем кормлении шерсть растёт лучше. Всем известно, что летом на хороших пастбищных кормах шерсть после стрижки отрастает очень быстро.

Рост шерсти, таким образом, тесно связан со всем состоянием организма овцы. Поэтому, чем сильнее изменения в состоянии организма, тем больше они замедляют или ускоряют рост шерсти, изменяют свойства самого шерстяного волокна.

Очевидно, что замедление роста шерстяных волокон вызовет! укорочение их в длину. Одновременно недостаток питательных веществ вызовет неполное развитие клеточек волоса в их размерах как по длине, так и в толщину. Следовательно, и весь волос получится недоразвитым как по длине, т. е. будет укороченным, так и в толщину, т. е. произойдёт утонение шерстяного волокна.

Кроме болезней и недокорма, небольшую задержку роста шерсти вызывает при неправильно организованном кормлении суятность маток и подсосное выращивание ими своих ягнят.

Утонения шерсти, получающиеся вследствие недокорма и болезней известны под названиями: "переследы", "уступы", или "перехваты", а также называются "голодной" тониной (см. ниже о тонине шерсти).

Недостаток питательных веществ может привести к прекращению роста того или иного количества волос. В результате этого происходит выпадение из кожи таких прекративших рост шерстяных волокон. Происходит явление, похожее на весеннюю линьку у грубошерстных овец. Шерстный покров овцы делается более редким. Известно, что при некоторых сильных заболеваниях овцы теряют свою шерсть целыми пучками, на теле овцы получают плешины, а иногда даже почти всё туловище животного оголяется.

Весенняя естественная линька волосяного покрова свойственна диким животным, а также крупному рогатому скоту, лошадям, большинству пород коз и грубошерстным породам овец. Весенняя, естественная, линька заключается в том, что к отдельным шерстяным волокнам в коже прекращается приток питательных веществ. Поэтому рост таких волокон останавливается, связь их корней с кожей нарушается (рис. 8 см. вклейку в конце книги).

Эти волокна можно сравнить с деревьями, у которых погибли корни и такие деревья не могут прочно удерживаться в почве. Подобно им и волосы, питание которых прекратилось, начинают постепенно выпадать из кожи. Этому способствуют продолжающие расти, нелиняющие, волокна. Они тянут за собой находящиеся вперемежку с ними линяющие волокна. Тонкорунные и полугрубошерстные овцы не имеют сезонных линек в течение года. У них может быть линька только в связи с сильным недокормом или болезнями.

Естественная линька у грубошерстных овец в различных географических зонах бывает обычно в различное время, но всегда весной, при наступлении тёплой погоды, преимущественно начиная с конца апреля. Из хозяйственной практики хорошо известно, что при запоздании с весенней стрижкой у грубошерстных овец поочередно происходит частичная потеря шерсти вследствие её линьки. Если грубошерстную овцу оставить весной неостриженной, то в течение летних месяцев значительная часть шерсти, преимущественно за счёт её пуховых волокон, в результате линьки выпадет из шерстного покрова и в виде отдельных клочков затеряется на пастбищах, на изгородях и на стенах помещений, о которые обычно чешутся линяющие овцы.

В связи с линькой в овцеводстве известно явление "подрунивания" овец. Подруниванием называется такое состояние шерстного покрова (руна) овцы, когда непосредственно у поверхности кожи шерсть не такая густая, как это было до подрунивания. При более внимательном рассмотрении пучков шерсти можно обнаружить, что волокна у поверхности кожи более или менее значительно утонены. Всё это получается в самом начале линьки. В это время шерстяные волокна за единичными

исключениями ещё не выпадают из руна, но в результате прекращения питания линяющих волокон связь их с кожей уже ослаблена, в своих нижних частях они утонены. При этом весной, к концу зимнего содержания и кормления овец, питание и всех остальных волокон тоже несколько ослаблено, хотя и не так сильно, как у линяющих.

Всё это и приводит к тому, что шерсть у поверхности кожи в начале её линьки имеет утонение, а линяющие волокна в это время уже потеряли связь с кожей и многие из них удерживаются в шерстном покрове лишь растущими волокнами. Такое ослабление связи шерстного покрова с кожей овцы и её утонение у поверхности кожи позволяют более легко работать ножницами при стрижке овцы. Поэтому стрижку овец обычно приурочивают к тому времени, когда у них начинается подрунивание шерсти.

В производственном отношении считается с фактом сезонной линьки весьма важно, поскольку при несвоевременной стрижке овец происходит большая потеря шерсти. В результате селекции сезонная линька у тонкорунных овец отсутствует, а потому шерстинки «живут» относительно долго - несколько лет. Рост и смена (линька) шерсти происходит в результате деления и роста клеток луковицы. Из того же сосочка вместо выпавшего волоса начинает развиваться новый волос, что в конечном итоге и называется линькой.

Различают следующие виды линьки у овец: возрастная (ювенальная), сезонная, непериодическая и патологическая. Возрастная (ювенальная) линька выражается в том, что у ягнят после рождения постепенно выпадает грубый волос (песига), образовавшийся из первичных фолликулов, а вместо него появляется обычный пух. Не имеющая никакого практического значения перманентная линька у тонкорунных овец заключается в постепенном и незаметном выпадении отмерших шерстинок и замене их новыми. Несмотря на то, что у овец этих пород не бывает весенней линьки, в шерстном покрове происходят изменения, которые называются созревaniem руна и выражаются в увеличении количества жиропола, после чего шерсть становится маслянистой, мягкой и потому ее легче стричь. У ягнят грубошерстных пород овец возрастная линька практически не обнаруживается.

Сезонная линька характеризуется выпадением в весенний период значительного количества пуховых волокон и переходного волоса с последующей их заменой новыми пуховыми волокнами к поздней осени и зиме. В меньшей степени этому подвергается мертвый волос, в то же время ость почти не линяет. Сезонная линька наблюдается у большинства грубошерстных пород и протекает неодинаково. У тонкорунных овец сезонной линьки нет. Наиболее типичной она является для диких животных, поскольку носит характер типичного биологического процесса, выработавшегося в естественных условиях существования как одно из терморегуляторных приспособлений к сезонным климатическим изменениям в течение года. Низкий уровень питания овец может быть причиной задержки нормального процесса сезонной линьки, а в случае продолжительного голодания естественной линьки не бывает, а происходит при этом патологическая линька - облысение.

Непериодическая (перманентная) линька характеризуется сменой закончивших свой рост отдельных шерстных волокон вне связи с возрастом животных и сезоном года и происходит она незаметно. В связи с тем, что ежегодная стрижка тонкорунных и полутонкорунных овец и двукратная в году грубошерстных пород овец не дает возможности шерстным волокнам полностью закончить рост, то непериодическая или сезонная линька не наступает.

Патологическая линька бывает у овец любого направления продуктивности и может быть следствием тяжелых стрессов или заболеваний, приводящих к резкому расстройству обмена веществ и питания кожи, приносящая в конечном итоге огромный экономический ущерб. При этом шерсть выпадает с отдельных участков кожи, а в тяжелых случаях - со всей поверхности туловища.

Вследствие линьки у грубошерстных пород при запаздывании с их весенней

стрижкой происходит частичная потеря шерсти. Неостриженные грубошерстные овцы в весенний период могут до осени потерять значительную часть шерсти прямо на местах ее соприкосновения (изгороди, помещения, пастбища и пр.). Состояние шерстного покрова (руна), при котором его связь с кожей значительно ослаблена, называется особым термином - «подрунивание», основными причинами которого являются утонения большинства волокон в их нижней части, у поверхности кожи, и выпадение некоторых волокон. Это по сути является начальной стадией линьки. В этот период выпавшие из кожи волокна удерживаются в руне, а в это же время растущие волокна по мере роста отодвигают их от поверхности кожи, что создает относительно меньшую густоту шерсти у поверхности кожи по сравнению с той, которая была до подрунивания. Такое ослабление связи шерстного покрова с кожей в сочетании с утонением шерсти у поверхности кожи значительно облегчают работу стригалы. Вот почему стрижку овец обычно приурочивают к началу периода подрунивания шерсти.

1.3.2 Краткое содержание вопросов:

1. 4 Лекция № 6 (2 часа).

Тема: «Организация стрижки овец. Факторы влияющие на шерстную продуктивность»

1.4.1 Вопросы лекции:

1. Подготовка к стрижке.
2. Способы стрижки овец.
3. Основные принципы классификации шерсти.

1.4.2 Краткое содержание вопросов:

1. Подготовка к стрижке.

За 12-14 часов перед стрижкой овец ставят на голодную выдержку. Баранов-производителей с высокой упитанностью ставят на более продолжительную голодную выдержку. Голодная выдержка обязательна для всех овец, поскольку накормленные овцы плохо переносят стрижку, у них случается заворот кишок.

У хорошо упитанных овец поверхность туловища более ровная, плотная кожа, поэтому стричь таких овец намного проще, чем плохо упитанных. Машинка хорошо двигается по шерсти и хорошо ее срезает, не оставляя ранок. Овцы низкой упитанности имеют неровную поверхность тела и рыхлую кожу. Стричь овец низкой упитанности довольно сложно. Шерсть состригается с большим трудом, часто возникают порезы кожи. При любых порезах кожи, ее необходимо обработать специальными дезинфицирующими растворами.

Важно помнить, что шерсть должна быть чистой, незасоренной. Чистая, незасоренная шерсть состригается ровно и близко к коже. А при стрижке овец с засоренной шерстью очень быстро тупятся гребенки и ножи. Важно постоянно следить за чистотой шерсти овец, оберегать ее от загрязнения и засорения.

2. Способы стрижки овец.

Овец к стрижке готовят заблаговременно. Для того, чтобы предохранить шерсть от загрязнения экскрементами, ягнятам тонкорунных и полутонкорунных пород обрезают хвосты в возрасте 1.5 - 2 месяцев.

Помещение, в котором проводят стрижку овец, должно быть светлым и сухим. Его очищают от навоза и дезинфицируют.

Овец стригут на специально подготовленных столах (шириной 1.5 м, длиной 1.7 м и высотой 40 - 50 см), на брезенте (предохраняет шерсть от загрязнения и потерь) или на деревянном полу. Качество настригаемой шерсти зависит от квалификации и мастерства стригалы.

Наиболее распространенный дефект стрижки - это уменьшение длины шерсти. Это происходит в том случае, когда стригаль делает срез шерсти не у основания штапеля, а выше. Шерсть при этом получается искусственно укороченной, а это в свою очередь снижает ее стоимость и наносит убыток.

Способов стрижки овец существует всего два: ручной (ножницами) и электромеханический (машинкой).

Стрижка машинкой имеет несколько преимуществ перед стрижкой ножницами. В первую очередь облегчается труд стригаль и повышается его производительность.

Во - вторых, качество шерсти получается лучше, потому что руно состригается ближе к коже и ровнее, в результате чего шерсть получается более длинной. Особенно это касается тонкой шерсти, у которой классность и цена зависят от длины.

Для индивидуального использования существуют электростригальные машинки ЭСА - 1Д. При стрижке овец нужно следить, чтобы зубья гребенки всегда соприкасались с кожей. Нельзя два раза проходить машинкой по одному и тому же месту, потому что получается сечка, снижающая качество рунной шерсти.

Шерсть, состригаемую с брюха, ног и охвоста собирают и упаковывают отдельно от рунной.

3. Основные принципы классификации шерсти.

Классификация шерсти. Существующие в мире классификации условно можно разделить на три группы: сельскохозяйственная, торговая и техническая. Самым ценным свойством шерсти является ее тонина, поэтому все классификации в своей основе делят шерсть на классы по тонине.

Сельскохозяйственная классификация шерсти представляет собой предварительную подготовку шерсти для промышленной переработки. В различных странах она различна. Но в большинстве стран при сельскохозяйственной классификации основное внимание уделяется тонине, длине и степени засоренности шерсти. Каждому классу присваивается свое наименование или буквенное обозначение.

В СНГ шерсть делят на классы (по длине), подклассы (по тонине), по цвету и состоянию (прочности и засоренности). В США шерсть разделяют на классы в зависимости от прилития крови.

Наиболее распространенной являлась английская (брэдфордская) система классификации для однородной шерсти, которая существует более 100 лет. По этой системе шерсть подразделяют в зависимости от тонины на технологические качества 100, 90, 80 и т. д. Дробные качества, например 64/70, означают, что качество шерсти, указанное в числителе, преобладает в шерсти над качеством, указанным в знаменателе в соотношении 60:40.

В настоящее время под номерами технологического качества в Англии понимают комплекс показателей, определяемый в основном интервалами тонины и уравниваемостью. Уравниваемость определяется на глаз при осмотре шерсти специалистами.

Австралийская корпорация шерсти (АКИШ) рекомендовала овцеводам делить мериновую шерсть на три группы: фэйн (тонкую) со средней тониной не более 17 мкм, медиум (среднюю) со средней тониной до 21 мкм, стронг (грубую) со средней тониной до 25—27 мкм. На три группы также делится кроссбредная шерсть.

В каждой однородной отаре (стаде) рекомендуется независимо от тонины шерсти выделять и маркировать:

- для мериновой шерсти АААМ — самый большой основной ассортимент рунной шерсти, ВВВ — наименьший ассортимент грубой шерсти, АМ — наименьший ассортимент короткой шерсти;
- для кроссбредной шерсти АААФХ — тонкую рунную шерсть, ЛААМХ — среднюю рунную шерсть, АААСХ — грубую рунную шерсть.

Короткая кроссбредная шерсть маркируется с одной буквой А, соответственно:

AFX, AMX и ACX.

Расклассированная на ферме по такой схеме шерсть продается или передается АКШ для подготовки к продаже. В последнем случае измеряют среднюю тонины каждого промышленного сорта шерсти, определяют выход, содержание сора, длину.

Одной из главных причин введения в прошлом показателей качества тонины шерсти с широким интервалом тонины и обязательным приложением эталонов этих качеств было отсутствие экспресс-методов определения тонины шерсти. В связи с применением объективных методов оценки шерсти АКШ разработала торговую классификацию шерсти на основе ее тонины, отказавшись от технологических качеств.

Перечень австралийской шерсти включает от 1 до 700 типов и разделяется на мериновую рунную шерсть, включая тонкий кроссбред; мериновую шерсть кусковую и обор; кросс-бредную рунную шерсть с включением грубого мериноса (типы 413—444, тониной 25—27 мкм); на кроссбред кусковый и обор; короткую мериновую шерсть для французского пряжения; ягнячью рунную шерсть и т. д. В табл. 1 показаны типы рунной шерсти для гребенного пряжения (108 типов), а в табл. 2 — типы мериновой короткой, кусковой шерсти и обора (59 типов).

В торговой классификации в основном используют объективные показатели. Однако в ней временно сохранен еще традиционный принцип деления шерсти на стили. Под стилем понимается комплекс субъективных характеристик, определяющих главным образом выход гребенной ленты или отношение ее массы к массе очесов. Чем лучше стиль, тем больше выход гребенной ленты. Если шерсть имеет пониженную прочность, большую вымытость верхушки, рыхлый штапель, в который глубже проникают пыль и сор, то из такой шерсти будет меньший выход гребенной ленты. Обычно такую шерсть относят к стилю Хорошая. Чаще к этому стилю относится шерсть западных и южных районов Австралии, которая менее однородна и имеет большее стандартное отклонение по тоне, хотя и в штапеле она равномерна, но по длине волокна диаметр изменяется значительно. При отгрузке из этих районов перед номером контракта ставится буква F. Шерсть стиля Средняя для гребенной ленты — это ослабленная и пожелтевшая рунная шерсть. Шерсть стилей Превосходная и Высшая является супертонкой шерстью. Ее получают с чистопородных саксонских мериновых овец; она имеет белый жиропот, очень плотный штапель, малую осушенную верхушку, мало загрязнений по глубине штапеля, равномерную тонины по длине волокна и малые вариации между волокнами по тоне. Она предназначена для выработки пряжи низкой линейной плотности (15—11 текс) при сверхвысоких скоростях пряжения. Поэтому для этой шерсти в классификации еще сохраняется деление на технологические качества. Производство такой шерсти в Австралии незначительно и с каждым годом снижается. Больше всего производится мериновой шерсти стилей Отличная и Хорошая для гребенной ленты (тонины 21—23 мкм).

Типы шерсти разделяют на группы по засоренности (см. табл. 1). Обычно засоренность растительными примесями обозначается буквами: B = 1 ... 3 %; C = 3 ... 7 %; D = 7 ... 12%. Растительные семена обозначают: S = 1 ... 3 %; L = 3 ... 7%.

В австралийской торговой классификации отсутствует цифровое деление шерсти по длине. Так, шерсть средней длины штапелей в партии A — самая длинная, длины B — короче и длины C — еще короче. Все типы, приведенные в табл. 1, рекомендуются для гребенного пряжения основы, а все типы табл. 2 — для гребенного пряжения утка и имеют длину примерно от 38 до 63 мм.

Еще Т. И. Кузнецовым в СНГ была показана прямая корреляционная связь между тониной и длиной шерсти [1]. На этом же принципе построена классификация АКШ по длине. Чем тоньше шерсть, тем она короче. Так, шерсть длиной A и тониной 19 мкм будет иметь среднюю длину штапелей в партии шерсти около 85 мм, а шерсть тониной 21 мкм — около 100 мм.

Таким образом, например, тип 71 аналогичен по длине типу 55, но в нем могут

быть цветные волокна или больше пожелтевшей шерсти или шерсть больше загрязнена. Типы 66, 83, 97 имеют одинаковую длину С и будут короче, чем тип 87 с длиной А. Но типы 87 и 97 более низкого качества, чем тип 83, который более низкого качества, чем тип 66. Если определили, что тонина шерсти 21 мкм и стиль ее — Отличная для гребенной ленты, то, если ее длина 100 мм, она попадет в тип 56, если 80 мм — в тип 62, если 62 мм — в тип 67, а если еще короче, то уже в тип 120р. Тип 141 имеет среднюю длину волокон 66—68 мм, типы 158 и 162 — около 58 мм, а тип 170 — около 44 мм; шерсть этих типов должна отличаться только длиной. Указанное в табл. 1 и 2 деление шерсти по тонине в 1 мкм следует понимать как интервалы. Например, 18, 19, 20 мкм соответственно означает 17,6—18,5; 18,6—19,5; 19,6—20,5 мкм.

Австралийская шерсть большинства типов промывается до белого цвета. Однако имеется мериносовая шерсть с кремовым оттенком, которая вследствие оттенка не может быть отнесена к первым двум стилям. Кроме того, под воздействием некоторых микроорганизмов в волокне образуются несмываемые ржавые пятна. Шерсть с наличием таких пятен маркируют буквой Н и относят в зависимости от количества таких пятен к последним трем стилям. Например, маркировка шерсти Н64 означает, что тонина волокна 23 мкм, шерсть мериносовая рунная, содержит от 2 до 5% растительного сора, средняя длина штапеля в партии около 90 мм, небольшое количество штапелей имеет ржавые пятна.

В СНГ в ЦНИИ шерсти разработана единая научно-техническая классификация шерсти. Ее основным преимуществом является то, что в ней шерсть разделена на однородную и неоднородную, введено регламентирующее понятие технологического качества с показателями средней тонины, стандартного отклонения и коэффициента вариации. Однородная шерсть была разделена на группы тонины: тонкая до 25 мкм; полутонкая от 25,1 до 31,0 мкм; полугрубая от 31,1 до 40,0 мкм и грубая от 40,1 до 67,0 мкм. Позднее эти принципы были использованы при разработке американской классификации шерсти.

1. 5 Лекция № 7 (2 часа).

Тема: «Меховые, шубные и кожевенные овчины»

1.5.1 Вопросы лекции

1. Понятие о шубных и меховых овчинах.
2. Факторы, влияющие на свойства овчины.
3. Основные пороки овчин.
4. Первичная обработка и хранение овчин.

1.5.2 Краткое содержание вопросов:

1. Понятие о шубных и меховых овчинах.

Овчины — это шкуры, снятые с взрослых овец и молодняка старше 6 месяцев, имеющие площадь не менее 18 дм² (кроме романовских овец). Овчина взрослой романовской овцы должна иметь площадь не менее 35 дм², полярковая — не менее 25 дм².

Различают три группы овчин: шубные, меховые и кожевенные.

Шубные овчины — шкуры грубошерстных овец с неоднородной (смешанной) шерстью длиной не менее 1,5 см. Из этих овчин шьют тулупы, полушубки и другие виды шубной одежды. В этих изделиях кожная часть овчин (мездра) обращена наружу, а шерстный покров — внутрь. Поэтому обращают внимание на прочность и устойчивость мездры к внешним воздействиям (влага, охлаждение, трение и др.), а также на то, чтобы она была мягкой, легкой и эластичной. Шерсть должна быть густой, стойкой против сминания и свойлачивания.

По породной принадлежности шубные овцы делят на русские, степные и романовские.

Овчина русская — шкуры грубошерстных пород овец: короткохвостых, тощехвостых, жирнохвостых, включая кавказских овец. Овчина степная — шкуры курдючных грубошерстных овец и взрослых каракульских. Кожная ткань этих овчин, особенно курдючных овец, грубая, толстая и менее прочная, чем у русской овчины.

Наиболее ценные шубные овчины — романовские. Отличительная особенность романовских овчин — в их шерстном покрове пух длиннее ости. Чтобы не было свойлачивания шерстного покрова, перерослость пуха над остью должна составлять 1,5-2 см. В романовской овчине 6-8-месячных ягнят ость должна быть черного цвета длиной 2,5-3 см, а пух белого цвета длиной 4-5 см. Соотношение между волокнами ости и волокнами пуха должно составлять от 1:4 до 1:10. Благодаря тонкой, но прочной мездре, что обусловлено мощным развитием и хорошим переплетением коллагеновых пучков, романовские овчины долговечны в носке.

Поярковая романовская овчина. Овчина молодняка в возрасте до 8 мес. Шерстный покров густой или менее густой, мягкий, первичный, не линяющий, со значительной перерослостью пуха над остью, с рыжеватыми, коричневыми, светло-серыми, бурыми или черными верхушками пуховых косиц, цвет внутри шерстного покрова при его разворачивании от светло-серого до темно-серого с признаками голубизны. Допускаются пежины на не основной площади и на отдельных участках поверхностная свалянность в верхней части руна, поддающаяся расчесыванию.

Взрослая романовская овчина I группы. Шерстный покров густой, без признаков линьки, не свалявшийся, с перерослостью пуха над остью, при внешнем осмотре от светло-серого до темно-серого цветов, при разделении косиц — с признаками голубизны, с выраженными и слабыми завитками на основной площади овчины. Допускается наличие слабого завитка на половине площади сухосоленых и пресно-сухих овчин или отсутствие завитка на парных и мокросоленых овчинах. Допускаются овчины с наличием поверхностной свалянности в верхней части руна, поддающейся расчесыванию; с пежинами на лапах и шейной части; с темной полосой шерсти, состоящей из волокон черной ости в области шеи, холки и спины, мало отличающихся по тонине от остальной массы шерсти. Взрослая романовская овчина II группы.

Овчины взрослых романовских овец и их помесей, не соответствующие требованиям I группы, без признаков линьки, а также овчины, имеющие один из нижеследующих признаков: без перерослости пуха над остью или перерослостью ости над пухом; отсутствие завитков на всей площади овчины; значительное потемнение в области шеи, холки и спины из длинных и грубых остевых волокон; значительное распространение гривы; наличие пежин на основных частях овчины; наличие значительного количества переходного волоса.

Меховые овчины получают от тонкорунных, полутонкорунных, тонкорунно-грубошерстных овец с однородной, а иногда и с неоднородной полугрубой шерстью со значительным содержанием пуха. Меховые овчины идут на пошив пальто, шапок, воротников. В изделиях из меховой овчины волосяной покров обращен наружу. Если же из меховых овчин шьется верхняя одежда волосом внутрь, мездра покрывается тканью или специальной обработкой на нее наносится защитный слой. Чтобы повысить товарный вид изделий, шерстный покров меховых овчин подстригают, окрашивают и подвергают другим видам механической обработки. Основные требования, предъявляемые к качеству меховых овчин, касаются шерстного покрова, а не мездры.

Кожевенные овчины — шкуры, которые по совокупности технологических свойств не могут быть рационально использованы промышленностью для изготовления шубных или меховых овчин. К кожевенному сырью относят редкошерстные (менее 1000 волокон на 1 см²) шубные русские и степные овчины, овчины с теклостью шерсти на площади

более 50%, с репьем на всей площади, залегающим на расстоянии 1,5 см от основания волос или с сильно сваленной шерстью, овчины взрослых романовских овец площадью менее 35 дм² и поярковые романовские площадью менее 25 дм², меховые овчины с длиной шерстного покрова менее 0,5 см и шубные — короче 1,5 см.

Кожевенные овчины служат сырьем для выработки широкого ассортимента товаров: хромовая кожа, шевро, подкладочная и галантерейная кожа, перчаточная лайка, обувная замша и т.д. В зависимости от длины шерсти овчины подразделяют на шерстные, полusherстные, низкошерстные.

Требования к длине шерстного покрова овчин

Овчина	Высота шерстного покрова, см		
	низкошерстная	полusherстная	шерстная
Меховая	0,5-1,0	1,1-3,0	3,1
Шубная	-	-	-
Русская, степная	1,6-2,5	2,6-6,0	6,1
Роановская	-	1,5-5,0	5,1

2. Факторы, влияющие на свойства овчины.

На товарные качества и технологические свойства мехового, шубного и смушкового сырья значительное влияние оказывают как консервирование, обработка и выделка шкур, так и прижизненные факторы: классный состав поголовья, уровень племенной работы с овцами, пол и возраст животных, условия кормления и содержания, заболевания, сезон и способ убоя.

Влияние возраста

В отличие от шерстной продукции, поступающей только от взрослых овец и сезонно — весной, овчины заготавливают в течение года от всех половозрелых групп при убое и падеже животных. За исключением каракуля и смушки, основная масса ягнячьих шкур (лямка, мерлушка, трясок) поступает от павших или вынужденно убитых ягнят, а также от недоношенных и мертворожденных. При своевременном съеме и правильном консервировании эти шкурки более пластичны, имеют тонкую мездру, нежный и мягкий волосяной покров, хорошие технологические качества.

Кожная ткань ягнят тонкая и рыхлая, содержит мало волокнистых структур, но значительное количество клеточных элементов. Поэтому методы первичной обработки, технологические процессы превращения ягнячьих шкур в полуфабрикат значительно отличаются от выделки овчин.

К моменту рождения ягненка и в подсосный период шерстные волокна прорастают не полностью, из-за чего шерстный покров более редкий, а шерстинки — тоньше в диаметре.

У большинства тонкорунных ягнят хорошо развит грубый ягнячий волос — *песига*, которая образует верхний ярус шерстного покрова. Прямой песюжный волос возвышается над колечками нижних пуховых волокон, тесно прилегающих к коже. Обычно к отбивке в 4-5-месячном возрасте песига выпадает и заменяется огрубленным пухом.

Влияние пола

Пол животного, с которого снята овчина, сказывается на некоторых ее признаках.

Овчины баранов имеют более толстую и плотную кожную ткань и грубый шерстный покров по сравнению с овцематками. Овчины валухов (кастрированных самцов) в этом отношении занимают промежуточное положение.

У баранов пучки коллагеновых волокон в кожной ткани мощнее, а переплетение сложнее. Более тонкая кожа бывает у ярок (на 18%), утолщенная и толстая — у баранчиков.

Влияние условий содержания

Скученное содержание овец в тесных помещениях, на грязной подстилке приводит к засорению шерстного покрова остатками кормов и навозом, которые также усложняют обработку овчин и ухудшают качество полуфабриката.

Поэтому при строительстве овчарен необходимо исходить из норм площади пола (1,8-2 м², при оборудовании базов не менее 4 м² на овцу), а также выдерживать зоогигиенические параметры микроклимата. Не менее двух раз в неделю нужно подвозить соломенную подстилку из расчета 0,5 кг на взрослую овцу и 0,35 кг на одну голову молодняка в сутки.

Отрицательно влияет на качество овчинной продукции также большинство болезней овец, особенно кожного покрова. Чесотка, парша, оспа, стригущий лишай вызывают массовые прижизненные пороки шкуры, что снижает ее ценность.

Влияние кормления

Хорошая организация кормления и содержания овец — важнейшие факторы, обеспечивающие нормальное развитие организма животного, наружного покрова и его основных элементов, которые в конечном итоге определяют товарные и технологические свойства овчин.

При недостаточном кормлении, а тем более голодании животных, замедляется развитие шерстного покрова, уменьшается густота шерсти, ослабляется прочность связи волокон шерсти с кожным покровом, наблюдается утончение волокон и снижается их крепость. Кожная ткань становится тонкой, дряблой, менее упругой и прочной. Все это существенно ухудшает качество овчинного сырья, затрудняет его обработку и отрицательно сказывается на качестве полуфабриката.

Нередко плохое кормление овец вызывает выпадение шерсти и глубокие изменения свойств кожного покрова, приводящие к полной непригодности овчинного сырья для переработки и использования, превращая ценные овчины в брак. При обработке таких овчин наблюдается массовое выпадение шерсти, выпавшие шерстинки сваливаются, образуя «закат». На овчинах появляются плешины, существенно сокращается полезная площадь меха.

Закладка и формирование волосяного покрова начинаются в эмбриональный период, на 70-90-й день развития плода. Для получения доброкачественных меховых шкур необходимо со второй половины суягности обеспечить овцематок полноценным кормлением.

Рацион овцематки живой массой 50-60 кг в этот период должен содержать 1,55 кормовых единиц и 130-140 г переваримого протеина, 9 — кальция, 5 — фосфора, 15 — поваренной соли и 25 г каротина.

Суточную потребность в энергии, питательных и минеральных веществах можно обеспечить скармливанием 0,8-1 кг сена, 2,6-3 — силоса кукурузного, 0,5 — соломы и 0,35-0,4 комбикорма. Более эффективно использовать рацион из рассыпной кормосмеси по 3,5-4 кг.

Новорожденные ягнята в первые дни жизни питаются только молоком матери, поэтому кормление подсосных овцематок должно быть полноценным. Овцематке живой массой 55-60 кг, с настригом мытой шерсти 2,5-3 кг и молочностью, обеспечивающей 260-300 г среднесуточного прироста ягненка, в этот период требуется сухих веществ 2,2 кг, кормовых единиц — 1,9, переваримого протеина — 190 г, сахара — 190, крахмала — 280, кальция — 9,7, фосфора — 6,2, серы — 6,5, поваренной соли — 15-20 г, каротина — 20 мг. Суточный рацион должен включать 1 -1,2 кг сена бобово-злаковых, 0,5-0,7 — травяных гранул, 0,5-0,7 — комбикорма, 3,5-4 — силоса кукурузного, 1 кг свеклы или 4,2-4,6 кг рассыпных полнорационных кормосмесей.

Кроме материнского молока, ягнята в подсосный период должны получать до 30 кг комбикорма, 19 — сена, 14,5 — травяных гранул, 36 — силоса, 36 кг свеклы из расчета на голову за 4 месяца.

После отбивки сверхремонтный молодняк ставят на интенсивный откорм, обеспечивая его полноценным кормлением в соответствии с нормами, и в конце лета — начале осени сдают на мясо. При этом в дополнение к мясной продукции от животных этого возраста получают высококачественную меховую овчину шерстного типа.

В летнее время суточная потребность овец в зеленом корме составляет около 20% их живой массы. Поэтому ягненку живой массой 30 кг после отбивки необходимо скармливать зеленого корма не менее 6 кг. При хорошем травостое овец пасут в течение 6-8 часов с перерывом, так как в полуденный зной они должны отдыхать.

Влияние сроков убоя

У тонкорунных и полутонкорунных овец линьки практически не бывает, однако весной наблюдается повышенная рыхлость кожной ткани. Самая прочная связь шерстного покрова с кожным отмечается при осеннем, а самая слабая — при весеннем убое овец. Это обстоятельство следует учитывать при сдаче овец на мясокомбинат.

Различия овчин по длине шерсти также зависят от сроков убоя животных. При летнем и раннем осеннем (сентябрь) убое получают овчины с наиболее короткой шерстью — низкошерстные и полusherстные. Поздний осенний (октябрь, ноябрь) убой овец дает овчины наилучшего качества по шерстному покрову.

В случае стрижки поярка остриженных ягнят необходимо сдавать на убой через 1,5-2 месяца после стрижки с тем, чтобы шерстные волокна достигали длины 1,5 см.

3. Основные пороки овчин.

Пороки овчин «тощость» и «шалажистость» значительно изменяют товарные свойства сырья: а) ухудшается внешний вид овчин — шерсть становится тусклой, свальной, кожная ткань становится тоньше и рыхлее; б) на таких овчинах встречается большое количество других пороков, чаще прижизненного происхождения (болячки, парша и др.); в) уменьшается вес овчин; г) снижается содержание гольевого вещества в шкуре, в том числе и наиболее ценного для кожевенного производства — коллагена; д) значительно снижается толщина сетчатого слоя дермы шкуры, что в свою очередь отражается на снижении прочности всей шкуры и т. д.

Из тощих и шалажистых овчин получается кожа с пониженной прочностью и толщиной, с большим количеством сырьевых и производственных пороков. Наиболее низкими качественными показателями отличаются кожи, выработанные из шалажистой овчины. В большинстве случаев такие кожи не соответствуют требованиям стандартов даже на галантерейную или подкладочную кожу. С увеличением степени тощести сырья снижается выход полуфабриката по площади.

Учитывая, что из тощих овчин можно выработать стандартный полуфабрикат, оценку этого порока в сырье следует оставить на уровне действующего ГОСТа 1134—51. Шалажистые овчины целесообразно относить к группе нестандартного сырья. Так как термины «шала-жистость» или «шалага» устарели и не всегда понятны, их следует заменить термином «сильная тощость».

Нецелесообразно выделять в стандарте на сырье порок «тощеватость», так как тощеватые овчины являются переходными от нормальных к тощим и порок в этой степени трудно выявить каким-либо из вышеприведенных методов исследования. При органолептической оценке тощих и сильно тощих овчин необходимо пользоваться следующими характеристиками пороков: а) тощость — рыхлость и тонкость шкуры в результате истощения животного. Шерстный покров тусклый, со стороны мездры видны корни волос, прирезы жира встречаются по краям в виде тонких пленок; б) тощость сильная — значительная рыхлость и тонкость слабых на разрыв шкур сильно истощенных животных. Шерсть на таких шкурах тусклая, свальная, выпадающая, просвечивают корни волос. Шкуры сухих консервировок отличаются сморщенной мездрой.

Точно различить в сырье тощие и сильно тощие овчины можно только по совокупности их органолептических, физико-механических, химических и

гистологических показателей. Для этого необходимо продолжить работу по накоплению таких показателей, чтобы можно было установить границу (нормы) между нормальными, тощими и сильно тощими овчинами.

4. Первичная обработка и хранение овчин.

На мясокомбинате для первичной обработки и консервирования шкур оборудуется шкуропосолочный цех.

В убойно-разделочном цехе шкуры осматривают, удаляют прирезы мяса и жира (обрядка), сортируют по качеству и направляют в шкуропосолочный цех. Навалистые шкуры с шерстной поверхности орошают водой, выдерживают 45 мин для размягчения навала. Навал удаляют, используя навалочные машины или ручную ножами. Промывка водой мездровой поверхности обеспечивает удаление крови. Обработанные шкуры после стекания воды направляют для консервирования. На мясокомбинатах шкуры консервируют мокросолением (тузлукованием) и в расстил.

В условиях хозяйства допускается консервирование их сухосолевым, пресно сухим способами и замораживанием.

Тузлукование — консервирование в концентрированном (30—32%) растворе поваренной соли (тузлуке) которое производится в чанах, шнековых ба-рабанах на поточно-механизированной линии, при жидкостном коэффициенте (отношение массы шкуры к тузлуку 1 : 3). Продолжительность тузлукования крупных шкур в чанах 12—18 ч, в барабанах — 7 ч; овчин — 6 ч. Тузлукованные шкуры после стекания рассола на козлах укладывают на настилах в штабеля и дополнительно подсаливают сухой солью.

Посолка шкур в расстил производится на деревянных стеллажах, которые сначала посыпают солью слоем 1—2 см, затем послойно расстилают шкуры мездрой кверху, шерстью вниз, мездровую поверхность каждой шкуры обильно посыпают солью, штабель наращивают до 1,5 м высоты. Расход соли при посолке 40—50% к массе шкуры. Через 2—3 суток шкуры в штабеле перекапывают, верхние перемещают вниз. Процесс консервирования говяжьих шкур продолжается не меньше 6, овчин — 4 суток.

Кислотно-солевой способ применяется для консервирования шубно-меховых овчин. Техника посолки, как и при консервировании, в расстил, но в качестве консерванта используется посолочная смесь, состоящая из поваренной соли (85%), алюминиевых квасцов (7,5%), хлорида аммония (7,5%).

Способ сухосоления применяется в условиях хозяйства и отгонных пастбищ. Шкуры сначала обрабатывают сухой солью (врасстил), затем через 2—3 суток, высушиваются в тени под навесом. Пресно-сухой способ, или высушивание шкур в специальных сушилках. Консервирование шкур замораживанием и облучением применяется сравнительно редко.

Технологические операции по обработке шкур

1. Промывка и отмочка – соленую шкуру отмачивают в воде в течение 6—8 ч., при пресно – сухом способе консервирования отмочку производят в течение нескольких суток в чанах или в проточной воде с добавлением сульфата натрия (ускоряет отмочку).

2. Мездрение – удаление подкожной жировой клетчатки специальным ножом – междряком.

3. Прополаскивание шкуры.

4. Обезволашивание и золение – используется гидроксид кальция (известь 20 л воды + 1,5 кг негашеной извести) и сульфид натрия. При обезволашивании удаляют волос, при золении разрыхляется структура дермы, коже придаются требуемые свойства.

5. Обеззоливание – удаление гидроксида кальция и снятие нажора (набухания кожи) с полученного голя достигается раствором сульфата аммония (голье сначала промывают водой с $t = 25—36^{\circ}\text{C}$ 45—60 мин., а затем в барабан подают раствор сульфата аммония на 30 мин.).

6. Мягчение – для придания коже эластичности, осуществляется обработкой ферментами.

7. Пикелевание – цель – подготовка к дублению; голье поглощает кислоту и соль, кислота изменяет рН голье, а соль предохраняет его от кислотного набухания – нажора. На 1 л воды 50 г NaCl + 15 г молочной (уксусной) кислоты на 6—8 ч.

8. Дубление – голье превращается в кожу. Типы дубильных операций:

А) танидное = растительным сырьем – экстракты дуба, ольхи, ивы, барбариса. Выдерживание в дубильном растворе танидов до 100ч. $t = 40^{\circ}\text{C}$ $\text{pH} = 4$.

Б) квасцами – кристаллогидраты двойных солей металлов – $\text{K}_2(\text{SO}_4) \times 12\text{H}_2\text{O}$, $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \times 12\text{H}_2\text{O}$.

В) альдегидное – 40% формальдегид.

Г) солями титана.

9. Нейтрализация – удаление из кожи избытка кислот и щелочей; промывка водой, выдерживание в 2% р-ре соды и окончательное промывание.

10. Крашение – естественными или синтетическими красителями. Краситель растворяют в 20–40 л воды при $t = 70\text{—}75^{\circ}\text{C}$, окраска в течение 1 ч.

11. Жирование – введение в полуфабрикат жирующих веществ, кожа становится более эластичной, увеличиваются ее водоотталкивающие свойства.

12. Наполнение – выравнивается толщина и плотность кожи, в барабан с отжатым полуфабрикатом подается нагретый до $65\text{—}70^{\circ}\text{C}$ воздух, засыпается 2—4% сульфата магния, 1,5—2% алюминиевых квасцов и через 20 мин наливают 3—8% патоки, время наполнения 1 ч.

13. Сушка и увлажнение

14. Покровное крашение и отделочные операции

1. 6 Лекция № 8 (2 часа).

Тема: «Показатели мясной продуктивности овец»

1.6.1 Вопросы лекции:

1..Показатели мясной продуктивности и методы их оценки.

Влияние различных факторов на мясную продуктивность овец.

1.6.2 Краткое содержание вопросов:

1.Показатели мясной продуктивности и методы их оценки.

Баранина по содержанию белка близка к говядине и превосходит свинину, а по содержанию жира и калорийности превосходит говядину и уступает свинине. Животные пищевые жиры состоят главным образом из пальмитиновой, стеариновой, олеиновой и небольшого количества других жирных кислот. Ценное свойство бараньего жира — небольшое содержание холестерина — 29 мг%, тогда как в говяжьем — 75 мг% и в свином жире — 74,5—126 мг%.

В баранине больше, чем в свинине, содержится никотиновой кислоты, биотина и витамина В12, но меньше тиамин, пантотеновой кислоты и витамина В6. По сравнению с говядиной баранина богаче тиамином, рибофлавином, никотиновой кислотой, но меньше содержит фолиевой кислоты и витамина В6.

Баранина — хороший источник кальция и фосфора. По содержанию микроэлементов (медь, цинк) баранина значительно превосходит другие виды мяса.

Показатели мясной продуктивности и методы их оценки. Для оценки мясной продуктивности овец учитывают следующие показатели: предубойную живую массу,

массу туши, убойную массу, убойный выход, соотношение в туше мякоти, костей, сухожилий; сортовой состав туши, выход субпродуктов, питательность мяса.

Предубойную живую массу определяют взвешиванием каждого животного перед убоем после 24-часовой голодной выдержки. За этот период живая масса снижается на 2,5—3,5 % по сравнению с ее величиной до выдержки.

Туловище животного без кожи, внутренних органов, головы, ног и хвоста (курдюка) составляет массу туши. Передние ноги отделяют по запястному, задние — по скакательному суставу. Массу туши сразу после убоя называют парной, а через 24 ч после ее остывания в холодильной камере при температуре 4—6°C — охлажденной. Масса парной туши выше, чем охлажденной.

Убойную массу составляют масса туши и масса внутреннего жира (сальникового, желудочного, кишечного и сточного), учитываемые отдельно. У овец мясо-сальных и жирнохвостых пород в убойную массу необходимо включать массу курдюка и жирного хвоста, которые отделяют от туши при убое и учитывают отдельно.

Убойный выход — это выраженное в процентах отношение убойной массы к массе тела животных после голодной выдержки. В зависимости от породы, упитанности, возраста, пола и т.д. этот показатель колеблется в широких пределах (от 35 до 60 %).

Категории упитанности туши: высшая, средняя и ниже средней.

Коэффициент мясности характеризует соотношение в туше массы мякоти и костей, которое определяется на основании проведения обвалки туши или полутуши.

Количество жира и его локализация имеют существенное значение для характеристики мясной продуктивности овец. В процессе роста и развития животных в постэмбриональный период отложение жира в разных участках тела происходит в определенной последовательности. Вначале образуется преимущественно внутренний жир (почечный, кишечный), затем — межмышечный, подкожный и, наконец, внутримышечный. Разные породы овец существенно различаются по характеру жиротложения. Например, у романовских овец в основном откладывается внутренний жир, а у скороспелых мясо-шерстных — на поверхности туши и между мышцами. Для тушек массой 15—18 кг желательная толщина жирового полива над длиннейшей мышцей спины между 12-м и 13-м грудными позвонками — 3—3,5 мм, а для тушек массой 20—25 кг — 4—5 мм.

Субпродукты подразделяют на: а) мякотные — печень, сердце, легкие, диафрагма, трахея с горлом, почки, селезенка, мясная обрезь, вымя, язык и мозги; б) слизистые — рубец, летошка; в) шерстные — голова.

Пищевая ценность мяса определяется по цвету, аромату, вкусу, нежности, сочности и калорийности. У молодых овец мясо более светлое и нежное, чем у старых. Мясо овец, имеющих среднюю и высшую упитанность, обычно более нежное и сочное, чем овец нижесредней и тощей упитанности. Мясо барана имеет легкий специфический, слегка сладковатый и слабосоленоватый привкус, который в мясе молодняка выражен в меньшей степени, чем у старых овец.

С пищевой ценностью мяса тесно связан его химический состав, который зависит от породы, возраста, упитанности животных.

2. Влияние различных факторов на мясную продуктивность овец.

Генетические факторы. Разные породы овец существенно различаются по мясной продуктивности. Например, скороспелые мясо-шерстные породы овец с кроссбредной и кроссбредного типа шерстью заметно превосходят овец тонкорунных по оплате корма и мясным качествам. Хорошей скороспелостью, высоким выходом и качеством мяса отличаются многие породы грубошерстных и полутрубошерстных овец. Такие отечественные породы мясо-сальных овец, как гиссарская, эдильбаевская, джайдара, алайская по скороспелости и мясности не уступают скороспелым мясным английским породам. Характерная особенность большинства местных грубошерстных овец — способность к нагулу в благоприятных условиях летне-осеннего периода и сохранение

продуктивности при недокорме в зимний период, при этом на поддержание жизни овцы расходуют энергетические запасы собственного тела (курдючный, внутренний жир).

Отмечена высокая положительная корреляция между величиной среднесуточного прироста животных и оплатой корма продукцией. Величина фенотипической корреляции между оплатой корма приростом и среднесуточным приростом массы тела у мясо-шерстных овец, как правило, составляет — 0,8—0,9.

Наиболее эффективны оценка производителей по откормочным и мясным качествам потомства и широкое использование в случке выявленных улучшателей. Оценка производителей методом контрольного откорма их потомства должна быть строго регламентирована условиями кормления и содержания с учетом пола и возраста откармливаемых животных. С этой целью из приплода каждого проверяемого производителя методом случайной выборки отбирают 10—12 нормально развитых баранчиков, родившихся в числе одинцов; отклонения в массе тела баранчиков, отобранных для откорма, и остальными, происходящими от того же отца, не должны превышать 5 %; различия по массе и возрасту (в днях) внутри отобранных групп не должны превышать 10—15%; между отдельными группами различия по среднему возрасту баранчиков не должны превышать 5 %. Наряду с приростом массы тела следует учитывать и прирост массы шерсти. Чтобы определить прирост массы шерсти за период откорма, у баранчиков при постановке их на откорм с помощью вилки на боку выстригают шерсть на площади 25 см² (5X5 см). В конце откорма с этой же площади вновь состригают и взвешивают выросшую за период откорма шерсть. Контрольный откорм длится 60 дней, если отъем баранчиков провели в возрасте 3,5—4 мес, или 75 дней — при отъеме в 2 мес, или до возраста, в котором масса тела достигает 35—40 кг. Стандартизировать кормление животных при откорме можно использованием полнорационного монокорма (комбикорма) постоянного состава.

В отношении уровня кормления существуют разные точки зрения. Одни специалисты считают, что испытание баранов следует проводить при высоком уровне (кормление вволю), по мнению других, контрольный откорм потомства следует проводить в условиях, сходных с теми, в которых планируется использование будущего производителя. Оплата корма продукцией — признак, имеющий высокую генетическую обусловленность.

Скрещивание — один из важных факторов повышения мясной продуктивности овец. Помесное потомство, полученное при скрещивании, например, маток тонкорунных пород с полутонкорунными мясо-шерстными баранами, как правило, отличается более высокими показателями энергии роста, оплаты корма продукцией, убойных и мясных качеств

Кастрация баранчиков. Баранчики по сравнению с валушками имеют более высокую скорость роста и затрачивают меньше корма на единицу прироста массы тела. Эти различия обусловлены прекращением гормональной функции половых желез после кастрации баранчиков, что изменяет тип обмена веществ. Валушки хуже используют азот корма и меньше откладывают его в теле, чем баранчики. Поэтому не рекомендуется кастрировать тех баранчиков, которые предназначены к сдаче на мясо в возрасте 6—8 мес. Кастрацию следует проводить при реализации баранчиков на мясо в более старшем возрасте.

Сроки реализации животных на мясо. Экономически более выгодна реализация овец на мясо в возрасте до года (от 5 до 10 мес).

Интенсивное выращивание и откорм ягнят биологически целесообразно и экономически эффективно проводить до достижения живой массы 40—50 кг, так как в этот период прирост массы мышечной ткани наиболее интенсивный по сравнению с отложением жира, а затраты корма на продукцию самые низкие. На 1 кг прироста ягнота до 6-месячного возраста затрачивают 4,1—5,1 корм. ед., а до 1 г—7—9, тогда как полновозрастные овцы—10—12 корм. ед. и более.

Наличие в товарном стаде 70—75 % маток - одно из важных условий максимального производства баранины. При уменьшении числа маток в стаде и ухудшении показателей воспроизводства снижается уровень производства баранины. Поэтому рекомендуется при разведении овец всех пород, а особенно каракульской, мясо-сальных, мясо-шерстных, иметь в стаде максимально возможное количество маток. Для этого весь сверхремонтный молодняк в год рождения необходимо реализовать на мясо.

Откорм и нагул овец перед убоем

Для увеличения производства дешевой и отличной по качеству баранины необходимо использовать возможности нагула овец на пастбищах. Реализацию овец на мясо следует проводить после того как они достигнут хороших убойных кондиций — упитанность их должна быть средней и выше.

Степень упитанности овец влияет и на убойный выход. Можно считать, что в среднем убойный выход полновозрастных овец составляет 40—70 %, молодняка — около 45%.

Применение биостимуляторов роста животных. Стимулирующее действие на рост оказывает имплантация аминокислот.

1. 7 Лекция № 9 (2 часа).

Тема: «Молочная продуктивность овец»

1.7.1 Вопросы лекции:

1. Понятие о молочной продуктивности овец
1. Химический состав молока овец
3. Методы учета молочной продуктивности овец

1.7.2 Краткое содержание вопросов:

Из овечьего молока изготавливают в основном сыры: кавказские (тушинский, осетинский, ереванский и др.), качкавал (крымский сыр), пикарино, рокфор и др., а также брынзу. Самый распространенный и наиболее простой по способу приготовления сыр — брынза, в сухом веществе которого содержится 40—50 % жира. Кроме сыров, готовят и различные молочнокислые продукты: творог, айран, каймак, мацони и др. Сливочное масло из овечьего молока не производят, так как оно имеет специфический привкус, слишком мягкую консистенцию и плохо хранится. Продукты из овечьего молока характеризуются высокой питательной ценностью и хорошо усваиваются. Кроме остфрисландских, имеющих в Бельгии, Нидерландах, ФРГ и соседних с ними странах, овец всех остальных пород разводят не ради получения молока. Однако в странах Балканского полуострова и Ближнего Востока издавна от разводимых там овец наряду с шерстью и бараниной получают большое количество и молока. В преобладающем большинстве стран, кроме Франции, Италии, а также почти повсеместно в зонах тонкорунного и полутонкорунного овцеводства молочная продуктивность не имеет товарного значения, а молоко овец служит, как правило, для подсосного выращивания ягнят под матками.

Существенная роль в производстве товарной продукции молока принадлежит многим породам грубошерстного овцеводства. Среди них ведущее положение занимают смушковые (каракульские и др.). Овец этих пород обычно доят после убоя новорожденных ягнят. Поэтому зоны смушкового овцеводства, начиная с прошлого века, были основными районами получения и переработки овечьего молока. Удой каракульских овец (не выращивающих ягнят) равен 30—40 кг, цигайских овец, имеющих подсосных ягнят, — 18--20, грубошерстных и помесных с подсосными ягнятами — 25—30 кг. Между тем у овец некоторых пород молочность может быть развита до такого высокого уровня, что молока будет достаточно не только для выкармливания ягнят, но и для доения. К таким породам относятся почти все горные грубошерстные овцы Кавказа и особенно Закавказья, цигайские, полутонкорунные, полугрубошерстные местные овцы других регионов (Средняя Азия, Казахстан и др.). При хорошем кормлении матки асканийской,

кавказской и других тонкорунных пород также способны давать относительно большое количество молока. Молочность маток зависит от многих факторов: породы, кормления, содержания, количества ягнят при ягнении и выкармливании, живой массы приплода и др.

Молочная продуктивность овец зависит и от конституции животных. При изучении уровня продуктивности гиссарских овец в зависимости от конституциональных особенностей установлено, что молочность маток грубой конституции в первые два месяца лактации составляла 122 кг, крепкой— 112, нежной— 104 кг.

Кроме того, матки, обьягнвившиеся двойками и более, как правило имеют более высокую молочную продуктивность, чем обьягнвившиеся одиночками. Матки, обьягнвившиеся двумя ягнятами и выкормившие их, превосходили по молочной продуктивности своих сверстниц, вырастивших одного ягненка из двух родившихся. Отмечена зависимость между молочностью маток, числом сосущих ягнят и частотой сосания. Так, матки с четырьмя лактирующими сосками отличаются повышенной многоплодностью и молочностью. Молочность матки зависит и от пола ягнят; более высокая молочность отмечена у маток, у которых родились баранчики, по сравнению с ярочками.

Молочная продуктивность маток обычно повышается до 4—5-й лактации, а затем идет снижение удоев. Чтобы не допустить ошибок при определении молочности маток, необходимо учитывать возраст овец и уровень их кормления в суягный и подсосный периоды, тип рождения и число выращиваемых маткой ягнят. Молочность маток характеризуется высокой фенотипической и генотипической изменчивостью, что предопределяет результативность массовой селекции по этому признаку. Для отбора по молочной продуктивности требуется определение ее уровня у лактирующих маток. Молочность маток определяют или путем учета выдоенного, высосанного молока, или по приросту ягнят за определенный период.

2.Химический состав овечьего молока

Овечье молоко - один из наиболее полноценных пищевых продуктов, в котором содержится:

6-8% жира, 4,5-6% белка, 4,6% молочного сахара; 4-6% казеина (в коровьем - 2-3,7%), 0,8 % минеральных солей, а также ряд витаминов. Общее количество сухого вещества 18-23%.

Энергетическая питательность 1 кг овечьего молока 4431 кДж. Белки овечьего молока богаты незаменимыми аминокислотами: лизином, гистидином, аргинином, треонином, валином, лейцином.

Овечье молоко отличается более чем в 2 раза содержанием витаминов: В1, В2, В6, В12, никотиновой и пантотеновой кислотами и биотином. Витамина А содержится от 0,34 до 40 мг/кг, витамин С от 33 до 41 мг/кг.

Жир в овечьем молоке находится в виде мельчайших шариков: в 1мл - 6 млрд., в коровьем молоке - до 4 млрд, т.е. - на 33% больше.

Сливочное масло из овечьего молока не производят, т.к. оно имеет специфический привкус, слишком мягкую консистенцию и плохо хранится

Первые два-три дня после родов молочные железы овцы вырабатывают молозиво, отличающееся по химическому составу и биологической ценности от молока. Оно богато минеральными веществами, витаминами и содержит более 23 % белков, до 80 % из которых представлено сывороточными белками альбуминами и глобулинами, значительную часть которых составляют иммуноглобулины(антитела).

Молозиво является важнейшим элементом питания новорожденного ягненка. Оно обеспечивает его энергией в первые часы и дни жизни, поставяет антитела и способствует выработке иммунитета ко многим заболеваниям, обладает послабляющими свойствами, чем обеспечивает очищение кишечника от первородного кала - меккония.

3. Методы учета молочной продуктивности овец

Овечье молоко – единственный продукт питания ягнят в первые 2-3 недели жизни, а во многих странах мира оно - наиважнейший продукт питания человека. В большей мере это относится к странам Азии и Африки. Во многих европейских странах производству товарного овечьего молока также уделяется большое внимание.

Молочную продуктивность овец оценивают по количественным (молочность) и качественным (состав свойства молока) показателям.

В настоящее время используют несколько методов учета молочной продуктивности овец.

1. Первые 2-3 недели жизни ягненок в основном питается молоком матери, поэтому между молочностью овцематки и приростом ягнят в первый месяц жизни имеется высокая зависимость ($r = 0,87-0,90$). Таким образом, молочность маток определяют по приросту ягнят за первые 20 дней жизни. Для этого ягненка взвешивают при рождении и через 20 дней. Умножая величину прироста живой массы ягнят за учетный период на коэффициент 5 (затраты молока на 1 кг прироста живой массы), получают среднюю молочность маток.

2. Молочность овец определяют по количеству молока, выдаиваемого из одной половины вымени, из другой половины молоко высасывает ягненок.

3. Метод контрольного доения, т.е. учет суточного количества молока через заданные промежутки времени (10,15 или 20 дней). Умножением полученной величины на число дней между контрольными доениями получают удои за определенный период лактации.

4. Определение молочной продуктивности овец на основании расчетного контрольного коэффициента, с помощью которого можно учитывать молочную продуктивность овец на протяжении всей лактации.

Определяют по 10 овцам из стада в течение всей лактации. Умножая полученный коэффициент на утренний удой каждой овцематки, определяют ее молочность за день лактации.

Предложен упрощенный метод определения молочности овец, когда величину утреннего удоя за какой-либо день лактации умножают на контрольный показатель лактации, который рассчитывается:

5. В первые два месяца лактации молочность маток устанавливают взвешиванием ягнят до и после сосания. Контрольные взвешивания проводят в течение 24-48 часов с интервалом 10-15 дней (метод не точный, т.к. у обильно-молочных маток часть молока ягненок может не высосать).

Товарное молоко получают главным образом от овец каракульских пород, так как ягнят от них убивают для получения шкурок в первые же дни их жизни. От других пород овец поступление молока зависит от продолжительности содержания ягнят под матками.

Овцы не отличаются высокой молочностью, в среднем от одной матки получают 100 – 150 кг молока за 4 – месячную лактацию. От овец смушковых пород (каракульская, сокольская) после убоя ягнят надаивают за 2,5 – 3 месяца 60 – 70 кг молока. От овец романовской и цигайской пород за лактацию получают 150 – 200 кг молока.

Высокой молочностью отличаются остфрисляндские овцы, разводимые в Германии, Бельгии и Франции. За 5 – 6 месяцев лактации они дают 600 – 1000 кг молока

Лактационный период у овец длится 120-170 дней. При одинаковых условиях кормления и содержания максимум суточных удоев приходится на первый месяц лактации, доля молока за который может достигать 1/3 от общего удоя за лактацию. Если лактация приходится на пастбищный период, то в благоприятные по кормовым условиям годы молочность маток повышается на 15 – 20 % и более. В конце лактации удои снижаются до 100 – 120 г в сутки.

При оценке пожизненной молочной продуктивности овец выявлено, что удои повышаются до пятой лактации, а затем уменьшаются.

После отбивки ягнят от матери доение – единственный метод учета молочной продуктивности овец. Однако при ручном доении не всегда удается удалить все молоко из вымени, поэтому во многих странах перед доением овцам вводят окситоцин, способствующий усилению молокоотдачи.

1. 8 Лекция № 10,11(4 часа).

Тема: «Племенная работа в овцеводстве»

1.8.1 Вопросы лекции:

1. Генетические основы селекции.
2. Методы разведения овец.
3. Методы отбора в овцеводстве.
4. Межпородное разведение – скрещивание.
5. Промышленное скрещивание.

1.8.2 Краткое содержание вопросов:

1. Генетические основы селекции.

В крупных хозяйствах нашей страны разводят в основном только породистых и улучшенных овец. В среднем чистопородные овцы составляют примерно 81 %. Поэтому большое значение в настоящее время приобретают консолидация и дальнейшее совершенствование пород. В этих целях необходимо прежде всего изучить и оценить происходящие пороодообразовательные процессы и определить направление дальнейшей работы с породами.

Перед специалистами-овцеводами страны поставлена задача по ускоренному выведению новых пород овец, отвечающих требованиям промышленной технологии. Методами ускоренного селекционного процесса необходимо получить высокопродуктивных гибридов овец, устойчивых к различным паразитарным заболеваниям.

Генетические основы селекции овец. Поскольку овцы являются универсальными животными, а качество их продукции определяется многими показателями, то успех племенной работы в овцеводстве в значительной степени зависит от детального изучения наследственных качеств животных и наследуемости важнейших признаков и свойств в конкретном стаде.

Обычно селекционную работу проводят по всем основным хозяйственным признакам, но с учетом наиболее важных из них для конкретного стада, ибо максимальный эффект дает селекция по возможно меньшему числу признаков. Так, в тонкорунном овцеводстве наиболее важными признаками являются настриг шерсти и ее основные технологические свойства, а в мясо-шерстном полутонкорунном — скороспелость и выраженность мясных качеств, а также однородность шерсти и т. д.

Коэффициенты наследуемости основных хозяйственно полезных признаков в тонкорунном и полутонкорунном овцеводстве характеризуются следующими показателями: выход невыттой шерсти — 0,4; выход чистого волокна — около 0,42; оброслость головы — 0,56; толщина волоса — 0,3—0,6; густота шерсти — 0,5 до 0,8; длина штапеля — 0,52; число извитков на 1 см волоса — 0,36—0,47; дефекты шерсти (мертвый волос) — 0,53.

Степень прогресса в стаде в значительной степени зависит от величины селекционного дифференциала. Эффективного улучшения всего стада можно ожидать только в том случае, если животные, выделяемые в племенное ядро, обладают высокой продуктивностью и наследуемостью. Чем выше селекционный дифференциал, тем быстрее происходит улучшение породных и продуктивных качеств стада. Обычно наиболее высоким селекционным дифференциалом обладают бараны-производители,

поскольку они подвергаются более строгому и всестороннему отбору.

По большинству хозяйственно полезных признаков у овец отмечают и довольно высокие коэффициенты повторяемости, особенно по настригу и качеству шерсти. Однако следует учитывать, что романовские и каракульские овцы наиболее высококачественную продукцию дают только в молодом возрасте (овчины, шкурки).

В овцеводстве довольно резко выражена как положительная, так и отрицательная коррелятивная изменчивость по ряду признаков. Так, положительная корреляция существует между величиной тонкорунных овец и их шерстной продуктивностью (0,36), в то же время повышенная мясность животных оказывает отрицательное влияние на шерстную продуктивность и ее качество, поэтому мясо-шерстные овцы значительно уступают тонкорунным по качеству шерсти.

Повышенная складчатость кожи у мериносовых овец хотя и сопровождается повышением настрига шерсти, но приводит к уменьшению длины и снижению уравниности по толщине волоса. Выход чистой шерсти положительно коррелирует с длиной штапеля, но имеет отрицательную зависимость с числом извитков.

2. Методы разведения овец.

Чистопородное разведение применяется, как правило, в племенных хозяйствах и на племенных фермах. Оно обязательно и для неплеменных ферм, производящих специфическую продукцию, свойственную для овец данной породы. Так, скрещивание каракульских овец с баранами других пород может нанести ущерб качеству смушковых, а от романовских овец после скрещивания с баранами других пород невозможно будет получить ценную овчину.

Нецелесообразно проводить скрещивание таких овец, общее количество которых в породе ограничено. Это прежде всего прибалтийские полутонкорунные породы, карачаевская, сараджинская и др. Для предотвращения родственного разведения в племенных стадах применяется «освежение крови». В таких случаях в хозяйство завозят племенных производителей одной породы, но неродственных овцематкам.

Методы скрещивания. При скрещивании спаривают животных разных пород. Полученное в результате скрещивания потомство называют помесями или метисами. Помесное потомство существенно отличается от родителей. Скрещивание позволяет получить животных нового типа, с обогащённой наследственностью. В овцеводстве применяют все виды скрещивания.

Вводное скрещивание, или прилитие крови, применяют для усиления или исправления какого-либо свойства у овец одной породы путём их однократного спаривания с баранами другой породы, у которых это свойство хорошо выражено. К прилитию крови целесообразно прибегать для увеличения длины, изменения толщины, повышения густоты шерсти, улучшения экстерьера овец и повышения их живой массы и скороспелости.

Промышленное скрещивание распространено на неплеменных фермах для получения пользовательских животных. Обычно спаривают представителей двух или нескольких пород. Это позволяет, используя явление гетерозиса, повысить шерстную и мясную продуктивность овец без увеличения расхода кормов. Промышленное скрещивание всё шире применяется в скороспелом мясошерстном овцеводстве.

Воспроизводительное, или заводское, скрещивание используется при создании новых пород. Оно называется простым, если при этом используют животных двух исходных пород, и сложным когда в скрещивании участвуют особи трёх и более пород. Получив помесей первого и второго поколений, их затем после строгого отбора и индивидуального подбора разводят «в себе» в условиях достаточно хорошего кормления и содержания. Воспроизводительное скрещивание широко применялось в нашей стране для создания овец тонкорунных и полутонкорунных пород.

Поглотительное, или преобразовательное, скрещивание состоит в последовательном скрещивании в ряде поколений помесных маток малопродуктивной породы с баранами высокопродуктивной породы. При этом свойства животных улучшаемой породы поглощаются или вытесняются свойствами особей другой, улучшающей породы. Поглощение ведётся до получения животных, не отличающихся по основным показателям продуктивности и внешнему виду от животных улучшающей породы. В частности, тонкорунно-грубошерстные помесные животные пятого, а в особенности шестого поколения по своей продуктивности не отличаются от тонкорунных овец.

Гибридизация - спаривание животных разных видов. В овцеводстве впервые этот метод применил М.Ф. Иванов. Он спаривал диких баранов муфлонов с мериносowymi матками и получил положительные результаты.

Гибридизацию, как правило, проводят по методу вводного скрещивания до получения гибридов с $7/8 - 15/16$ долей крови домашних овец и $1/8 - 1/16$ долей крови диких баранов. От диких баранов получают только полукровных животных, а затем их спаривают с производителями материнской породы, и только помесей желательного типа разводят «в себе».

Гетерозис – это проявление у помесей большей энергии роста, конституциональной крепости, выносливости, жизнеспособности и более высокой продуктивности по сравнению с исходными породами. Гетерозис в наибольшей степени выражается лишь у помесей первого поколения, а затем заметно затухает или совсем исчезает.

На разных этапах племенной работы методы разведения сельскохозяйственных животных изменяют в зависимости от требований народного хозяйства на продукцию, назначения стада (племенное и пользовательное), уровня продуктивности животных, применяемой технологии и других факторов.

3. Методы отбора в овцеводстве.

Племенная работа – это комплекс организационно-хозяйственных и селекционных мероприятий, обеспечивающих повышение племенных и продуктивных качеств животных. Она заключается в применении различных методов разведения, отбора и подбора для получения новых поколений хозяйственно более ценных животных. Племенная работа может быть эффективна только при полноценном кормлении и хорошем содержании овец.

Совершенствование овец осуществляется на основе отбора лучших животных. Отбор это начальный этап селекции, заранее намеченных задач. Цель отбора заключается в выделении лучших животных для дальнейшего воспроизводства; удалении, продаже и реализации на мясо худших животных; разделении овец на группы по их конституционально-продуктивным качествам для проведения в последующем направленного подбора и организации соответствующего кормления.

Отбор по происхождению. Происхождение, или родословная, важный показатель отбора овец при их разведении. Знание происхождения, дополненное характеристикой индивидуальных свойств и результатами проверки по качеству потомства, обеспечивает наиболее правильный отбор. Такой отбор широко используется для баранов-производителей, так как от каждого из них получают сотни, а иногда и тысячи потомков.

Отбор животных по происхождению проводят на основе оценки их родословной. Практикой подмечено, что животное, полученное от высокопродуктивных родителей, чаще способно давать хороший приплод, чем животное, происходящее от низкопродуктивных предков. Наиболее эффективная форма отбора по происхождению – оставление на племя молодняка, полученного от элитных и первоклассных родителей. Такой молодняк обычно формируют в отдельные отары, создают ему более благоприятные условия и широко используют для дальнейшего разведения.

Отбор по продуктивности. Значение каждого показателя продуктивности,

оцениваемого при отборе, различных в зависимости от направления овцеводства, условий разведения животных и назначения стада – племенное или неплеменное. Поэтому при отборе животных в одних случаях главное внимание обращают на шерстные качества при достаточно крепкой конституции, в других – на скороспелость и мясные качества, в третьих – на высокую продуктивность при одновременно высокой способности передавать свои ценные качества по наследству и т.д.

Отбор по конституции и экстерьеру. Значение экстерьера и конституции определяется тем, что от них зависят мясная, шерстная и другие виды продуктивности, плодовитость, жизнеспособность и качество приплода.

По экстерьеру и внешним формам животного, обусловленным его внутренним телосложением, составляют представление с конституции. Так узкая и неглубокая грудь указывает на слабое развитие легких и сердца, а угловатые формы тела – на слабое развитие жировой ткани и подножной клетчатки, тонкие ноги – на развитый костяк, а повышенная извитость шерсти (маркирт) на тонкий костяк и тонкую кожу и т.д. Конституционально-крепкие животные способны стойко передавать по наследству признаки высокой продуктивности. Поэтому овцы всех направлений продуктивности должны иметь крепкую конституцию.

Отбор по живой массе. Живая масса зависит от породы, пола, состояния упитанности, возраста. Животные пород шерстно-мясного, а тем более мясошерстного направления имеют живую массу больше, чем шерстного направления. Независимо от породы с возрастом живая масса увеличивается, баранчики превосходят ярок, а упитанные животные имеют большую массу. Во всех случаях овец с большой живой массой приводит одновременно и увеличению настрига крупных овец в пределах стада, как правило, имеют более крепкую конституцию, лучшее здоровье и хорошую выносливость. Живую массу определяют взвешиванием. При этом необходимо учитывать, что для племенных целей молодняк взвешивают при рождении, отбивке, в годовом и 1,5 летнем возрасте, а взрослых овец – осенью.

Отбор по настригу. Нاستриг невытой шерсти у овец колеблется широких пределах, т.е. обладает высокой изменчивостью, что свидетельствует о больших возможностях отбора по этому показателю. В последние годы большинство хозяйств перешло к оценке шерстной продуктивности племенных овец по настригу чистой шерсти. Особое значение этот показатель приобретает при отборе баранов-производителей. В зонах развитого овцеводства тонкорунные бараны с настригом чистой шерсти менее 5 кг к использованию не допускаются. Систематический отбор на племя самых многшерстных овец и выбраковка малошерстных животных позволяют сравнительно быстро повысить шерстную в любом стаде.

Отбор по качеству шерсти. Кроме отбора по массе руна в мытом виде проводят отбор животных по густоте, длине, уравниности, количеству жира и другим качествам шерсти.

По густоте шерсти. Густота шерсти в значительной степени влияет на величину настрига шерсти у овец. У тонкорунных овец на 1 см² кожи растет от 4 до 12 тыс. шерстинок.

При отборе овец по густоте шерсти следует учитывать, что она зависит не только от количества шерстинок, но и от их тонины и длины. При одинаковом количестве шерстинок на 1 см² более тонкая шерсть будет казаться менее густой, чем более грубая, а короткая – более густой, чем длинная.

Длина шерсти – важный признак, определяющий шерстную продуктивность. Повышение длины шерсти с 7 до 8 см в среднем по стаду при прочих равных условиях увеличивает настриг на 14-18%. Кроме того, длина шерсти – важный технологический признак, который обуславливается способом переработки и соответствующим требованиям промышленности. При оценке этого признака за основу берется годовой рост шерсти. При отборе баранов – производителей и лучших элитных животных длина шерсти

оценивается на бочке, спине, ляжке и брюхе, так как уравниенность ее по руно имеет большое значение. Например у тонкорунных овец разница в длине шерсти на разных участках. Толщина не должна превышать 0,5-1 см. Для племенных целей необходимо иметь таких животных, у которых наиболее удачно сочетаются хорошая густота и длина шерсти.

Извитость шерсти характеризуется формой извитков и их равномерностью на внутренней поверхности штапеля. Ясно выраженные извитки по всему штапелю указывают на однородность шерсти по тонине и длине волокон.

Тонина шерсти – важный технологический признак. Чем тоньше шерсть, тем лучше качество изготавливаемых тканей. Однако это не значит, что нужно всегда стремиться утонению шерсти. Сильное утонение связано с ослаблением конституции и уменьшением настрига шерсти (пример в Германии преследовалась тонина шерсти). На Лондон ранние очень ценилась тонкая шерсть за 1 кг платили 10 руб. – золотом. Столь высокая цена побуждала овцеводов все внимание при подборе животных обращать только тонину шерсти, которая привела полностью вырождению.

Для каждой породы определены требования по этому признаку.

Уравниенность шерсти в руно определяется по разнице в тонине волокна на бочке и ляжке. Уравненное руно должно иметь разницу в тонине не более одного качества, или 2-2,5 микрон.

Жиropот определяет качество шерсти. При отборе следует обратить внимание на количество и цвет жиропота. Хорошо смазанные жиропотом шерстинки, как правило крепче, эластичнее и обладают лучшими прядильными качествами. Однако стремиться к обильному содержанию жиропота не следует, т.к. это снижает эффективность использования овцами корма и уменьшает выход мягкой шерсти.

Количество и цвет жиропота определяется при осмотре штапелей шерсти развернутого руна. Лучшими является белый цвет жиропота, а так же светло-кремовый и кремовый, а худшими – желтый, оранжевый, зеленый. При нормальном содержании жиропота наружный штапель имеет замкнутый вид.

Отбор и оценка племенных качеств баранов. Окончательная форма отбора баранов для племенных целей – оценка их по качеству потомства. В племенных хозяйствах стадо баранов – производителей комплектуют в основном путем отбора и выращивания их от маток собственного стада, а в товарных – за счет приобретения из племенных хозяйств.

В тонкорунном и полутонкорунном овцеводстве отбор баранов начинают в 2-3 недельного возраста. В это время явно непригодных на племя баранчиков настригают. Второй раз осматривают и отбирают баранчиков при отъеме их от маток. Лучших баранчиков выделяют в ремонтную группу в количестве, превышающем потребность в 5-6 раз. Следующий отбор баранчиков производят в возрасте 1 года на основании данных о происхождении, индивидуальной бонитировки, учета настрига шерсти и живая масса. Лучших из числа ремонтных баранчиков ставят на проверку по качеству потомства. По результатам которой проводят окончательный отбор и назначение в случку. Проверку по качеству потомства производят на матках I класса одного возраста (не моложе 2,5 года). Основным методом оценки их наследственных свойств – сравнение продуктивности показателей потомства каждого барана со средними показателями потомства всех проверяемых баранов в пределах одной отары маток. Для проверки по качеству потомства определяется такое количество маток, чтобы от каждого проверяемого барана было поучено к годовому возрасту молодняка не менее 30 ярок. При селекции тонкорунных и полутонкорунных овец учитывается количество признаков. Однако в основу оценки наследственных качеств баранов – пр-ей следует брать только самые главные из них, характеризующие продуктивные свойства и качества потомства. Это живая масса настриг немытой и чистой шерсти, густота, длина, тонина, извитость, количество и цвет жиропота, а также мясная продуктивность и оплата норма прироста массы тела. При этом имеет значение степень выраженности у потомства указанных признаков, насколько они

соответствуют требованиям для данной породы, заводского типа, линии, предусмотренными в инструкциях по бонитировке тонкорунных и полутонкорунных пород. Классный состав потомства как суммарный показатель хозяйственно-полезных качеств, служит основным критерием племенных достоинств проверяемых баранов. Чем больше в потомстве животных желательного типа (элита и I класс) тем выше племенные достоинства проверяемых баранов.

Бараны дающие 60% и выше потомств класса элита и I класса, считается хорошими по наследственным качествам.

Отбор маток для формирования селекционных групп. Для получения овец с высоким генетическим потенциалом в племенных стадах создаются селекционные группы. Отбор маток в селекционную группу производится на основе индивидуальной бонитировки, учета продуктивности, происхождения и качества потомства.

Матки селекционной группы должны превышать требования желательного типа (I класс) по живой массе на 15-20 %, по настригу чистой шерсти – на 20-25%, а матки селекционного ядра – соответственно на 20-30 и 30-35%.

Наиболее ценные по наследственным качествам и внешним признакам матки формируются в отдельное селекционное ядро, которое используется для селекции, обеспечивающей получение животных с заранее определенным сочетанием признаков.

Селекционную группу и селекционное ядро ремонтируют преимущественно за счет ярок, происходящих от маток этих групп. При этом для ремонта отбираются дочери повторяющие или превышающие продуктивность своих матерей. Следует отметить, что в племенных хозяйствах все матки должны отбираться по качеству потомства. При этом для разведения оставляются матки, давшие за два ягнения от разных, но хороших баранов плохое потомство, выводятся из хозяйства.

4. Межпородное разведение – скрещивание.

В отличие от чистопородного разведения при скрещивании спаривают животных, принадлежащих к разным породам. Потомство, полученное в результате скрещивания, называют помесями, или метисами. Скрещивание применяют в тех случаях, когда целью разведения овец того или иного стада является прежде всего получение от них возможно более высокой продуктивности, даже если эти животные и не обладают большой стойкостью в передаче своих качеств по наследству. При скрещивании можно создать для помесей такие условия выращивания, при которых их развитие шло бы в направлении формирования нужных для человека типов животных.

Различают следующие виды скрещивания:

- поглотительное,
- воспроизводительное,
- промышленное,
- переменное
- вводимое.

Поглотительное, или преобразовательное, скрещивание заключается в том, что малопродуктивных маток одной породы скрещивают последовательно в ряде поколений с баранами другой, высокопродуктивной породы. Таким путем свойства улучшаемой (низкопродуктивной) породы поглощаются или вытесняются свойствами улучшающей породы. В зависимости от стадии скрещивания различают помесей I поколения (или I генерации), II, III и т. д. Такое скрещивание продолжают до тех пор, пока не получают животных, по основным показателям продуктивности сходных с животными улучшающей породы. Широкое распространение поглотительное скрещивание получило в нашей стране при улучшении грубошерстных овец тонкорунными и полутонкорунными. Скорость преобразования зависит от характера шерстного покрова у овец грубошерстной

(улучшаемой) породы, качества чистопородных производителей и тщательности отбора и подбора животных. Установлено, что при скрещивании грубошерстных овец, отличающихся хорошим качеством шерсти с большим количеством пуха, тонкой остью, при отсутствии мертвого волоса, с чистопородными тонкорунными баранами, стойко передающими свои качества по наследству, преобразование стада достигается в более короткие сроки и для получения помесей с тонкой шерстью требуется меньшее число поколений.

Примером сложного воспроизводительного скрещивания может служить опыт работы по выведению алтайской породы. Порядок скрещивания в этом случае был следующим. Местных тонкорунных маток (сибирский меринос) скрещивали с баранами породы американской рамбулье; помесей их спаривали частично с баранами породы австралийский меринос и частично с баранами кавказской породы. Животных желательного типа в дальнейшем разводили «в себе». Воспроизводительное скрещивание, как и любое другое, дает эффект лишь при условии тщательного отбора и подбора, правильного выращивания молодняка и умелого использования родственного спаривания.

Вводное скрещивание, или прилитие крови, применяют в том случае, если требуется усилить или улучшить какое-либо одно или несколько качеств при сохранении основных свойств, присущих животным улучшаемой породы. Работу организуют так: чистопородных маток данного стада скрещивают с баранами другой породы, а полученных ярок покрывают чистопородными баранами материнской породы. Баранчиков I поколения выращивают и используют для спаривания с матками стада. Повторно помесей с баранами улучшающей породы, как правило, не спаривают. Особое внимание обращают на тех помесей, которые более полно унаследовали от улучшающей породы желаемые свойства. Чтобы закрепить у помесей полученные желательные качества, можно применять родственное спаривание, но нужно обязательно вести строгий индивидуальный подбор и учет. Чаще всего прилитие крови используют для повышения живой массы и скороспелости, улучшения длины, толщины, густоты шерсти, исправления у овец экстерьерных недостатков. Во всех случаях бараны-производители должны обладать хорошо выраженным нужным признаком и способностью стойко передавать его потомству.

Многочисленные материалы по межпородному скрещиванию в тонкорунном овцеводстве свидетельствуют о том, что скрещивание животных разных пород является важным резервом увеличения количества производимой шерсти без ухудшения ее физических свойств и других качественных показателей по сравнению с чистопородным разведением пород, участвующих в скрещивании.

Степень улучшения шерстности и мясности у помесей в значительной мере зависит от сочетаемости пород, участвуя можно изготовить значительно больше шерстяных изделий; чем из шерсти годового настрига неулучшенной грубошерстной овцы.

В том случае, если для поглотительного скрещивания используют только одну улучшающую породу, его называют простым поглотительным; если несколько — то сложным поглотительным скрещиванием. Примером сложного поглотительного скрещивания может быть такое, когда грубошерстных маток сначала спаривают с тонкорунными баранами породы советский меринос, помесей же I и последующих поколений спаривают также с тонкорунными баранами, но уже кавказской или грозненской породы».

Воспроизводительное, или заводское, скрещивание применяют при создании новых пород и породных групп. При этом используют: а) скрещивание животных 2 пород для получения помесей I поколения; б) скрещивание помесей I поколения с отцовской породой и получение помесей II поколения (а если надо и III); в) скрещивание животных разных поколений, происходящих от баранов одной породы, с баранами третьей или даже-четвертой породы для получения сложных 3—4-породных помесей.

Высокопродуктивных помесных маток, отвечающих требованиям желательного

типа и сочетающих в себе ценные качества» исходных пород, покрывают помесными баранами такого же качества и происхождения. Данный метод называется разведение» помесей «в себе». Чтобы закрепить в потомстве качества животных нового, желательного типа, появившегося среди помесей*, иногда применяют близкородственное спаривание. Таким путем создают линии и семейства. Помесей, не отвечающих поставленным требованиям, или выбраковывают, или перекрывают баранами исходной улучшающей породы или помесными баранами желательного типа. Бели при воспроизводительном скрещивании используют только 2 исходные породы, оно называется простым, а если 3 и более — сложным.

Примером простого воспроизводительного скрещивания является опыт работы при скрещивании. Лучшие результаты получаются при скрещивании генетически более разнородных пород.

Длительное время в нашей стране проводили опыт по использованию баранов австралийский меринос в вводном скрещивании с овцами отечественных тонкорунных пород. В результате было установлено, что скрещивание способствовало повышению настрига и качества шерсти у помесей по всем материнским породам.

Промышленное скрещивание применяют на неплеменных фермах для получения исключительно пользовательных животных. Сущность его сводится к скрещиванию животных 2 или нескольких пород и получению помесей для производства мяса, шерсти и т. д. Эффект от такого скрещивания получают в самых разнообразных кормовых и природно-климатических условиях. Такой прием позволяет увеличивать шерстную и мясную продуктивность овец. При использовании баранов многоплодных овец (романовская) значительно увеличивается и плодовитость помесей. Промышленное скрещивание позволяет использовать явление гетерозиса, то есть способность помесей развиваться быстрее и достигать лучших показателей продуктивности по сравнению с родительскими формами при том же расходе кормовых средств. Промышленное скрещивание широко используют в мясо-шерстном овцеводстве.

Переменное скрещивание — это разновидность промышленного скрещивания, когда в определенной последовательности используют баранов нескольких пород, принадлежащих в одном направлении продуктивности. Если для переменного скрещивания используют только 2 породы, его называют простым, а при большем числе пород — сложным.

Переменное скрещивание часто применяют при разведении овец тонкорунного направления. Например, маток породы советский меринос скрещивают с баранами кавказской породы, полученное потомство — с баранами грозненской породы, а их потомков, в свою очередь, вновь спаривают с баранами советский меринос. Такой метод разведения называется сложным трехпо-родным переменным скрещиванием. Установлено, что переменное скрещивание в сочетании с отбором и подбором позволяет получить более высокопродуктивное потомство как вследствие сочетания ценных особенностей пород, так и в результате явления гетерозиса.

5. Промышленное скрещивание.

Суть его сводится к использованию для увеличения производства мяса, шерсти и т.д. помесей I поколения, полученных при скрещивании животных двух (простое) или нескольких пород (сложное скрещивание).

Помеси I поколения обычно характеризуются высокой энергией роста, хорошей оплатой корма продукцией. Хорошие результаты дает промышленное скрещивание тонкорунных маток со скороспелыми полутонкорунными мясо-шерстными баранами. Помеси от таких скрещиваний наряду с хорошей мясностью имеют кроссбредную или кроссбредного типа шерсть, идущую на изготовление весьма ценных тканей и трикотажных изделий.

К настоящему времени в нашей стране в основном завершен

породообразовательный процесс в овцеводстве; почти все поголовье (99,5%) представлено породными овцами, а удельный вес чистопородных овец в общем поголовье породных составляет более 75%.

Созданы все предпосылки для широкого внедрения промышленного скрещивания. Эффективность промышленного скрещивания базируется не только на проявлении в ряде случаев гетерозиса, но и на том, что зачастую помеси от таких скрещиваний обладают хорошим сочетанием ценных свойств, присущих обоим скрещиваемым породам.

Для увеличения производства продукции овцеводства, и прежде всего баранины, необходимо шире и полнее использовать генетический потенциал плодовитости и полиэстричности овец романовской породы и финский ландрас при промышленном скрещивании. В связи с малочисленностью овец этих пород в нашей стране рекомендуется их использовать в трехпородном промышленном скрещивании последующей схеме.

Маток с тонкой, полутонкой и грубой шерстью (кроме смушковых) скрещивают с баранами породы финский ландрас. Помесных баранов I поколения после стрижки поярковой шерсти откармливают и сдают на мясо. Помесных ярок с генетически обусловленной повышенной плодовитостью скрещивают с баранами скороспелых мясошерстных пород. Использование помесных маток в трехпородном скрещивании нередко сопровождается гетерозисом, который называют материнским. Полученных трехпородных помесей после стрижки поярковой шерсти откармливают и сдают на мясо.

Гибридизация — скрещивание животных, принадлежащих к разным видам.

1. 9 Лекция № 12 (2 часа).

Тема: «Методы разведения овец»

Вопросы к лекции

1. Чистопородное разведение овец

2. Скрещивание овец

1.9.2 Краткое содержание вопросов:

1. Чистопородное разведение овец

Методами разведения овец называют систему подбора животных с учетом их видовой, породной и линейной принадлежности. В овцеводстве применяют три основных метода разведения: чистопородное, скрещивание и гибридизацию.

Чистопородное разведение. Это спаривание животных одной породы. Считается важным средством консолидации породы и является обязательным на племенных заводах и на племенных фермах. При его применении есть возможность не только сохранить породные качества овец, но и усилить их способность устойчиво передавать потомству свои признаки.

Не родственное разведение (аутбридинг) характеризуется тем, что животные, которых парят, не имеют общего предка до четвертого поколения. При этом ценные продуктивные качества и наследственные задатки животных стойко передаются потомству присущие им признаки усиливаются.

Родственное спаривание (инбридинг), особое тесное, как например, отца с дочерью, брата с сестрой, снижает плодовитость овцематок, ягнята рождаются недоразвитыми, плохо растут, развиваются и откармливаются. Поэтому применение родственного разведения овец в пределах четвертого поколения запрещено. И только в отдельных случаях (при создании новых линий, типов или пород для закрепления выдающихся качеств) допускается родственное разведение овец.

Однако длительное чистопородное разведение в стаде приводит к застою и не способствует росту показателей производительности. Подтверждением этого является уровень шерстной продуктивности овец во многих хозяйствах степной зоны Украины, где

разводят преимущественно чистопородных асканийских овец. Средний настриг шерсти здесь за последние годы составляет 3,4 — 4,0 кг, или 1,3 — 1,6 кг в мытом виде. Главной причиной столь низкой продуктивности тонкорунных овец в этих районах является чрезмерное увлечение чистопородным разведением и явная недооценка скрещивания.

Разведение овец по линиям. Линией называется группа животных в породе, родственная с производителем (родоначальником), по имени которого она называется и имеет определенную ценность для племенной работы. Различают генеалогические и заводские линии, которые являются структурными элементами породы. К заводской линии принадлежат животные, происходящие от высокоценного родоначальника, продуктивные признаки и тип которого поддерживают в ряде поколений целенаправленным отбором и подбором с использованием умеренного (III - IV), а иногда и тесного (I - II, II - II) инбридинга.

Главная цель разведения по линиям состоит в том, чтобы наследственно закрепить и далее развивать ценные качества родоначальника линии, а через нее — во всей популяции породы. Это достигается тремя основными путями: превращением ценных качеств отдельных индивидуумов на групповые; разделением породы на группы, которые отличаются друг от друга; поиском лучших сочетаний линий для выведения новых.

Новые линии закладываются проведением спаривания проверенного по потомству производителя с ценными качествами для последующей племенной работы с матками, сходными с бараном по основным селекционным признакам. Желательно, чтобы эти матки в определенной степени были родственны с бараном. Можно использовать и неродственных маток. Среди потомков такого спаривания отбирают для дальнейшего разведения высокопродуктивных животных, наиболее сходных по своим качествам с бараном-отцом. Родоначальником новой линии может быть только тот производитель, который дал лучшее потомство с хорошо выраженным желательным его типом.

Желательно иметь в отаре 5 - 6, а в породе 8 - 10 неродственных между собой линий. Кроме того, для углубленной племенной работы с линиями и усиление селекционных признаков, характерных для линейных животных, целесообразно в каждой заводской линии иметь не менее 80 - 100 маток и нужное количество баранов.

При разработке генеалогической структуры асканийской породы было выявлено значительное количество родственных спариваний во всех ее ведущих линиях. В некоторых линиях инбридинг привел к росту гомозиготности. Так, для линии 1/24 коэффициент Райта, исчисленный по материалам Государственных племенных книг, составил 16,9 %, для линии 952 — 14,2 %, линии 1106 — 10,3 %. Анализ показывает, что рост гомозиготности в линиях не зависит от количественного соотношения родственных и неродственных спариваний, а обусловлен преимущественно вариантами ведения линий и схемами спариваний. Так, если линия с момента ее образования велась достаточно широко и с первых поколений в ней использовалось несколько потомков родоначальника, коэффициент гомозиготности был очень незначительным. Примером может быть линия барана № 758. В первом поколении этой линии использовали четырех продолжателей из числа сыновей родоначальника. Степень инбридинга здесь составлял около 3 %. Итак, вариант «широкого» ведения линий из первых поколений оказался пригодным для сохранения гетерозиготности, что соответствует методическому принципу М.Ф. Иванова относительно получения в стаде «однородных генотипов», но не совсем гомозиготных.

Если у потомков наблюдается ослабление конституции, снижение уровня производительности, нужно подбирать породы в других хозяйствах или регионах. Этот способ называют «освежением крови».

2. Скрещивание.

Осеменяют овец разных пород, видов, а полученный молодняк называют помесным. Помеси, особенно первого поколения, характеризуются высокой жизнеспособностью, крепостью конституции и высокой производительностью.

Скрещивание является эффективным средством улучшения продуктивности животных, совершенствования существующих и создания новых пород.

Вводное (поглощающее) скрещивание применяют для получения пород животных, а также для коренного улучшения признаков одной породы (группы) признаками другой породы — заводской. При этом малопродуктивных овцематок осеменяют с высокопродуктивными баранами породы. Помеси і покоління (овцематок) скрещивают с производителями заводской породы, в результате чего получают помесей второго поколения (3/4-кровных) и т.д. (рис. 4.2).

Скрещивание продолжают до получения помесей, лучших по качеству от животных породы. В практике овцеводства в бирне скрещивания завершается получением помесей 3 — 4-го поколений. После этого их разводят «в себе». Этот метод скрещивания широко применяли в нашей стране для массового улучшения местного поголовья овец (преобразования грубошерстных овец в тонкорунных).

Таблица 4.8. Условия и цель применения различных методов скрещивания

Вид схрещування	Кількість генерацій схрещування	Мета
<i>Породополішувальні методи</i>		
Вбирне (поглинальне)	До 4 – 5-го покоління	Поліпшення низькопродуктивних порід через виведення високопродуктивних заводських ліній
Ввідне (прилиття крові)	2 – 4-те покоління з наступним розведенням «у собі»	Поліпшення окремих порід без докорінної зміни спадковості материнської породи
Відтворювальне (заводське)	До отримання масиву тварин бажаного типу, що розводиться «у собі»	Створення нових порід бажаним комплексом і вивітку ознак продуктивності
<i>Породокористувальні методи</i>		
Промислове просте	До першого покоління	Використання ефекту схрещування і гетерозису і експлуатації помісних рин
Промислове перемінне	До отримання бажаної кровності	Закріплення ефекту схрещування і гетерозису в поколіннях
Природно-лінійна гібридизація	До отримання бажаної структури генотипу гібрида	Використання ефекту розриву при міжпородній міжлінійній і породно-лінійній гібридизації




Рис. 4.2. Схема вбирного (поглинального) схрещування: порода А — полішувана; порода В — полішувальна

Вводное (прилитие крови) скрещивание (рис. 4.3, а) применяют для улучшения некоторых качеств животных. Этого достигают умелым выбором поліпшувальної породы, однократным использованием ее производителей для скрещивания с вівцематками поліпшувальної породы. Помесных ярков затем скрещивают в одном или двух поколениях с производителями поліпшувальної породы. Далее помесей разводят «в себе» (рис. 4.3, б).




Рис. 4.3. Схема вводного скрещивания

Начинать вводное скрещивание можно лишь тогда, когда четко определена его цель. Эффект скрещивания зависит от того, насколько правильно выбрана поліпшувальну породу. По типу она должна быть близкой к поліпшувальної породы и иметь четко выраженные признаки, которые надо улучшить.

Сейчас вводное скрещивание широко применяют в тонкорунном овцеводстве для увеличения длины, выхода чистой шерсти, улучшения качества жиропота. Как поліпшувальні широко используют австралийские породы овец — австралийский меринос, пол - варс и австралийский коридель. Все они имеют длинную шерсть, жиропот отличного качества и выход мытой шерсти до 70 % и как результат — высокую вовнову производительность.

Совместными усилиями ученых и специалистов племзаводов «Ас - канія-Нова», «Красный чабан» и «Атманай» создан новый перспективный тип овец чистопородным разведением и вводным скрещиванием маток асканийской тонкорунной породы с австралийскими и австрало-ставропольскими баранами, который апробирован в 1993 г., а племзавод «Красный чабан» признан лучшим хозяйством и селекционным центром нового таврийского типа овец. Здесь сосредоточено лучшее стадо мериносов за всю историю развития тонкорунного овцеводства в Украине. Его генетический потенциал продуктивности уступает только ведущим популяциям мериносов Австралии и Аргентины.

Прилиття крови австралийского мериноса асканийский породе на держплемзаводах «Красный чабан», «Аскания-Нова» и «Атма - най» позволило повысить настриг шерсти в чистом волокне на 12 — 15 %. При этом значительно улучшилось качество шерсти.

В тонкорунном овцеводстве для улучшения мясных качеств и увеличение длины шерсти применяют вводное скрещивание с напівтонкорунними мясо-вовновими баранами пород линкольн, ромни-марш, асканийские кросбреди и асканийские черноголовые, новозеландский коридель. При вводном скрещивании овец цигайской породы с баранами


породы ромни-марш получено в породе мясо-вовновий тип, который получил название приазовский.

В организации вводного скрещивания нужно особое внимание уделять проведению испытаний поместных производителей по качеству потомства.

Воспроизводимое (заводское) скрещивание. Используют для создания новых пород, типов и линий на міжпородній основі. Его еще называют простым, если в нем участвуют две породы, и сложным, когда используют три породы и более.

Условно в таком скрещивании можно выделить два этапа. На первом этапе скрещивают овец пород, выбранных для этого по типу поглотительного скрещивания (рис. 4.4, а). На втором этапе закрепляют и далее совершенствуют особей желательного типа. Этого достигают разведением «в себе» животных желательного типа в ряде поколений, применяя однородный подбор и родственное спаривание (рис. 4.4, б).

Простую форму этого метода было использовано, например, при выводе асканийской тонкорунной породы, когда использовали только две породы — южноукраинских мериносов и баранов породы американский рамбулье. Примером сложного от-ворювального скрещивания может быть вывод высокопроизводительного асканийского типа мясо-шерстных овец с кросбредною шерстью на основе скрещивания овцематок асканийской тонкорунной и цигайской пород с английскими и аргентинскими баранами породы линкольн.



бы

Рис. 4.4. Схема межпородного скрещивания

Промышленное скрещивание. Применяют для получения пользовательских животных. Заключается в том, что маток одной породы спаривают с баранами другой и полученный от них приплод используют на мясо, ради чего и проводилось это скрещивание. Промышленное скрещивание может быть простым двопородным (овцематок одной породы спаривают с баранами второй, рис. 4.5, а), трипородным (помесных ярок спаривают с производителями третьей породы, рис. 4.5, б) и т.д. За трипородного скрещивания практикуют также спаривание чистопородных овцематок с поместными баранами (рис. 4.5, в).




Рис. 4.5. Схема промислового схрещування

Использованы для скрещивания производители по развитию и продуктивным качествам не должны уступать вівцематкам. Лучшие результаты имеют, когда материнская порода хорошо приспособлена к местным климатическим и кормовым условиям.

Промышленное скрещивание используют для повышения шерстной, мясной, молочной и других видов продуктивности овец. За такого скрещивания, особенно при сочетании отдельных пород и помесей первого поколения, может оказаться эффект гетерозиса, который выражается в лучшей швидкостиглості и высшей продуктивности помесей по сравнению с животными исходных пород. Однако проявления этих свойств у помесей возможны только при благоприятных условиях кормления и содержания.

В связи с разнообразием в Украине тонкорунных и полутонкорунных пород овец селекционную работу следует направлять на более эффективное сочетание пород как простого, так и сложного скрещивания и только после этого разворачивать промышленное скрещивание в производственных условиях.

Переменное скрещивания. Этот практический прием разведения овец был разработан на Северном Кавказе и Поволжье в 50-х годах XX века. Применение его было обусловлено тем, что ни одна порода, рекомендуемая для массового улучшения местных пород овец, не соответствовала требованиям и желанию пастухов. Поэтому в инициативных специалистов возникла мысль совместить в одном типе такие важные признаки тонкорунных овец, как размер (рост, живая масса), высокие качества шерсти, хорошая приспособленность животных к местным условиям. Тем более, что все эти качества были у разных типов и пород в соседних хозяйствах даже одного района (кавказская, ставропольская, грозненська, советский меринос и различные помеси).

Для переменного скрещивания используют две, три породы овец и более (рис. 4.6). В каждом поколении помесных маток скрещивают с чистопородными баранами другой породы, что обеспечивает длительное сохранение явления гетерозиса в каждом следующем поколении.

На рис. 4.7 приведены основные позиции схемы переменного скрещивания с участием трех пород овец — советский меринос, кавказская и ставропольская, применены в хозяйстве «Вторая пятилетка» Ипатьевской района Ставропольского края.

Помеси первого поколения от скрещивания маток породы советский меринос с баранами кавказской и ставропольской пород далее скрещивали с баранами этих пород, а также с баранами породы советский меринос. Сложные помеси за настригом, длиной шерсти и живой массой имели преимущества перед двопородни - мы помесями.




Рис. 4.6. Схема переменного скрещивания овец с участием асканийской пород и прекос




Рис. 4.7. Схема скрещивания трипородного

В ближайшем будущем, когда значительно увеличится количество чистопородных овец каждой породы, переменное скрещивание, бесспорно, будет применяться шире. Однако оно связано с определенными трудностями. В частности, не всегда легко достать производителей пород, нужных для работы. Нелегкой является и работа, связанная с определением результатов сочетания различных пород при скрещивании.

Гибридизация. В биологическом понимании означает удаленное, то есть межвидовые, скрещивания. Гибридами называют потомков от соития двух видов животных, а сам метод получения таких животных — гибридной. Впервые этот метод применил Н.Ф. Иванов. В 1927 г. в «Аскания-Нова» он начал работы по созданию горного мериноса. Для этого было использовано тонкорунных маток и барана-муфлона — представителя дикой формы овец. Гибриды первого поколения были более плодовитыми, но среди них попадались животные, похожие по экстерьеру, темпераменту из бара - ном-муфлоном, а за шерстью — с мериносами. Далее лучших бара - нов-гибридов скрещивали

с мериновыми матками. Помесей второго поколения, добрых за развитием и вовною производительностью, разводили «в себе», но во время войны (1941 — 1945) они исчезли.

Методом гибридизации дикого вида архара с овцами породы прекос (рис. 4.8) советский ученый Н.С. Бутарин и другие создали ценную тонкорунную породу — казахский архаромеринос.




Рис. 4.8. Схема выведения казахской породы архаромеринос гибридизацией диких овец с домашними

Для повышения жизнеспособности серых каракульских овец было проведено скрещивание их с диким бабатазьким бараном. Получены также гибриды домашних овец со снежным бараном, который живет в горах Карпат и на Таймыре.

Теоретики предполагают достижение в будущем «селекционного плато» с культурными породами, преодоление которого, вероятно, будет использовано как метод гибридизации. Эффект скрещивания при этом зависит от степени гетерозиготности полученного гибридного молодняка. Он повышается при использовании генетически разобщенных исходных родительских форм, відселекціонова - них до определенного уровня производительных признаков.

1. 9 Лекция № 13 (2 часа).

Тема: «Организация и техника разведения овец»

1.9.1 Вопросы лекции:

1. Эффективность различных сроков ягнения овец.
2. Подготовка к ягнению овец.

1.9.2 Краткое содержание вопросов:

1. Эффективность различных сроков ягнения овец.

Наиболее ответственной, сложной и трудоемкой работой в овцеводстве является ягнение. Оно происходит через 147–150 дней (в среднем) после плодотворного осеменения. Ягнение проводят зимой, весной, иногда поздней осенью, а соответственно случают овец в августе-сентябре. Существуют 2 типа ягнения: зимнее ягнение и летнее ягнение. Каждый из типов ягнения имеет свои преимущества и недостатки. Чаще всего зимнее ягнение проводят в январе-феврале.

Зимнее ягнение имеет ряд преимуществ по сравнению с весенним ягнением. Поскольку случка овец происходит в августе-сентябре, овцы обеспечены всеми необходимыми кормами, а соответственно хорошо упитанны. Также в этот период матки имеют большую оплодотворяемость и более высокую плодовитость. Ягнята к весне могут более эффективно использовать пастбища.

Весеннее ягнение имеет отрицательные моменты. Из-за неустойчивой погоды ягнята могут простудиться. Также родившиеся весной ягнята не могут эффективно использовать пастбища, в результате чего они не получают лучших кормов и к осени имеют меньшую упитанность.

2. Подготовка к ягнению овец.

Подготовка к ягнению начинается заблаговременно. За 10–15 дней до начала приступают к утеплению и оборудованию родильного отделения. Если родильного отделения нет, соответствующим образом оборудуют овчарню. Её разделяют на секции: средняя служит родильным отделением, вторая — для содержания сакманов, третья — для суягных маток. Для предупреждения заболеваний ягнят, особенно простудных, необходимо, чтобы в овчарне не было сырости и сквозняков. Хорошим поглотителем влаги и утеплителем является соломенная подстилка. Рекомендуется заготавливать солому для подстилки из расчёта 120–150 кг на матку. Успешному проведению ягнения способствует обеспеченность необходимым инвентарем (решетки, щиты, фонари, ведра, умывальники, групповые поилки для ягнят, полотенца, шпагат, аптечки с медикаментами для оказания первой помощи животным и т.д.).

До начала ягнения в родильном отделении устанавливают индивидуальные клетки-кучки, клетки для младших сакманов. Размер индивидуальной клетки для овец крупных пород — 1,5 м², для овец средних и мелких пород — 1–0,8 м². Температура воздуха в родильном отделении не должна опускаться ниже 3–5 °С и подниматься выше 10–12 °С при относительной влажности 75–80%.

Помощь матке при ягнении. Ягнение происходит в родильном отделении, где пол обильно застлан чистой свежей соломой. В течение всего периода ягнения в родильном отделении дежурят члены чабанской бригады, они внимательно следят за матками во время ягнения.

Если матка беспокоится, часто ложится, оглядывается назад, слегка стонет — это признаки наступающих родов, беспокоить её не следует. При правильных родах вскоре после потуг появляется пузырь, наполненный жидкостью. Он лопается, и показываются передние ножки и лежащая на них мордочка ягненка. Это нормальное положение плода. Если матка здорова и не истощена, такие роды, как правило, завершаются благополучно и вмешательства не требуют. Если ягнение затянулось, матка сильно стонет — чабан должен оказать ей помощь. Чтобы она была эффективной, в первую очередь надо определить положение плода. Для этого вымытую, продезинфицированную и смазанную вазелином или маслом руку осторожно вводят во влагалище.

Осложняют роды следующие неправильные положения плода:

Ножки идут впереди, голова завернута на спину или подвернута под ножки.

Впереди одна головка, ножки под грудью.

Ягненок идет вперед задом, сподогнутыми под него ножками.

У ягненка правильное положение, но он слишком большой.

В этих случаях в промежутках между потугами плод отодвигают вглубь матки и бережно выправляют его положение. Затем осторожно потягивают ягненка за ножки при появлении потуг. Если он идет задом, под подогнутые ножки продевают крепкую тонкую веревочку и подтягивают ранее плод вовремя потуг.

В течение трех часов после ягнения матка должна освободиться от последа. Следует помнить, что послед нельзя вытягивать или обрезать, он должен отойти сам. Его убирают в мешок, а затем сжигают или закапывают. Место, где происходили роды, очищают и дезинфицируют. В том случае, когда послед не отделяется в течение 6 ч, прибегают к помощи

ветеринарных специалистов.

Уход за новорожденными ягнятами. Новорожденные ягнята нуждаются в заботливом уходе с момента рождения. Ягненок может родиться слабым, иногда без признаков жизни. В этом случае нужно немедленно очистить мордочку от слизи, затем открыть рот и сильно вдуть в него воздух. Если это не помогает, применяют искусственное дыхание: ягненка кладут на спину, вытягивают передние ножки, а затем сгибают и прикладывают их к груди.

После ягнения пуповина у ягненка обычно обрывается сама, при необходимости ее обрезают на расстоянии 8–10 см от брюха и прижигают раствором йода или 5%-ым раствором креолина.

Сразу после рождения ягненка надо позаботиться о том, чтобы он быстро обсох и не простудился, а мать его облизала. Матка, облизав новорожденного, хорошо «запоминает» его запах, по которому она впоследствии безошибочно отделяет своего ягненка от чужого. Для обогрева новорожденных используют лампы-термоизлучатели марки ЗС-3. Они создают благоприятный микроклимат в диаметре до 1,5 м.

Ультрафиолетовое облучение оказывает положительное влияние на прирост ягнят, содержание гемоглобина, форменных элементов и резервной щелочности крови, повышает отложение фосфорно-кальциевых солей в организме.

Через 30–40 мин. после ягнения матку готовят к первому кормлению ягненка. Для этого при необходимости у нее подстригают шерсть на вымени, внутренних сторонах ляжек, вокруг глаз; вымя и соски обмывают теплой водой и обтирают чистым полотенцем. Перед первым кормлением рекомендуется доить первые порции молозива. Если матка плохо принимает свой приплод, их переводят в индивидуальную клетку-кучку. Чтобы ягненок быстрее научился находить вымя и соски, начиная с рождения его рекомендуется держать в течение кормления под стоящей маткой. Если он не может самостоятельно найти сосок, чабан оказывает ему соответствующую помощь. На протяжении первых 2–3 дней ягнят кормят через каждые 2–3 часа.

После ягнения матки испытывают сильную жажду. Поить их следует теплой водой по 1–1,5 л через 1–2 часа после ягнения, затем через 1,5–2 часа их поят повторно. Основным кормом в это время является сено. Сочных кормов и концентратов дают немного. Скармливание большого количества концентратов и силоса может привести к заболеванию. Наполный рацион с включением сена, сочных кормов и концентратов матку следует переводить на 3–5 день после ягнения.

1. 9 Лекция № 14 (2 часа).

Тема: « Корма, кормление и содержание овец»

1.9.1 Вопросы лекции:

1. Виды кормов для кормления овец
2. Кормление баранов-производителей
3. Кормление овцематок

1.9.2 Краткое содержание вопросов

1. Виды кормов для кормления овец

Основу питания овец, как и большинства травоядных животных, составляет растительный корм. **Пастбищная трава – основа рациона овец на протяжении всего тёплого сезона.** Овцы употребляют большое количество травы и сена, при этом способны успешно переваривать любые сорняки и даже колючки. Единственное ограничение – болотная и лесная трава.

олучить достаточное количество продукции овцеводства – мяса, молока и шерсти – можно только удачно комбинируя различные виды кормов:

- **Зелёный корм.** Трава – основа питания овец. По питательности и содержанию витаминов и микроэлементов молодая трава приближена к концентрированному корму. Для правильного пищеварения овцам нужна не только свежая зелень, но и более грубые травы. Они с удовольствием жуют посохшие сорняки, колючки, листочки деревьев.
- **Силос.** По питательности стоит на втором месте после травы. Лучше всего овцами усваивается кукурузный силос, перемешанный с бобовым сеном. Мясная и молочная продуктивность животных при употреблении такого корма увеличивается.
- **Сено.** Этот продукт универсален для организации питания всех травоядных животных. Питательность сена зависит от трав, которые входят в его состав, поэтому участки и время для заготовки нужно подбирать с умом. Наиболее предпочтительным является разнотравье в период цветения. Особенной питательностью обладает также сено из клевера, люцерны и бобовых растений. Заготовку его осуществляют на специально засеянных участках.
- **Корнеплоды, бахчевые культуры.** Свёкла, кабачки, тыква, морковь служат подкормкой животным, источником витаминов и минералов. Свёкла и морковь, благодаря большому содержанию клетчатки, благотворно влияют на пищеварение овец, улучшают качество шерсти.
- **Концентрированные корма.** К ним относятся зерновые культуры (овёс, ячмень, пшеница, кукуруза), бобовые (вика, соя, горох), отруби, жмых (соевый, подсолнечный). В концентрированных кормах содержится большое количество протеина, минералов, крахмала, жиров. Особенно важно включать данный вид кормов в рацион продуктивных овец.
- **Солома.** По содержанию питательных веществ этот вид корма стоит на последнем месте, но в стойловый период солома служит прекрасной подкормкой для овец, так как содержит в себе грубую клетчатку. Предпочтительный вариант – солома бобовых растений. Также можно использовать солому злаковых культур (просяная, овсяная, ячменная).
- **Сенаж.** Свежескошенная трава, просушенная до 50% и герметично законсервированная в специальных ёмкостях.
- **Минеральные подкормки.** Недостаток минеральных веществ в основных кормах овец отрицательно сказывается на здоровье и продуктивности животных. Снижается настриг шерсти, замедляется набор массы тела и плодовитость, повышается риск инфекционных заболеваний. Количество минеральных подкормок составляет 10-15 граммов в сутки на голову. Костная мука служит источником кальция и фосфора. Во все сезоны в корме овец должна присутствовать соль (3 килограмма в год на голову).

2. Кормление баранов-производителей

При организации кормления баранов-производителей учитывают их возраст, живую массу, интенсивность полового использования (или период покоя), а также уровень шерстной продуктивности: у овец хорошо выражен половой диморфизм и самые большие настриги шерсти получают с баранов. За 40 – 60 дней до начала случного периода баранов-производителей переводят на повышенную норму кормления; при этом в рационы вводят морковь, тыкву, полусахарную свеклу, зернобобовые культуры и шроты, корма животного происхождения: молоко обезжиренное, муку мясо-костную, яйца куриные. Силос при этом или полностью исключают, или заменяют клеверным или люцерновым сенажом. После окончания случного периода баранов переводят на прежний рацион.

Нормы кормления баранов-производителей романовской породы представлены в табл.

Табл. Нормы кормления баранов-производителей романовской породы (по А.П. Калашникову и др., 2003)

Показатели	Период					
	неслучной			случной		
	Живая масса, кг					
	60	70	80 и более	60	70	80 и более
1	2	3	4	5	6	7
ЭКЕ	1,78	1,89	1,99	2,42	2,52	2,73
Сухое вещество, кг	2,00	2,15	2,25	2,5	2,6	2,8
Переваримый протеин, г	150	155	160	260	280	300
Сахар, г	105	108,5	112	-	-	-
Соль поваренная, г	12	15	18	15	16	18
Кальций, г	7,5	8	8,5	8,2	8,8	9,2
Фосфор, г	4,5	5	5,4	5	5,4	6
Магний, г	0,5	0,54	0,6	0,55	0,6	0,65
Сера, г	3,6	3,8	4,1	4,0	4,4	4,8
Каротин, мг	20	21	23	28	32	35
Вит. Е, мг	60	63	66	75	78	81

В пастбищный период организуют либо выпас баранов либо подкормку скошенной зеленой массой; в стойловый период баранам скармливают злаково-бобовое и бобовое сено, сенаж, злаково-бобовый и кукурузный силос, концентраты.

Баранам в случной период ВНИИОК рекомендует комбикорм следующего состава (% по массе): овес - 18, ячмень - 17, просо - 14, отруби пшеничные - 13,5, шрот подсолнечниковый - 12, дрожжи кормовые сухие - 4, травяная мука - 10, сухое обезжиренное молоко - 7, монокальцийфосфат - 2, соль поваренная - 1, премикс ПО-1 - 1,5. В 1 кг такого комбикорма содержится 0,99 ЭКЕ, 185 г сырого и 152 г переваримого протеина, 92 г клетчатки, 7,5 г кальция, 10 г фосфора, 4,7 г серы, 21 мг каротина.

Примерные рационы для баранов-производителей романовской породы представлены в табл.

Табл. Примерные рационы для баранов- производителей, на гол/сут.

Показатели	Периоды	
	неслучной	случной
Трава пастбищная	-	-
Сено злаково-бобовое, кг	1,5	2,0
Силос, кг	0,6	-
Ячмень, овес и др. злаки	0,7	0,8
Шрот подсолнечный, кг	-	0,2

Морковь, кг	-	0,5
Фосфат кормовой, г	10	10
Поваренная соль, г	15	18
Медь сернокислая, мг	4	4
В рационах содержится:		
ЭКЕ	1,9	2,9
сухого вещества, кг	2,1	2,6
переваримого протеина, г	156	276
кальция, г	15	15
фосфора, г	11,2	12,7
магния, г	2,6	3,6
серы, г	5,6	5,2
меди, мг	16	19
цинка, мг	64	74
кобальта, мг	0,5	0,63
йода, мг	0,6	0,8
каротина, мг	45	127
витамина Е, мг	63	70

Аналогично кормят баранов-пробников.

В мериновом овцеводстве до сих пор содержат достаточно большое поголовье валухов - кастрированных баранов для получения тонкой однородной шерсти. Из валухов формируют отдельные отары. В пастбищный период единственным кормом для них является пастбищная трава, зимой - грубые корма (сено, солома), силос и сенаж. Животные практически круглый год находятся на поддерживающем рационе. Перед убоем животных откармливают, в том числе можно с другими полновозрастными группами нагулом или на откормочных площадках

3. Кормление овцематок

Нормы кормления овцематок учитывают направление и уровень продуктивности, живую массу, физиологическое состояние (холостые, суягные, лактирующие). Самые высокие потребности овцематок в энергии, минеральных и питательных веществах - в первые 6 - 8 недель лактации, самые низкие – у маток холостых и в первые 12 недель суягности (табл.).

Табл. Нормы кормления маток романовской породы (по А.П. Калашникову и др., 2003)

Показатели	Матки холостые и в	В последние 8 недель	Первые 6-8 недель	Вторая половина лактации
------------	--------------------	----------------------	-------------------	--------------------------

	первые 12-13 недель суягности		суягности		лактации			
	Живая масса, кг							
	50	60	50	60	50	60	50	60
ЭКЕ	1,1	1,2	1,6	1,8	2,4	2,5	1,8	1,9
Сухое вещество, кг	1,35	1,4	1,6	1,75	2,3	2,4	1,9	2,0
Переваримый протеин, г	90	100	160	190	230	245	145	155
Соль поваренная, г	11	12	12	13	16	17	13	14
Кальций, г	6,4	10,2	11,5	12,4	13,8	14,4	8,6	9,0
Фосфор, г	3,7	4	5,8	6,2	8,3	8,7	6,0	6,3
Магний, г	0,5	0,54	1,36	1,48	1,8	1,9	1,3	1,4
Сера, г	2,9	3,2	4,2	4,8	5,8	6,0	4,6	4,8
Каротин, мг	12	15	23	25	23	25	16	18
Витамин Д, МЕ	600	700	750	950	1000	1100	700	800

Аналогичная динамика потребностей в нормируемых элементах питания относится к овцематкам и других пород, за исключением тех, ягнят которых убивают на смушки или мерлушки - лактация как таковая длится в этом случае от 3 дней и больше. При убое ягнят норму кормления овцематок снижают, чтобы произошел самозапуск. Доеение овец практически не применяется, хотя это является перспективным направлением в фермерском овцеводстве.

В пастбищный период основной корм - пастбищная трава, которую овцематки потребляют в количестве до 8 - 9 кг/гол/сут; в стойловый - до 40 - 50% по питательности может составлять доброкачественный силос (от 2 до 4,5 кг/гол/сут). В качестве источника грубых кормов используют мелкотравное сено с природных или сеяных сенокосов, веточный корм. Концентрированные корма могут быть представлены в рационах комбикормами-конcentратами для овцематок или приготовляемая в условиях хозяйства зерносмесь с содержанием в ней до 60 % по массе зерновых злаковых. По мере нарастания суягности и после ягнения увеличивается доля концентрированных кормов, силоса (табл.).

Табл..Примерные рационы для романовских маток массой 50 кг, на голову в сутки

Показатели	Холостые и первая половина суягности	Последние 8 недель суягности	Лактирующие
Сено разнотравно-злаковое, кг	0,8	0,8	1,0
Силос, кг	2,0	2,0	2,5
Ячменная дерть, кг	0,1	0,35	0,3
Мука травяная, кг	0,1	0,25	0,4

Соль поваренная, г	11	12	16
В рационе содержится:			
ЭКЕ	1,16	1,68	2,4
сухого вещества, кг	1,34	1,70	2,3
переваримого протеина, г	153	237	230
кальция, г	9,7	11,9	16,3
фосфора, г	3,8	7,4	6,4
магния, г	2,1	3,2	8
серы, г	2,6	4,1	6,3
железа, мг	1085	1210	1564
меди, мг	12	15	20
цинка, мг	43	50	124
кобальта, мг	0,54	0,65	1,1
йода, мг	0,5	0,55	0,9
каротина, мг	42	58	55
витамина Е, МЕ	495	690	730

1.10 Лекция № 15 (2 часа)

Тема Здания и сооружения для овец, механизация основных производственных процессов

1.9.1 Вопросы лекции:

1. Здания и сооружения для овец

2. Механизация технологических процессов

Современная крупная овцеводческая ферма представляет собой единый - комплекс специальных зданий и сооружений, куда входят:

- овчарни овцематок при зимнем и ранневесеннем ягнении с тепляком;
- помещения для племенных баранов (баранники), овчарни для содержания различных половозрастных групп овец;
- теплек и убойный пункт в каракулеводческих хозяйствах;
- пункт искусственного осеменения в блоке с основным помещением или в отдельно стоящем здании;
- стригальный пункт;
- здания и сооружения ветеринарного назначения;
- автовесы;
- сооружения водо и тепло электроснабжения, канализация;
- доильные пункты на фермах мясошерстно-молочного, смушкового, каракульского направления;

цехи переработки кормов, подстилки, тары, хозинвентаря, площадки (навесы) для среде механизации;

контора и бытовые помещения (гардеробная с сушильным шкафом, умывальник и душевая, санузел, помещения для буфета);

комнаты отдыха.

Овцеводческие фермы возводят поблизости от естественных или культурных долголетних пастбищ. Здания и сооружения овцеводческих подразделяют на основные (помещения для содержания овец) и вспомогательные (стригальные пункты, ванны для купания овец, изоляторы, хозяйственные постройки и др.).

При выборе участка под строительство овцеводческой фермы необходимо учитывать: размер земельной площади хозяйства, водные и транспортные магистрали, генеральный план застройки, величину самой фермы и планируемой связи ее с другими производственными объектами. В целях предохранения овец от инфекционных заболеваний участок выбирают вдали от проезжих дорог и скотопроегонных трактов. От холодных ветров и снежных заносов постройки фермы должны быть защищены рельефом местности или зелеными насаждениями.

Изоляторы и другие ветеринарно-лечебные постройки фермы располагают обособленно не ближе 300 м от овцеводческих помещений, ниже последних по рельефу. Изолятор обычно рассчитывают на размещение от 2 до 7% поголовья животных.

Овчарни всех назначений должны вмещать не более 1500 овец. Наиболее распространены помещения на 800-1000 овцемест. Овчарням в северных и центральных районах придают Г-образную, а в южных - П-образную форму. Внешний угол этих построек должен быть направлен к господствующим ветрам, что предотвращает прямое обдувание и охлаждение овчарни. С подветренной стороны от господствующих ветров к стенам овчарен вплотную размещают площадки, обнесенные изгородью высотой до 2 м, и устраивают ворота для проезда транспорта. С подветренной стороны овчарни делают открытый баз, площадь его должна быть в 2-3 раза больше площади овчарни (не менее 5 м² на овцу). От складов хранения кормов овчарни располагают не ближе 30 м.

Помещения для овец на крупных комплексах располагают отдельно одно от другого (павильонно) или в виде моноблоков, когда овчарни соединены продольными стенами и вмещают до 2500 овец и более. В секциях овчарен содержат не более 25 баранов-производителей или 50 баранов-пробников, 25 ягнят при искусственном выращивании в возрасте до 45 дней, 75 ягнят старше 45 дней, 250 голов ремонтного и откормочного молодняка. В различного типа помещениях для размещения овец предусматривают следующие оптимальные размеры площадей пола в расчете на одно животное (м²):

2. Механизация технологических процессов

Для стрижки овец применяют различные комплекты оборудования, включающие в себя машинки для стрижки, электродвигатели подвесного типа, гибкие валы и силовую сеть. Известны стригальные агрегаты ЭСА-1Д с одной машинкой МСО-77Б, ЭСА-12Г с 12 машинками, ЭСА-1/200, ЭСА6/200, ЭСА12/200А с высокочастотными машинками МСУ-200, а также специализированные комплексы КТО-24 и ВСЦ-24/200 на 20 тыс. овец.

Комплекты оборудования выбирают обычно, исходя из поголовья скота и оптимальной продолжительности стрижки (10...15 суток). Агрегаты ЭСА-1Д, ЭСА-1/200 используют в хозяйствах с поголовьем овец до 500 голов.

Стригальное оборудование располагают в помещениях длиной 80 м и шириной 8...11 м в один или два ряда. Они имеют отделения стрижки и упаковки рун, должны быть чистыми и светлыми, соответствовать зоогигиеническим требованиям. В отделении стрижки монтируют стригальные и точильные агрегаты, транспортеры для шерсти, в отделении упаковки устанавливают весы, столы для классировки шерсти и пресс.

Электростригальные агрегаты ЭСА-1Д и ЭСА-12Г предназначены для стрижки овец во всех климатических зонах страны в помещениях или под навесом в хозяйствах с

небольшим поголовьем овец. Агрегат ЭСА-1Д состоит из одной машинки МСО-77Б, гибкого вала с броней и арматурой ВГ-10, электродвигателя привода машинки АОЛ-0,12-2-Ц, силовой и осветительной сети. Агрегат ЭСА-12Г включает двенадцать таких комплектов и дополнительно точильные аппараты типа ДАС-350. Высокочастотные электростригальные агрегаты ЭСА-6/200 и ЭСА-12/200А отличаются тем, что в их состав входят соответственно высокочастотные электростригальные машинки МСУ-200В, блоки преобразователя частоты тока ИЭ-9401, точильные аппараты и электропроводящая сеть.

Агрегат ЭСА-12/200А предназначен для стрижки 10... 12 тыс. овец в сезон. Его используют для оборудования стационарных, передвижных или временных стригальных пунктов на 12 рабочих мест.

Процесс стрижки и первичной обработки шерсти на примере комплекта КТО-24/200А организуют следующим образом: оборудование комплекта размещают внутри стригального пункта. Отару овец загоняют в загон, примыкающие к помещению стригального пункта. Подавальщики ловят овец и подают их к рабочим местам стригалей. У каждого стригала имеется набор жетонов с указанием номера рабочего места. После стрижки каждой овцы стригаль укладывает на транспортер руно вместе с жетоном. В конце транспортера подсобный рабочий укладывает руно на весы и по номеру жетона учетчик записывает в ведомость массу руна отдельно каждому стригалу. Затем на столе для классировки шерсти производится его разделение по классам. С классировочного стола шерсть попадает в бокс соответствующего класса, откуда направляется для прессования в кипы, после чего кипы взвешивают, маркируют и отправляют на склад готовой продукции.

Стригальный аппарат «Руно-2» предназначен для стрижки овец на отгонных пастбищах или фермерских хозяйствах, не имеющих централизованного снабжения электроэнергией. Состоит из стригальной машинки с приводом от высокочастотного асинхронного электродвигателя, преобразователя, питающегося от бортовой сети автомобиля или трактора, комплекта соединительных проводов и дипломата для переноски. Обеспечивает одновременную работу двух стригальных машинок.

Потребляемая мощность одной стригальной машинки 90 Вт, напряжение 36 В, частота тока 200 Гц.

Широкое распространение на стригальных пунктах получили стригальные машинки МСО-77Б и высокочастотные МСУ-200В. МСО-77Б предназначена для стрижки овец всех пород и состоит из корпуса, режущего аппарата, эксцентрикового, нажимного и шарнирного механизмов. Корпус служит для соединения всех механизмов машинки и обшит сукном для предохранения руки стригала от перегрева. Режущий аппарат является рабочим органом машинки и служит для срезания шерсти. Работает по принципу ножниц, роль которых выполняют лезвия ножа и гребенки. Нож срезает шерсть, совершая поступательное движение по гребенке 2300 двойных ходов в минуту. Ширина захвата машинки 77 мм, масса 1,1 кг. Привод ножа осуществляется гибким валом от внешнего электродвигателя через эксцентриковый механизм.

Высокочастотная стригальная машинка МСУ-200В состоит из электростригальной головки, электродвигателя и шнура питания. Принципиальным отличием ее от машинки МСО-77Б является то, что трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором выполнен как единое целое со стригальной головкой. Мощность электродвигателя 120 Вт, напряжение 36 В, частота тока 200 Гц, частота вращения ротора электродвигателя 10 500 мин⁻¹. Преобразователь частоты тока ИЭ-9401 преобразует промышленный ток напряжением 220/380 В в ток повышенной частоты — 200 или 400 Гц напряжением 36 В, безопасный для работы обслуживающего персонала.

Для заточки режущей пары используют однодисковый точильный аппарат ТА-1 и доводочный аппарат ДАС-35

Механизация процесса кормления. На овцеводческих фермах наиболее трудоемким и наименее механизированным является процесс кормления овец. При отсутствии средств

механизации чабаны на погрузку, транспортировку и разложения кормов в кормушки затрачивают свыше 60 % своего дневного рабочего времени. Комплексная механизация процесса кормления дает возможность вдвое повысить производительность труда чабанов и увеличить норму нагрузки с 200 — 250 до 400 - 500 маток, с 300 - 350 до 800 - 1000 голов молодняка и вала - хов. При этом с помощью механизмов грузят, транспортируют и готовят корма к скармливанию и раздачи.

Важным элементом технологического оборудования помещений и базив для овец являются переносные деревянные или металлические щиты и кормушки. их наличие дает возможность эффективно использовать помещения и мобильные средства механизации в соответствии с ритмом производственного процесса на пастушьей ферме. Механизированная раздача кормов осуществляется с помощью прицепных кормораздатчиков (КТУ-10, КТУ-3, РММ-5, КСА-5Б), погрузчиков (ПСК-5, ФН-1,2, ПЗ-0,8 Б, ПГ-0,5 В), смесителей кормов (ДА-7, РФС-6,5) и др.

Россыпные и гранулированные кормосмеси раздают мобильными, иногда — стационарными кормороздавачами. Мобильные раздатчики являются универсальными, работают независимо от источников электроэнергии, надежны и просты в эксплуатации. Для раздачи рассыпных кормосу - мішей, силоса и измельченных грубых кормов в базах используют УГОЛ-ЗБ или ЗСК-10. Стационарные раздатчики применяют очень редко и преимущественно в вівчарнях во время ягніння.

Стационарные раздатчики ТВК-80 в овцеводстве широкого применения не получили, поскольку они являются ненадежными, хотя применение их в кошаре эффективнее, потому что позволяет лучше использовать полезную площадь помещения. Мобильные раздатчики требуют много площади под кормовой проезд, создают лишний шум в помещении и приводят к ухудшению микроклимата. Но они надежнее и дешевле и многоцелевые.

Механизация водонапування. Водонапування на овцеводческих фермах механизированы на 50 %. На комплексно-механизированных фермах для подачи воды используют водопровод, а также автонапувалки. В базах широко используют автонапувалки с электроподогревом АГК-4 и в-8, в вівчарнях — чашечные ПАС-2, АП-И и ПА-1. За отарної форми содержания овец источником воды служат шахтные колодцы. Вода из них подается водопідйомниками. Для подъема воды из буровых скважин 50 — 100 м глубиной применяют глубинные насосы, с помощью которых наполняют водяные башни. Вода подводится к помещениям и подается в поилки. Для поения ягнят во время ягніння маток используют сакманну поилку АГО-3. На пастбищах, куда воду подвозят, чаще всего пользуются поилками ГАО-3, ГАО-4, ВУО-3, которые заполняют водороздавачами марки ВР-3 и АВВ на шасси ГАЗ-51 и ГАЗ-53.

Механизация уборки навоза. Овец содержат на глубокой неизменной подстилке, поэтому навоз убирают раз в год. Из кошар его удаляют весной начіпками типа ПБ-35, которые монтируются на тракторы Т-150 и Т-75. С кормовигульних площадок навоз удаляют бульдозерными начіпками БН-1, которые цепляют на трактор МТЗ-80 или ЮМЗ. При содержании овец на щелевых полах навоз накапливается в подпольных траншеях, с которым его нагружают специальными погрузчиками в тракторные тележки 2ПТС-4М и вывозят на поля.

Механизация профилактического купания овец и дезинфекции помещений. Среди установок для купания овец различают установки душевого и заглубленного типов. К заглубленным установкам можна отнести обычную купальную ванну 20 м длиной, 0,6 — 0,8 м в ширину и 1,5 — 1,8 м глубиной. На концах ванны устроены пологие вход и выход с трапами, которые имеют поперечные планки для упора ног. При ручной подаче животных к ванне бригада из 7 — 10 человек за 8-часовой рабочий день купает 1200 — 1300 овец. Для облегчения их подачи в конце раскола, что ведет к ванны, устанавливают ленточный конвейер, который подает овец к ванне. При использовании конвейера производительность труда рабочих, занятых купанием овец, повышается вдвое. Для

механизации купания овец и проведение других профилактических мероприятий используют специальное оборудование (ОКВ, КУП-1, ЛСД-3М, ДУК-2)

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

2.1 Семинарское занятие №1 (2 часа).

Тема: «Происхождение и биологические особенности овец»

2.1.1 Вопросы к занятию:

1. Происхождение овец
2. Биологические особенности овец ____

2.1.2 Краткое описание проводимого занятия:

1. Происхождение овец

Домашние вцы относятся к животным отряда парнокопытных, которых, в свою очередь, наряду с козами называют мелким рогатым скотом. Если быть совсем точным, то овцами называются самки этого вида животных. Самцов называют баранами, а овечьих детенышей – ягнятами.

Это – древнейший одомашненный человеком вид. Его приручили примерно восемь-двенадцать тысяч лет тому назад, то есть, еще в эпоху неолита. Свидетельством этому служат многочисленные археологические находки, а также древние наскальные рисунки, найденные учеными при проведении раскопок в различных регионах Европы и Азии. Именно с этих частей света и началось активное продвижение этих ценных животных на другие земные континенты.

Учёные предполагают, что предками овец является один из перечисленных видов диких животных:

- архар;
- аргали;
- дикий муфлон.

Архар

Архары – это парнокопытные млекопитающие из семейства полорогих. Эти животные обитают в предгорных районах Средней и Центральной Азии. Они довольно крупные – рост в холке самца может достигать 1-1,15 м, а весит он при этом 140-170 кг. Отличительная особенность этого вида – огромные спиралевидные рога. Их длина нередко достигает 1,5 метров, а вес – 20 кг.

Аргали

Это животное считается самым крупным из рода баранов. Рост самца аргали в холке превышает 110-115 см. При длине тела 1,5-2 метра взрослая особь весит 160-180 кг. Обитает этот вид в предгорье Гималаев и в Забайкалье.

Дикий муфлон

Большая часть учёных склоняется к версии, что именно дикий муфлон, обитающий в южных частях европейского континента, является предком овцы. В его кариотипе содержится 54 хромосомы, как и у одомашненных баранов и коз. Средний вес взрослой особи – 45-50 кг, рост – 70 см. Рога муфлона вырастают до 65 см в длину и имеют треугольное поперечное сечение.

Уриалы – ещё один вид из рода баранов, который теоретически мог бы быть основоположником овечьего «царства». Однако эти животные предпочитают занимать крутые горные склоны на высоте 6000 метров над уровнем моря. Они распространены в Средней Азии. Согласно исследованиям, у уриалов в кариотипе 58 хромосом, этот факт свидетельствует против теории о возможном родстве этого вида с овцами.

Теории происхождения

Изучая происхождение овец, учёные разделились во мнениях. Одни считают, что у домашних пород есть только 1 дикий предок, другие выступают против этой теории. Они склоняются к мысли, что одомашненные бараны происходят от двух диких видов – аргали и архара.

В ходе изучения вопроса о происхождении овец исследователи выяснили, что у диких и домашних видов баранов много различий:

1. Длина конечностей. У диких видов ноги сухие и длинные, у домашних – короткие.
2. Тип телосложения. Дикие бараны имеют стройное телосложение, чётко очерченный рельеф мышц, тогда как у овец туловище округлое.
3. Качество шерсти. Волосяной покров у диких видов полорогих парнокопытных грубый, он почти наполовину состоит из ости и мёртвого волоса. Домашние породы овец могут похвастать четырьмя видами руна и большим настригом.

2. Биологические особенности овец

Биологические особенности — это комплекс Морфофизиологических свойств, определяющих характерную продуктивность и особенности реакции организма на условия окружающей среды. Чтобы полностью реализовать генетический потенциал продуктивности животных, необходимо с учетом этих особенностей их кормить, содержать, эксплуатировать.

Важная особенность домашних овец — большая пластичность и огромный потенциал адаптивности к различным условиям. Благодаря пластичности, изменчивости и хорошим адаптивным способностям оказалось возможным вывести многочисленные породы овец, разводить их в различных экологических условиях — в зоне пустынь, высокогорий, степей и др.

Овцы хорошо приспособлены к пастбищному содержанию. Из 800 видов растений, потребляемых животными, овцы используют более 520, крупный рогатый скот — 460, лошади — 416. Овцы поедают 46 видов полыней из 91, лошади — 39, коровы — 24. Из 181 вида соянок овцами поедается 132, лошадьми — 48, коровами — 39. Овцы подвижны и выносливы, могут делать большие переходы и использовать растительность степных, пустынных, полупустынных, горных и высокогорных пастбищ. Объясняется это не только физиологическими, но и анатомическими особенностями животных: у них клинообразно заостренная лицевая часть головы, острые косо поставленные зубы и тонкие подвижные губы, поэтому они могут поедать низкорослую, изреженную растительность и даже на скудных пастбищах находить себе корм, могут тщательно выбирать колоски, отдельные зерна и травинки на жнивье.

Овцы не только хорошо используют все типы пастбищ, но и неприхотливы к качеству пастбищ, поедают наибольшее количество растений, включая горькие, сильно пахнущие, колючие травы, многие из которых — сорняки. Это их свойство имеет большую практическую ценность, так как повышает эффективность использования земли и особенно тех угодий, которые непригодны под посевы сельскохозяйственных культур или для пастбы других видов сельскохозяйственных животных.

Пастбищное содержание овец должно применяться везде, где для этого имеются условия. Овцы могут использовать пастбища круглый год, даже зимой, когда морозы достигают 40°C (Забайкалье, Бурятия, Алтай, Тыва).

Пищеварительный аппарат овец хорошо приспособлен к перевариванию грубых кормов и хорошему усвоению питательных веществ. Эта особенность обусловлена тем, что длина кишечника овец примерно в 30 раз больше длины туловища, тогда как у крупного рогатого скота — больше только в 20-22 раза, у свиней — в 12 раз, у лошадей — в 15 раз, что характеризует овец как пастбищных животных с высокой способностью к на-

гулу. Особую значимость в этом отношении имеет желудок, который состоит из четырех отделов: рубца, сетки, книжки, сычуга. Желудочные железы, выделяющие желудочный сок, имеет только сычуг. По этой при

чине рубец, сетка и книжка, не имеющие железистой ткани, получили название преджелудков, а сычуг — собственно желудок.

Преджелудки играют важную роль в переваривании питательных веществ корма, особенно грубого, расщепление которого в рубце происходит под действием ферментов, бактерий и простейших, в огромном количестве населяющих его содержимое, а также под действием ферментов самих кормов.

В рубце расщепляется до 95% Сахаров и крахмала и до 50% переваримой клетчатки корма. Оставшаяся часть потребленной клетчатки переходит в нижеследующие отделы пищеварительного тракта, где продолжается ее переваривание.

При микробиальном расщеплении углеводов в рубце образуются летучие жирные кислоты (ЛЖК), в основном уксусная, а также пропионовая и масляная, которые могут покрывать до 40% общей потребности этих жвачных в энергии.

Особенность переваривания азотистых веществ в пищеварительном тракте овец в том, что в рубце протеин корма расщепляется микроорганизмами до пептидов, аминокислот и аммиака, из которых синтезируется бактериальный белок высокой биологической ценности.

В процесс синтеза включается и аммиак небелковых азотистых соединений (карбамид, аммонийные соли и др.). Считается, что микроорганизмы рубца обеспечивают до 30% потребности жвачных животных в протеине. Особый интерес представляет содержание в бактериальном белке серосодержащих аминокислот цистина и метионина.

В рубце благодаря жизнедеятельности микроорганизмов синтезируются витамины группы В, а также жирорастворимый витамин К. Поэтому в кормах для взрослых животных эти витамины могут отсутствовать, но их предшественники, например кобальт, необходим для синтеза витамина В₁₂.

В отличие от крупного рогатого скота овцы резервируют в жировой ткани витамин А, а не каротин, чем объясняется белый цвет бараньего сала и желтая пигментация говяжьего жира.

В экстремальных условиях во время перебоев в кормлении и поении овцы многих пород расходуют жир, отложенный в благоприятные в кормовом отношении периоды в теле, на хвосте, в курдюке. Эта ценная биологическая особенность помогает овцам преодолевать критические ситуации, особенно в зимний пастбищный период, когда выпадает много снега и т. д. Большое количество жира вдоль хвостовых позвонков, и особенно в курдюке, способны откладывать жирнохвостые и курдючные овцы. Это свойство выработалось у них в связи с разведением в течение длительного времени в суровых природных условиях полупустынь и пустынь. В этих районах овцеводство было крайне экстенсивным — кочевым, реже полукочевым, и животные часто испытывали острый недостаток в кормах и воде, особенно в период летнего выгорания пастбищ, а зимой — при гололедице и снежных заносах. Не получая в такое критическое время подкормки, овцы частично компенсируют недостаток в кормах и воде за счет имеющихся у них жировых отложений.

Скудная растительность, недостаток воды, континентальный климат с резкими колебаниями температуры и влажности не только по сезонам года, но и в пределах суток, иногда значительная пересеченность местности, круглогодичное пастбищное содержание и необходимость перегона животных на сотни километров сильно затрудняют развитие в таких районах других отраслей животноводства, кроме овцеводства. К ним относятся многие районы Северного Кавказа, Алтая, Нижнего Поволжья, Забайкалья, Республик Бурятия и Тывы, где овец на пастбищах содержат почти круглый год.

Хорошей приспособленности овец к холоду и жаре в значительной степени способствует их шерстяной покров. В холодное время года он надежно защищает

организм от низких температур и порывов ветра, а в жаркий период — от чрезмерного перегрева и ожогов кожи, выполняя роль теплозащитной оболочки. При этом животные сами регулируют свое состояние по отношению к температуре окружающей среды, сбрасывая шерстяной покров (линька) с наступлением тепла. Такой процесс особенно развит у грубошерстных животных.

Несмотря на высокую приспособленность к самым различным условиям среды, овцы плохо переносят повышенную влажность и сквозняки в помещениях, сырые пастбища, высокую температуру окружающей среды. Например, для романовских овец предпочтительнее умеренный климат Нечерноземья, чем южных степных районов, а каракульская порода овец наиболее ценную продукцию дает в условиях пустынь и полупустынь. Мериносы хорошо себя чувствуют в зоне сухих степей, а английским мясным овцам необходим умеренный, влажный климат и обильное кормление. Знание этих биологических особенностей животных разных пород необходимо для эффективного их разведения. Большое разнообразие пород овец позволяет выбрать для каждой экологической зоны те из них, которые наиболее полно отвечают местным условиям.

Овцеводство хорошо сочетается с любой другой отраслью, что имеет важное значение для эффективного использования земли, кормов, помещений.

Овцы характеризуются высокой хозяйственной скороспелостью, которая проявляется в производстве полноценной продукции в раннем возрасте. Так, баранину, овчины можно получать от животных в возрасте 6 — 8 мес., поярковую шерсть — в 5 мес, а смушки — в 1-3-дневном возрасте.

В практическом отношении ценной биологической особенностью овец является ранняя дозревание животных. В 5-6-месячном возрасте они могут быть плодотворно осеменены. Однако ранняя случка задерживает рост и развитие организма, поэтому в первую случку пускают животных в возрасте 12-18 месяцев.

Плодовитость овец большинства пород составляет 120-150%, а романовских — 250-300%. Высокая скороспелость в сочетании с высокой плодовитостью могут обеспечить быстрый оборот вложенных в отрасль средств.

Для овец многих пород характерна сезонность в размножении — половая охота обычно проявляется осенью (сентябрь — ноябрь). Исключение составляют овцы романовской породы, финский ландрас, у которых утрачена сезонность в проявлении половой охоты. Возможность осеменения овец в любое время года, в любой сезон имеет важное хозяйственно-экономическое значение: можно получать три ягнения в два года, а от части маток — два ягнения за год.

Период между очередными охотами — половой цикл — у овец в среднем 16-17 суток.

Продолжительность беременности маток в среднем 5 месяцев, период подсоса — обычно 3-4 месяца, а когда маток используют для более интенсивного воспроизводства или для дойки, этот период сокращают до 45-60 дней.

Вымя у овец хорошо развито, обычно с двумя сосками, но встречаются животные и с большим числом сосков. Отмечено, что такие матки более молочные.

Овец можно держать вместе с другими домашними животными, что способствует более эффективному использованию пастбищ, кормов, помещений.

От овец получают разнообразную продукцию — баранину, сало, молоко, шерсть, шубные и меховые овчины, смушки.

Овцы могут жить 10-12 лет и дольше, но хозяйственное использование их обычно продолжается в течение 6-8 лет, после чего они выбраковываются, так как в этом возрасте наступает резкое ослабление зубной системы, выпадение зубов, что ведет к ухудшению использования пастбищных и других кормов.

У овец хорошо развит инстинкт стадности, в связи с чем их содержат группами (отарами). Они пугливы, поэтому нежелательны частые осмотры, обработки, взвешивания животных.

Некоторые физиологические параметры здоровых овец

Масса плода 2,5-6,5 кг или 7-8 % от массы матери (исключение составляют романовские овцы, у которых этот показатель достигает 18-20%). В первые два дня жизни живая масса новорожденных не изменяется.

Рост скороспелых животных оканчивается в 2-, а позднеспелых — в 3-летнем возрасте. Половое созревание - 7-8 месяцев, время первой случки — 12-18 месяцев.

Температура тела молодняка и взрослых животных — 38,5 — 40,5°C.

Число дыханий в минуту (в состоянии покоя): у молодняка — 15-20, у взрослых - 12-15, у старых животных - 9-12.

Число ударов пульса в минуту (в состоянии покоя): у молодняка до 1 года - 80-120, в годичном возрасте - 85-95, у взрослых овец - 70-90, у баранов - 60-80.

Количество крови в организме составляет 1/12-1/13 массы тела. В крови содержится около 68% плазмы и 32% форменных элементов. В 1 мм³ форменных элементов насчитывается 7-11 млн. эритроцитов и 6-12 тыс. лейкоцитов.

Жвачка начинается через 20-45 мин после принятия корма. Для пережевывания одной жвачки делается 40-60 жевательных движений.

Емкость пищеварительных органов, л: рубца — 15-20, книжки — около 5, сетки - 1,5-3,5, кишечника — около 10.

Время прохождения пищи через желудочно-кишечный тракт, ч: через рубец - 4-5; через тонкий кишечник — 1-2; через весь кишечный канал — 14-19.

Из организма взрослых овец выделяется в сутки 1-3 кг кала и 0,5-1,5 кг мочи.

2.2 Семинарское занятие №2 (2 часа).

Тема: «Конституция, экстерьер и интерьер овец»

2.2.1 Вопросы к занятию:

1. Экстерьер и интерьер овец как важнейшие показатели для племенной работы.
2. Методы оценки экстерьера
3. Типы конституции овец и их зоотехническая характеристика

2.2.2 Краткое описание проводимого занятия:

1. Экстерьер и интерьер овец как важнейшие показатели для племенной работы.

Продуктивность овец, воспроизводительная способность, приспособляемость к различным условиям, выживаемость и другие признаки обусловлены конституциональными особенностями животного. У каждого типа овец наиболее развиты те органы и ткани, которые способствуют высокому развитию того или иного вида продуктивности в определенных экономических условиях.

У овец шерстного направления, разводимых только в условиях пастбищного содержания, особенно хорошо развиты кожа и костяк — на их долю приходится около 28 % живой массы. У молочных овец кожа и костяк составляют менее 20 %, а у мясных — около 15 %. В то же время у овец шерстного направления продуктивности мышечная ткань и подкожная клетчатка развиты слабее, чем у овец мясного типа. Удельный вес мяса и жира в туше мясных овец составляет 55—59, шерстных и молочных — только 36— 42 %. У овец молочного направления продуктивности максимального развития достигают внутренние органы и молочная железа.

Овцы шерстного направления продуктивности по сравнению с мясными имеют более интенсивный обмен веществ, более развитые сердце и легкие, в связи с чем грудная клетка у них длиннее. Овцы комбинированного направления продуктивности занимают среднее положение между двумя крайними типами — шерстным и мясным — как по

относительному развитию органов, так и по продуктивности.

Межпородные различия животных в пределах соответствующего направления продуктивности касаются главным образом таких показателей, как складчатость кожи на шее и выраженность мясных качеств у тонкорунных овец, размер и форма курдюка у мясосальных овец и т. д.

Половой диморфизм проявляется у овец в основном в отношении общих размеров баранов и маток, у тонкорунных овец — еще в развитии и складчатости кожи на шее. У большинства тонкорунных и грубошерстных овец бараны имеют довольно большие рога, а овцематки, как правило, комолые.

Мясо-шерстные и курдючные овцы обоего пола комолые. Бараны-производители, как правило, характеризуются более грубой конституцией, особенно грубошерстные. У баранов романовской породы на шее и холке растет длинный и довольно грубый волос в виде черной гривы.

Типы конституции. Профессор П. Н. Кулешов выделил четыре типа конституции — грубый, нежный, плотный, рыхлый. Академик М. Ф. Иванов добавил к этой классификации крепкий тип конституции.

Овцы крепкого типа конституции, наиболее желательного в условиях промышленной технологии, должны отличаться хорошим здоровьем, крепким костяком, пропорциональным телосложением, хорошей многоплодностью, высокой продуктивностью, устойчивостью к заболеваниям и различного рода стрессам.

Характеристика статей экстерьера. При отборе и подборе овец обращают особое внимание на экстерьерные пороки и недостатки, которые являются нежелательными при разведении.

Голова у овец всех направлений продуктивности не должна быть слишком тяжелой и грубой. У животных шерстного направления она более длинная, сухая, у мясо-шерстных — более широкая и короткая. Длинная, узкая, переразвитая, большая и грубая голова нежелательна, так как она указывает на слабое сложение, низкую продуктивность и плохое качество шерсти.

Шея должна быть средней длины, достаточно широкой и глубокой. У мясо-шерстных овец она массивнее и короче, чем у животных шерстного направления продуктивности. Слишком длинная, узкая и плоская шея считается порочной для овец всех направлений продуктивности.

Грудная клетка должна быть широкой и глубокой, так как в ней расположены такие важные органы, как сердце и легкие. Узкая и неглубокая грудная клетка является большим недостатком для овец любого типа, так как она свидетельствует о слабой конституции и плохом здоровье.

Холка должна быть широкой и находиться на одном уровне со спиной. Высокая и острая холка — порок для овец любого направления продуктивности.

Спина с поясницей и крупом должна быть прочной, прямой и широкой, особенно у овец мясных скороспелых пород. Провислость спины, поясницы и крупа — признаки слабости костяка. Горбатая, карпообразная и острая спина считается порочной и связана обычно с пониженной продуктивностью.

Брюхо считается нормальным в том случае, если нижняя часть туловища представляет собой прямую линию, идущую параллельно спине. У высокомолочных овец задняя часть линии брюха обычно несколько опущена. У овец шерстных, смушковых и овчинно-шубных пород должна быть хорошая оброслость брюха рунной шерстью.

Конечности должны быть крепкими, хорошо развитыми и правильно поставленными. Недостаток постановки конечностей — их сближенность в скакательных и пястных суставах, саблистость, так как это затрудняет передвижение овец.

Вымя должно быть объемистым, с нормально развитыми двумя сосками.

Кожа тонкорунных овец тонкая и плотная, у мясных — более рыхлая и тонкая. Очень толстая и рыхлая кожа нежелательна. Толщину и плотность (рыхлость) кожи

обычно определяют путем прощупывания на ухе или на боку.


Интерьер. Изучение интерьера как одного из методов комплексной оценки овец представляет большой интерес, особенно при ранней диагностике продуктивности и резистентности животных. Например, у тонкорунных овец установлена довольно устойчивая корреляция между содержанием эритроцитов и гемоглобина в крови с настригом шерсти. Выявлено также, что абсолютные показатели толщины кожи, развития ее слоев, глубины залегания волосяных луковиц и их размеры у баранов грубошерстных пород и ромни-марш выше, чем у ярок. Количество потовых желез на единицу площади кожи у баранов несколько меньше, чем у ярок, но секреторный отдел потовых желез у баранов развит лучше.

Формирование шерстной продуктивности начинается в эмбриональный период с закладки в коже шерстных фолликулов. В зависимости от сроков их образования, анатомо-морфологических признаков и типов растущих из них волокон фолликулы классифицируют на первичные и вторичные.

Первичные фолликулы образуются с 65—85-дневного возраста эмбриона. Формирование их заканчивается в эмбриональный период. Первичные фолликулы, из которых вырастают более толстые и, как правило, более длинные шерстинки, залегают в коже значительно глубже. У грубошерстных овец это ость и мертвый волос, у тонкорунных — более грубый ягнячий волос (песига).

Вторичные фолликулы образуются несколько позднее — с 75—85-дневного возраста. Наиболее интенсивно этот процесс протекает в период от 80 до 110-го дня развития эмбрионов и заканчивается к рождению ягнят. Из вторичных фолликулов вырастают тонкие шерстинки, которые составляют основную массу руна.

2. Методы оценки экстерьера



Стати овцы: 1 — рот; 2 — ноздри; 3 — морда; 4 — слезная ямка; 5 — лоб; 6 — глаза; 7 — рога; 8 — уши; 9 — холка; 10 — спина; 11 — поясница; 12 — крестец; 13 — хвост; 14 — лопатка; 15 — бок (ребра); 16 — окорок (ляжка); 17 — скакательный сустав; 18 — плюсна; 19 — мошонка; 20 — брюхо; 21 — копыта; 22 — бабка; 23 — запястье; 24 — сокол; 25 — плечо; 26 — шея

Экстерьер оценивают по развитию отдельных статей животного, то есть частей тела, по которым судят о телосложении, выраженности породных и продуктивных свойств, конституциональных особенностях.

В практике применяют два основных способа оценки животных по экстерьеру. Глазомерную оценку экстерьера проводят по специально разработанным для отдельных пород овец шкалам. Шкалы обычно 100-балльные: каждая статья или группа их оцениваются (с учетом

значимости) определенным числом баллов, сумма которых в лучшем варианте должна приближаться к 100. Более объективна по сравнению с глазомерной оценка экстерьера по промерам - показателям высоты, длины, ширины и обхвата отдельных частей тела животного. Промеры используют для вычисления индексов телосложения и экстерьерных

профилей. Определенное значение при оценке экстерьера имеет фотографирование животных в возрасте бонитировки. У овец чаще всего оценивают определенные стати.

3. Типы конституции овец и их зоотехническая характеристика

Продуктивность овец определяется в основном конституцией животного, выражающей наследственную взаимосвязь внешних (экстерьерных) и внутренних (интерьерных) особенностей его организма.

Существуют различные системы классификации типов конституции животных. В зоотехнической практике, в овцеводстве особенно, утвердилась классификация, разработанная выдающимся советским ученым П. Н. Кулешовым, по которой различают грубую, нежную, плотную (сухую) и рыхлую (сырую) типы конституции. Очень важное дополнение к этим типам сделал М. Ф. Иванов, выделив крепкий тип конституции.

Крепкий тип конституции является наиболее желательным для животных всех направлений продуктивности. Такие животные характеризуются хорошим здоровьем, правильным телосложением, нормальными воспроизводительными способностями и устойчивостью к заболеваниям, лучшей приспособленностью к меняющимся условиям среды. Костяк у них крепкий, кожа плотная и эластичная. Животные с крепкой конституцией отличаются более высокой продуктивностью, чему в немалой степени способствует устойчивая нервная система и спокойное поведение.

Грубая конституция присуща примитивным, мало-окультуренным животным, представляет отклонение от желательного типа стада в сторону усиленного развития костяка и утолщения кожи. При хорошем здоровье животные с грубой конституцией характеризуются длинноногостью, большеголовостью и в большинстве случаев горбоносостью, усиленным развитием рогов у баранов, иногда и у маток.

Нежная конституция является антиподом грубой конституции. Для нее характерны тонкая кость, тонкая кожа, тонкий волос. Животные этого типа всегда мельче, имеют узкую морду, тонкие уши, сближенные ноги и свислый круп. Они отличаются низкими показателями воспроизводства, шерстной, мясной и шубно-меховой продуктивности.

Плотная конституция по ряду своих свойств сходна с крепкой. Животные характеризуются хорошим здоровьем, гармоничным телосложением и достаточно хорошей продуктивностью. Однако у них меньше жировых отложений и они более подвижны, чем животные с крепкой конституцией.

Рыхлая конституция противоположна плотной. У животных этого типа крупноволокнистая мускулатура, развитые подкожный соединительнотканый и жировой слои, толстая и рыхлая кожа. Они, как и животные с нежной конституцией, требовательны к условиям кормления и содержания.

В процессе эволюции и искусственного отбора возникли определенные взаимоотношения между органами и тканями организма овцы. В результате исследований развития взаимосвязей органов и тканей овец различного направления продуктивности и типов конституции П. Н. Кулешов установил чрезвычайно важную закономерность, получившую широкую известность в мировой науке и практике как схема (закон) Кулешова. По его данным (табл. 1), у овец шерстного (тонкорунного) направления продуктивности большее развитие получили кожа, кости и внутренние органы, масса которых по отношению к общей массе тела составляет соответственно 12,9; 15 и 37%.

У животных мясного направления продуктивности более высокий относительный показатель имеет масса туши и внутреннего жира (59,6%) и наименьший — костяк (8,7%) и кожа сырая (6,2%). Молочные овцы характеризуются сильным развитием внутренних органов (50,6%), прежде всего органов пищеварения, и меньшим — туши (36%).

2.3 Семинарское занятие №3 (2 часа).

Тема: «Породы овец»

2.3.1 Вопросы к занятию:

1. Полутонкорунные породы: цигайская, ромни-марш, куйбышевская, северокавказская, горьковская.
2. Полугрубошерстные породы: сараджинская.
3. Грубошерстные породы: эдильбаевская, каракульская, романовская, черкасская, карачевская.

2.3.2 Краткое описание проводимого занятия

1. Полутонкорунные породы: цигайская, ромни-марш, куйбышевская, северокавказская, горьковская.

Куйбышевская порода овец - имеет мощную конституцию, бочкообразное и продолговатое туловище. Конечности низкие, крепкие. Голова широкая, шея короткая. Спина, как и поясница - прямая. Овцы куйбышевской породы комолые. Холка довольно мускулистая. Отлично развитые ляжки.

Горьковская порода овец - характеризуются крепкой конституцией и хорошо выраженными мясными формами. Голова короткая, широкая. Длина шеи средняя, она довольно мускулистая. Бочкообразная форма туловища. Конечности поставлены широко, невысокие. Бараны, как и овцематки - комолые.

Цигайская порода овец - имеет крепкую конституцию. Туловище бочкообразное, компактное, средней длины. Грудь широкая и глубокая. Холка и крестец широкие. Прямая спина. Копыта прочные, конечности крепкие. Хвост длинный, тощий. Голова средних размеров, сухая. Бараны рогатые, матки комолые.

Ромни марш - им характерен массивный и крупный вид, имеют мощный костяк и крепкую конституцию. Туловище широкое, глубокое. Конечности крепкие, невысокие. Овцы ромни комолые.

Северокавказская мясо-шёрстная

Полутонкорунная, мясо-шёрстного направления. Выведена путем скрещивания овцематок ставропольской породы с баранами ромни-марш и линкольн. Оцы этой породы отличаются своими хорошими нагульными и убойными качествами. Разводят животных этой породы преимущественно в Кабардино-Балкарской Республике, а также в некоторых центральных регионах России.

Животные этой породы крупные, с хорошо развитым костяком, высокие. Характеризуются хорошей мясной и шерстной продуктивностью. Туловище овец северокавказской породы длинное, конечности высокие и крепкие. Грудь широкая, глубокая. Холка, спина, поясница и крестец широкие. Голова широкая, короткая. Северокавказские овцы - безрогие. Ноги крепкие, окорока широкие, хорошо выполненные. Живой вес баранов достигает 90-100кг, овцематок 55-60кг.

Голова северокавказских овец покрыта шерстью до линии глаз, а ноги до запястного и скакательного суставов. Шерсть однородная, белого цвета, блестящая, с ярко выраженной извитостью. Руно шпательного и штапельно-косичного строения. Плотность средняя. Длина шерсти у баранов составляет 10-13см. Настриг шерсти с баранов составляет 9-12кг, с маток 5-6кг. Тонина 56-60 качества. Выход чистой шерсти составляет 55-58%.

Овцы северокавказской породы достаточно плодовитые. Плодовитость составляет 120-130%.



2. Полугрубошерстные породы: сараджинская.

Сараджинская порода овец относится к полугрубошерстным, курдючным поодам. Овец сараджинской породы выводили в юго-восточных районах Туркмении с помощью длительного отбора местных пендинских (курдючных) овец. Название породы получила от аула Сары-Джа, который находится вблизи г. Мары.

Сараджинские овцы характеризуются компактным, но довольно крупным телосложением. Спина широкая и длинная, голова имеет прямой профиль, конечности крепкие, грудь глубокая. Курдюк средних размеров - 6-8 кг, немного свисает. У некоторых баранов имеются рога, остальные животные комолые.

Живой вес барана - 80-90 кг, овцематки - 55-60 кг, баранчика, который достиг 5 месячной возрастной группы - 35-38 кг. **Сараджинская порода овец** - является самой лучшей среди курдючных овец по шерстной продуктивности.

Шерсть овец имеет слабый блеск, белого цвета, с большим количеством пуха длиной 8 см, практически нету мертвого волоса. Руно характеризуется косичным строением (длина косиц - 12-19 см). Проводится 2 стрижки, после которых с одного барана получают - 4-5 кг шерсти, а с овцематок - 3-4 кг. Шерсть используется для производства ковров. Матки имеют нормальную плодовитость - 110-120 %.



Преко́с (мясной меринос)

Тонкорунные, мясо-шерстного направления продуктивности. Овцы породы преко́с скороспелые, обладают хорошими мясными качествами и высокой шерстной продуктивностью. Животные породы преко́с являются ведущей породой в овцеводстве Украины. Также овец породы преко́с разводят в ряде районов Курской, Брянской, Воронежской, Тамбовской, Белгородской, Омской, Оренбургской областей и Красноярского края.

Преко́сы обладают крепкой конституцией. Костяк крепкий, ноги крепкие, широко поставленные. Спина широкая, ровная. Матки комолые, а 20% баранов рогатые. Туловище широкое, округлое. Хорошо развитые поясница и ляжки.



Вес баранов достигает 100-120кг, маток 60-70кг. Рунная шерсть наголове растет только доглаз, наконечностях-дозапястных искакательных суставов. Шерсть вруне прекосов более редкая, чем уовец других тонкорунных пород, часто недостаточно уравнена потонине образующих еееволокон, иногда назадных частях тела более грубая. Оброслость брюха недостаточная. Шерсть 64-го и 60-го качеств. Длина шерсти составляет 7-8см. Выход мытой шерсти достигает 47-50%.

Овцематки породы прекос достаточно плодовиты. Плодовитость составляет 140-150%.

3. Грубошерстные породы: эдильбаевская, каракульская, романовская, черкасская, карачевская.

Эдильбаевская порода грубошерстных овец

Данная порода была выведена селективным путем в 19 веке в Казахстане. В ее создании участвовали астраханские бараны и казахские овцы. Эдильбаевская порода хорошо переносит как знойную жару и засуху, так и суровую зиму. И бараны производители, и овцематки – комолые. Это одни из самых крупных представителей грубошерстных пород, где особь мужского пола достигает веса в 160 кг, а женского в 100 кг. Средними показателями принято считать 120 кг для барана, и 70 кг для матки.

У них отличная шерстная продуктивность. Используя электрические ножницы для стрижки овец, стригали могут получить около 5 кг руна с барана, и до 3 кг с матки. Как и другие грубошерстные породы, эдильбаевская курдючная имеет неоднородный покров с преобладанием пуха (до 55%), ости (30%) и переходного волоса (15%). По масти овец делят на рыжую, бурую и черную.

Овцематки дают 100% плодовитость, иногда +20%. Молочная производительность также высокая – до 155 л при жирности 5,8%. Молоко эдильбаевских овец используется в приготовлении сыра примчика, кислого молока айрана, сыра курта и масла.

Каракульская грубошерстная порода овец

Всем известные каракулевые шубы и меховые изделия получают благодаря овцам смушковой группы – каракульской породы. Смушка – это мех новорожденного ягненка (до 3 дней) с характерными завитками. Эту породу можно разделить на 3 типа: нежная, грубая и крепкая.

Каракульская грубошерстная порода овец отлично приспособлена к засушливым районам, скудным пастбищам и знойной погоде. Сегодня овец каракуль разводят на Украине, в России, средней Азии и некоторых странах СНГ.

Конституция каракульских овец плотная, с крепкими конечностями и удлиненной головой. Бараны данной породы рогатые, а овцематки комолые. Вес барана-производителя может достигать 90 кг, овцематки до 50 кг. Последние плодовиты и дают

много молока, которое используют при производстве брынзы.

Состриженная агрегатами для стрижки овец шерсть каракульской овцы имеет отличную валкость и поэтому используется в производстве ковров и тканей грубого типа. Овцы имеют неоднородный шерстяной покров, в котором длина волокон достигает 9 см. рекомендуется стрижка аппаратами для стрижки овец 2 раза в год. Смушки могут быть разных оттенков – белого, коричневого, серого, серного, розового, но наиболее распространенный цвет покрова молодняка – черный.

Романовская порода овец

К шубо-мясной группе овец относится романовская порода, одна из самых древних и остающаяся самой перспективной во всем мире. Им присущи высокие продуктивные качества, а также отличные биологические особенности. Овцы романовской породы многоплодны и дают универсальную продукцию – овчину и баранину.

В Ярославской области она была выведена крестьянами, и сегодня бараны производители достигают веса в 100 кг, а овцематки до 70 кг. Аппарат для стрижки овец, используемый 3 раза в год, позволяет получить с одного барана и овцы от 2 до 3 кг руна. Овцематки славятся многоплодностью и за раз нередко приносят тройни и четверни. Не редки случаи и 5-плодной беременности. В год матка романовской породы приносит приплод 2 раза. Выведенные в вольных условиях, романовские овцы хорошо переносят холод и отсутствие излишеств в уходе, но не приспособлены к жизни в хлевах. Все, что им нужно – солома, сено зимой, летом зеленые пастбища.

Шерстный покров, получаемый благодаря агрегатам для стрижки овец, состоит из пуха и ости разных цветов. Пух белого цвета, а ость черная. По цвету шерсти можно легко определить масть овец. Если шерсть почти вся черная, значит, преобладает ость, если белая или светло серая, значит, доминирует пух. Лучшим сочетанием двух типов волокон считается соотношение 8 остинков к одному остевому волосу.

Когда стригаль получает руно, состригая его машинкой для стрижки овец, оно имеет голубоватый оттенок. Такая шерсть не сваливается, в ней ость хорошо поддерживает пух. Пух у романовских овец длиннее ости и на кончиках имеет завитки.

Считается, что 5-месячные ягнята романовской породы, проходящие первую обработку электрическими ножницами для стрижки овец, имеют самое качественное руно.

Что касается мясной продуктивности данной породы, то она также высока – уже через 3 месяца ягнята, как правило, имеют вес под 30 кг.

Черкасские овцы — мясо-шерстные грубошерстные породы овец. В эту группу входят также михновская и кучугуровская овцы. Выведена крестьянами северных районов Куйбышевской области. При создании породы большое внимание уделялось шерстной продуктивности. Поэтому у черкасских овец очень хорошая оброслость рунной шерстью всего туловища, конечностей и морды.

Шерсть белого и черного цвета, длиной 16—18 см. Настриг с маток составляет 3—4 кг, с баранов — 5—8 кг. Живая масса маток 60—65 кг, баранов — 70—90 кг. Однако мясные качества туши неудовлетворительные, выход мяса низкий. Черкасских овец разводят в северных районах Куйбышевской области.

Карачаевская порода овец (грубошерстная порода овец). Карачаевская порода овец имеет характерным признак — особая форма жирного хвоста, похожего на хвост каракульских овец. Живая масса маток 40—50 кг. Шерсть может быть черного и белого цвета. Настриг шерсти в год около 1,5—2 кг. Из шерсти делают бурки и валяную обувь. Молодая баранина отличается хорошим качеством и пользуется большим спросом у местного населения, карачаевские овцы дают значительное количество молока. От одной матки получают в среднем 30—50 кг товарного молока. Слева фото карачаевская порода овец.

Эта порода, на которую не могут действовать ни сильные морозы, ни сильные дожди. Она обладает сильным природным иммунитетом. У нее никогда не встреча-ются

легочные заболевания, а так же заболевания копыт или конечностей. Она на редкость здоровая. У этой породы не встречаются больные, слабые или хромы овцы. Ягнята ее рождаются с крепким костяком и густой шерстью. Селекционеры выводят и подразделяют породы овец – на шерстяных, молочных и мясных. Карачаевская же порода является одновременно шерстяной, мясной и молочной.

2.4 Семинарское занятие №4,5 (4 часа).

Тема: «Понятие о шерсти. Формирование шерстной продуктивности»

2.4.1 Вопросы к занятию:

1. Технические свойства шерсти : длина, толщина, извитость, крепость, растяжимость, упругость, валкоспособность, прядомость и др.
2. Жиропот и его значение в сохранении технических свойств шерсти.
3. Пороки шерсти и меры борьбы с ними.

2.4.2 Краткое описание проводимого занятия:

1. Технические свойства шерсти: длина, толщина, извитость, крепость, растяжимость, упругость, валкоспособность, прядомость и др.

Технические свойства шерсти характеризуются составом, тониной, длиной, извитостью, крепостью, растяжимостью, упругостью, эластичностью, цветом, блеском, влажностью и выходом чистого волокна.

Длина шерсти

Длина – один из важных показателей, определяющих производственное назначение шерсти, классность тонкорунных и полутонкорунных овец и получаемых с них рун. Современная текстильная промышленность работает на длинной гребенной (камвольной) и короткой аппаратной (суконной) шерсти. Шерсть длиной 4-6 см перерабатывают в суконные и трикотажные изделия, а длиной 7 см и более – в гладкие (камвольные) ткани, имеющие наиболее широкое применение.

Длина особенно важна для пуха, полутонкой и тонкой овечьей шерсти. Длина шерсти может быть естественной (высота шерстинок в штапеле или косице с извитостью) и истинной (длина распрямленных шерстинок). За естественную длину принимается высота штапеля или косицы с естественной извитостью или волнистостью шерстинок. Ее измеряют линейкой с точностью до 5 мм.

В косице определяют два измерения – длину ости и длину пухового яруса. Эти измерения записывают дробью: в числителе – общая длина косицы (ости), в знаменателе – длина пухового яруса. Истинная длина – длина шерстных волокон в распрямленном, но не растянутом состоянии. Ее измеряют с точностью до 1 мм. Для определения истинной длины используют приборы 4-10-2-2а (для волокон длиной до 200 мм) и 4-10-1-26 (для волокон длиной до 350 мм).

Рост шерсти в длину зависит от породы, пола и возраста овец, уровня их кормления, условий содержания и других факторов. Длина шерсти тонкорунных овец 6-11 см, полутонкорунных 12–40 см, грубошерстных 20–30 см. Бараны и валухи продуцируют более длинную шерсть, чем матки. У молодняка до годовичного возраста шерсть растет быстрее, чем у взрослых овец; в течение 4-5 лет прирост шерсти за год примерно одинаков, а после 5-6-летнего возраста скорость роста шерсти замедляется. При низком уровне кормления замедляется рост шерсти, волокно утончается, снижается его прочность. Длина шерсти на разных участках тела животного различна: на лопатках, боках, ляжках она более длинная, чем на брюхе, спине.

Извитость шерсти

Извитость свойственна шерстным волокнам всех типов, кроме кроющего волоса. Извитость – ценный признак шерсти, который способствует предохранению руна от

попадания в него механических примесей и атмосферных осадков. Это качество учитывается при бонитировке овец и классировке шерсти. В тонкой и полутонкой шерсти различают три основные формы извитков: нормальные, плоские и высокие. Если извитки близки по форме к полуокружности, их называют нормальными, что характерно для шерсти тонкорунных овец. У плоских извитков высота дуги извитка меньше ее основания.

Растяжимость шерсти

Растяжимость – свойство увеличивать длину под влиянием разрывающих усилий. При этом имеется в виду удлинение волокон, которое наступает после распрямления извитков. Изделия, изготовленные из волокон с большей растяжимостью, имеют лучшую носкость.

Упругость шерсти

Упругость – способность восстанавливать форму после сжатия. Техническая ценность упругой шерсти заключается в том, что при изготовлении ворсистых тканей (сукно, драп) получается хороший ворс, а шерстяная одежда сохраняет приданную ей форму. Практически упругость определяют, сжав в руке небольшой клочок шерсти. После разжимания руки упругая шерсть восстанавливает первоначальную форму. Шерсть, не обладающую упругостью, называют ватной, ватистой, вялой, мертвой.

Эластичность шерсти

Эластичность – способность шерсти принимать любую форму. Это свойство используется при глажке тканей и при искусственной завивке овчин.

Пластичность шерсти

Свойство шерсти сохранять свою форму после воздействия тепла, влаги и давления.

Цвет шерсти

Цвет зависит от наличия в корковом слое мельчайших пигментных зерен. Козий пух имеет белый, коричневый или серый цвет разных оттенков, ангорская шерсть – белый цвет. Наиболее ценятся белая шерсть и белый пух, так как их можно окрашивать в любые цвета.

Блеск шерсти

Блеск – способность отражать лучи света. Блеск в той или иной степени свойственен всем шерстяным волокнам и обусловлен строением чешуйчатого слоя. В зависимости от интенсивности блеск может быть сильным (стекловидный, люстровый, полуполулюстровый), умеренным (глянцевый, серебристый, шелковистый) или отсутствовать (матовая шерсть). Блеск шерсти передается по наследству, придает тканям нарядность и живость. Наиболее сильным блеском обладает шерсть ангорских коз и линкольнских овец. Умеренным блеском обладает козий пух. Матовая шерсть у большинства грубошерстных и полугрубошерстных пород овец.

Мягкость шерсти

Иногда выделяют такое качество шерсти, как мягкость, которую определяют на ощупь. Самыми мягкими считаются тонкая овечья шерсть и козий пух.

Валкость шерсти

Валкость – способность шерстных волокон после воздействия высокой температуры, влажности и некоторых химических веществ, тесно переплетаться, образуя плотную массу – войлок. Валкость обусловлена строением чешуйчатого слоя, упругостью, эластичностью и извитостью.

Прядомость шерсти

Прядомость – ценное свойство шерсти, выражающееся в ее способности образовывать пряжу. Прядомость влияет на продуктивность шерсти.

2. Жиропот и его значение в сохранении технических свойств шерсти.

Жиропот шерсти – это вещество, напоминающее по своему виду и консистенции мягкое сало, оставляющее при соприкосновении с шерстью на руках маслянистые пятна. Жиропотом шерсти называется химическое соединение выделений сальных и потовых

желез.

Сальные железы вырабатывают кожное сало, называемое чаще шерстным жиром. Находятся они и в коже и расположены по две около каждого корня волоса. Потовые железы имеются везде в коже независимо от того, растут на ней волосы или нет. Потоотделение служит как для терморегуляции тела животного, так и для выделения из организма вредных продуктов обмена веществ.

Шерстный жир и пот различаются своим химическим составом. Жиропот обнаруживает щелочную реакцию, шерстный жир - кислую. В процессе взаимодействия пота с шерстным жиром происходит реакция частичного омыления соединений шерстного жира.

Растворимыми в холодной воде веществами жиропота является пот, состоящий из воды (98-99%), органических соединений и минеральных веществ в виде солей калия и натрия. Не растворимые в воде соединения жиропота, называемые шерстным жиром, принадлежат не к жирам, а к жироподобным веществам.

Шерстный жир состоит из соединений холестерина с высокомолекулярными жирными кислотами, свободных жирных кислот (олеиновой, лауриновой, стеариновой) и других органических соединений.

Жиропот трудно омыляется, в воде не растворяется, но полностью растворяется в бензине, бензоле, эфире и сероуглероде; в сгущенном виде жиропот имеет вид мажущейся массы коричневого цвета с неприятным запахом.

Количество и качество жиропота зависит от породных, индивидуальных и половых особенностей овец. Наибольшее количество жиропота содержится в шерсти тонкорунных овец, меньше его в шерсти полутонкорунных, еще меньше в полугрубой шерсти и наименьшее количество наблюдается в грубой шерсти.

На жиропот шерсти влияет индивидуальность овцы.

На различных частях тела животного распределение шерстного жира также различно.

Наибольший процент жира содержится в шерсти на спине. Но шерсть спины обычно хуже, чем шерсть на лопатках и боках. Это объясняется тем, что на спине овцы штапели растут менее плотно, что способствует проникновению внутрь штапеля загрязнений и других разрушающих влияний.

Уменьшение жира у вершины штапеля объясняется тем, что легкоплавкий жиропот у овец, особенно если его мало в шерсти, под влиянием атмосферных условий теряет защитный слой жира, окисляется, становится сухим и теряет свои свойства. К наружным концам штапелей жиропот обычно темнеет, становится клейким и даже смолистым.

Резкое снижение количества шерстного жира, сухость шерсти, особенно вершин штапеля, с понижением физико-механических свойств шерсти - обычно результат плохого кормления овец.

Жиропоты подразделяются на легкорастворимые (белого и кремового цветов) и труднорастворимые (ржаво-красного и зеленоватого цветов). Под растворимостью (плавкостью) жиропота понимается его отмываемость от шерсти. Возможность удаления жиропота из шерсти во время мойки зависит от точки плавления шерстного жира и его химического состава. Точка плавления жиропота мериносовой шерсти 39° , с мериносовых баранов - 44° и т. д. Это имеет значение при составлении режима мойки шерсти.

Белый и кремовый жиропоты характеризуются большим содержанием соединений олеиновой кислоты, мыла, т. е. продукта химического соединения олеиновой кислоты со щелочами.

Жиропоты ржаво-красный или зеленоватый с лимонным оттенком содержат соединения твердых жирных кислот: пальмитиновой и стеариновой. Эти виды жиропота встречаются в виде смолистых крупинки или восковидных прослоек. Такие явления чаще сопутствуют болезненному состоянию животного, кожным заболеваниям или являются их индивидуальной особенностью.

С технологической точки зрения труднорастворимые жиропоты считаются злокачественными, так как требуют усиленного режима мойки шерсти.

Жиропот имеет большое значение для сохранения физико-химических свойств шерсти. Он предохраняет шерстный покров от влажного воздуха, дождей и других вредных воздействий (испарений из навоза, мочи и т. д.). В тонкой и полутонкой шерсти жиропот препятствует проникновению песка, пыли и грязи внутрь руна. Поэтому зона загрязненности нормально жиропотной шерсти всего 5-10 мм. Сухая шерсть без жиропота становится жестковатой, теряет нормальный блеск.

Экспертным путем количество и качество жиропота оценивают таким образом. Качество жиропота определяется его цветом: белый и кремовый различных оттенков считается доброкачественным, легкорастворимым; ржаво-красный и зеленоватый - злокачественным, труднорастворимым.

Количество жиропота в руне считают нормальным, если загрязненность минеральными примесями (песком, пылью, землей) проникает не более чем на 1/3 глубины штапеля, рассматриваемого на боку овцы.

При приемке шерсти в заготовительных организациях органолептические приемы определения количества жиропота сводятся к ощупыванию руна в разных местах, по ощущению сальности судят о его количестве. Применяют также скручивание тонкого штапелька шерсти «в ниточку», затем скрученный штапелек растягивают. Количество жиропота органолептически определяют по степеням: нормально, мало и много. При нормальной жиропотности он выступает на поверхности скрученного штапелька и темнеет; при недостатке - не выступает, отчетливо видны волокна шерсти; при избытке - при проведении пальцем по скрученному штапельку остается маслянистый след. При нормальном количестве жиропота загрязненность не проникает более чем на 1/3 глубины штапеля, при малом количестве жиропота - большая зона вымытости штапеля.

Из жиропота шерсти получают ценный фармацевтический и косметический продукт ланолин.

На шерстомойках в жиродобычном цехе получают ланолин в обезвоженном состоянии, который представляет собой массу коричневатого оттенка в виде мази. Точка плавления ланолина 38-40°, он легко растворяется в эфире и хлороформе, но не растворяется в воде и даже в горячем абсолютном спирте.

3. Пороки шерсти и меры борьбы с ними.

Основным пороком является: засоренность шерсти растительными примесями, которые делят на легко - и трудноотделимые. Первыми называются примеси, легко удаляемые из шерсти при ее переработке: это солома, сено, кормовой сор, русский репей.

Трудноотделимые – такие, которые настолько прочно удерживаются в шерсти, что ее очистка вызывает большие затруднения: это тырса (плод ковыля), крымский репей, овсюк.

Чтобы повысить доходность овцеводческих хозяйств от реализации шерсти, необходимо вести систематическую борьбу с ее засорителями. Прежде всего необходимо кормить овец из кормушек с наклонами стенок от животного, раскладывать грубые корма в ясли в отсутствии овец, не допускать их к стогам, к скирдам, удалять вручную легко и трудноотделимый сорт с шерстного покрова овец перед их стрижкой; стравливать или скашивать сорняки до цветения, использовать для подстилки пшеничную или ржаную круп остепельчатую солому.

Дефекты шерсти возникают при плохом кормлении, содержании, уходе за овцами недостаточной организации и проведении стрижки, упаковки, хранения и транспортировки шерсти.

При плохом уходе и содержании овец хозяйство получает много базовой, кизячной и сваленной (свалок) шерсти, а также желтяка.

Кизячная шерсть – образуется при обволакивании шерстного волокна навозом, пучки шерсти находятся как бы внутри засохших комков навоза.

Свалок – шерсть в нижней или в верхней части штапеля сваливается в войлок; войлочный слой залегает по всей толщине площади руна, возникает при скрученном содержании в душных, сырых помещениях, а также при истощении, недостатке жиропота.

Пожелтение – (желтяк) – шерсть утрачивает и приобретает грязно-желтый цвет, который не отмывается при фабричной мойке. Из такой шерсти нельзя изготовить хорошей ткани. Возникает при загрязнении руна навозом и мочой. Шерсть желтеет от неправильной обработки рунов после стрижки, несвоевременном купании овец в креолиновых ваннах и по другим причинам.

Базовая шерсть (забазованность) – отличается от кизячной тем, что она загрязнена навозом, мочой и землей по всему руну.

Для уменьшения количества дефектов не следует допускать скученности овец, сырости и грязи в кошарах; необходимо переводить животных со стойлового содержания на пастбищное постепенно; не задерживать овец более 4-5 дней в тырле; менять подстилку в кошарах, в стойловый период.

Голодная тониная, переслед – шерстные волокна в отдельной зоне штапеля или одновременно вверху и внизу сильно утончаются, образуют просветы (уступы, перехваты), утрачивают в этой зоне крепость. Возникает как следствие голодание овцы в данный период, так и заболевания, ослабленности организма. Чтобы предотвратить появление голодной тонины, необходимо, полноценное кормление в течение всего года.

Тавро (дегтярка) – шерсть испорчена различными несмываемыми отметками – дегтем, мазутом, масляной краской и другими портящими цвет шерсти веществами. Для предотвращения этого дефекта необходимо метить овец только красками, в основе которых лежит ланолин, и при том только на морде или ушах; выстригать запачканные красителям верхушки штапелей или косиц непосредственно на овцах.

Маркирная – дефект конституционального характера. При этом шерсть переразвита, имеет петлистые извитки, утратила крепость, упругость и другие и другие ценные качества.

Животных с порочной извитостью не следует допускать к воспроизводству стада во избежание передачи этих признаков по наследству.

Многие дефекты появляются при неправильной стрижке.

Сечка (перестрига) – мелко изрезанная шерсть длиной 0,2- 0,3 см получается при повторном прохождении гребенки по стриженному месту. Сечка – это невозвратные потери шерсти.

Шкура – шерсть со срезанными при стрижке кусочками кожи, которые высыхая, делаются твердыми и не отделяются от шерсти при фабричной обработке. Шкура очень портит шерсть и машины, на которых ее прочесывают после мойки.

К дефектной шерсти относится также шерсть гнилая (или прелая), утратившая крепость, эластичность, упругость, прядистость вследствие сухости и ломкости шерстных волокон.

Чтобы предупредить появление горелой или прелой шерсти, нельзя стричь овец с мокрой шерстью; упаковывать шерсть с повышенной влажностью; хранить шерсть на подтоварниках; если шерсть подмокла, ее следует немедленно просушить до воздушно-сухого состояния.

Наличие дефектов и пороков обесценивает шерсть. Размер скидок с цены при том или ином дефекте установлен Государственным Комитетом по прейскуранту № 70-54. На основании этого проводятся расчеты потерь в деньгах при оплате дефектной шерсти того или иного вида.

Размер скидки с цены на тонкую шерсть: сорно-репейная 1 группы – 5%, сорно-репейная 2 группы – 10%, дефектная 2 группы – 15%, сорно-репейно-дефектная – 15%.

2.5 Семинарское занятие №6 (2 часа).

Тема: «Классификация отечественной шерсти. Группы и виды шерсти»

2.5.1 Вопросы к занятию:

1. Группы и виды шерсти
2. Промышленная классификация шерсти

2.5.2 Краткое описание проводимого занятия

Шерсть по составу образующих ее волокон подразделяют на однородную и неоднородную. (Ерохин А.И, 2001г).

Однородной называют шерсть, состоящую из одинаковых по внешнему виду, длине, тонине и другим свойствам волокон.

К однородной относят тонкую шерсть, средняя тонина волокон которой не превышает 25 мкм. Овец, от которых получают тонкую шерсть, называют тонкорунными. Тонкая шерсть в технологическом отношении самое ценное сырье, которое в основном идет на изготовление костюмных тканей.

Полутонкая - однородная шерсть тониной 25,1-31,0 мкм. Овец, от которых получают полутонкую шерсть, называют полутонкорунными.

Полугрубая однородная шерсть имеет тонины шерстяных волокон от 31,1 до 40,0 мкм. Такую шерсть получают от овец цигайской, русской длинношерстной пород.

Грубая однородная шерсть состоит из тонкой ости, в которой сердцевина отсутствует или может занимать удельный вес, ее тонина в пределах 40,1-67,0 мкм. Овцы английских длинношерстных пород (линкольн, лейстер, дортмур) и в их типе дают грубую однородную шерсть.

Неоднородная (смешанная) шерсть представляет собой смесь ости, пуха и переходных волокон, отчетливо различающихся по тонине, длине, извитости и другим признакам.

Неоднородную (смешанную) шерсть разделяют на грубую и полугрубую.

Грубая неоднородная шерсть состоит из пуха, переходных и остевых волокон, часто с примесью сухих и мертвых волос. Качество грубой неоднородной шерсти зависит от соотношения в ней волокон различных типов, их тонины и длины. Чем больше в грубой шерсти пуха и меньше ости, тем она ценнее. По комплексу технических свойств грубая шерсть значительно уступает тонкой, полутонкой и полугрубой. Грубую неоднородную шерсть получают с овец всех грубошерстных овец.

Полугрубая неоднородная шерсть состоит из тех же типов волокон, что и грубая, но отличается от нее более высоким содержанием жира, лучшей извитостью, более тонкой остью и большим количеством пуха. Полугрубую неоднородную шерсть получают от овец сараджинской, алайской, таджикской и ряда других пород. Из нее вырабатывают: ковры, сукна, валяльные изделия

2. Классификация шерсти

Всю натуральную овечью шерсть можно разделить на следующие виды: в зависимости от тонины шерсти – тонкую, полутонкую, полугрубую и грубую.

В зависимости от типа волокон – однородную и неоднородную (смешанную).

Однородная шерсть – шерсть, состоящая из одного типа волокон.

Тонкая шерсть в общей массе состоит из тонких, мелко извитых пуховых волокон, имеет штапельное строение и отличается высокой однородностью по толщине и длине. Незначительное содержание ости и мертвого волоса считается пороком тонкой шерсти. Средняя толщина волокон этой шерсти изменяется в

пределах 14,5 - 25 мкм, а длина – 25 - 120 мм.

Тонкую шерсть со средней длиной от 55 мм и выше, перерабатывают по гребенной, а с меньшей длиной - по аппаратной системе прядения. Тонкая шерсть разделяется на тонкую мериносовую и тонкую помесную.

Тонкая мериносовая шерсть состригается один раз в год - весной с чистопородных тонкорунных мериносовых овец.

Тонкая помесная шерсть состригается с овец помесей один раз в год - весной. Помесными называются овцы, полученные в результате скрещивания овец различных пород, главным образом тонкорунных баранов типа мериноса с грубошерстными матками. От первого скрещивания, например мериносового барана с грубошерстной маткой, получают помесь первого поколения. В результате скрещивания мериносового барана с помесной маткой первого поколения получают помесь второго поколения и т. д. Чем выше поколение помеси, тем шерсть по своим свойствам ближе к мериносовой. Помеси четвертого поколения дают шерсть, мало отличающуюся от мериносовой.

Полутонкая шерсть обычно состоит из волокон пуха и тонкого переходного волоса. Она характеризуется однородностью по толщине и длине, имеет штапельное и штапельно-косичное строение и более крупную извитость волокон, чем тонкая шерсть. Средняя толщина волокон полутонкой шерсти 27 мкм при коэффициенте неравномерности по толщине, не более 21%.

Полутонкую шерсть дают помесные овцы, выведенные путем скрещивания грубошерстных овец с тонкорунными, и чистопородные полутонкорунные овцы, дающие однородную полутонкую шерсть. По своим техническим свойствам полутонкая шерсть приближается к тонкой. Ее используют в основном для

выработки гребенной пряжи. Шерсть цигайских овец является сырьем для выработки технических сукон высокого качества.

Полугрубая шерсть разделяется на однородную и неоднородную.

Полугрубая однородная шерсть состоит из волокон ости, характеризуется штапельно-косичным строением руна, средней и крупной извитостью; средняя толщина шерсти 31 - 37 мкм. Однородная полугрубая шерсть состригается один раз в год - весной и используется в грубогребенном прядении.

Полугрубая неоднородная шерсть имеет косичное строение, состоит из пуховых, остевых и переходных волокон. Эта шерсть состригается с помесных тонкорунных грубошерстных и полутонкорунных грубошерстных овец, дающих неоднородную шерсть. Неоднородная полугрубая шерсть состригается два раза в год и в зависимости от времени стрижки носит название весенней или осенней. Она

состоит из пуха, переходного волоса, ости и является смешанной.

Грубая шерсть разделяется на однородную и неоднородную.

Грубая однородная шерсть, так же как и полугрубая, состоит из волокон ости, имеет штапельно-косичное строение. Штапели-косицы характеризуются крупной волнистой извитостью. Средняя толщина волокон шерсти изменяется в пределах 40 - 67 мкм. Эта шерсть состригается в основном с овец калининской и

английской линкольнской пород и отличается большой длиной – 150 - 300 мм, используется в гребенном прядении.

Грубая неоднородная шерсть состригается с различных грубошерстных овец. Эта шерсть имеет косичное строение и состоит из тонкого пуха, переходного волоса, ости, сухого и мертвого волоса и является неоднородной смешанной шерстью.

В зависимости от породы грубошерстных овец, которая определяется главным образом районом их разведения, грубая шерсть носит различные наименования:

русская северная, среднерусская, украинская, горская, тушинская, лезгинская, карабахская, каракульская, горнокарпатская, ордовая, гисарская и др.

Каждая из этих разновидностей шерсти в той или иной степени отличается одна от другой по своим техническим свойствам; эти различия следует учитывать при назначении шерсти в смесь для наиболее целесообразного ее использования.

Шерсть однородная тонкая, полутонкая, полугрубая и грубая состригается, как правило, один раз в год - весной, а шерсть неоднородная грубая и полугрубая - два раза в год - весной и осенью.

Весенняя шерсть богаче пухом, она более эластичная и упругая. Весеннюю шерсть состригают с овцы в виде связного покрова - руна, поэтому ее называют рунной.

Весенняя овечья шерсть представляет основную и более высококачественную часть сырья для шерстеобрабатывающей промышленности, поэтому классификация и стандартизация шерсти в России разработаны применительно к весенней шерсти.

Весеннюю шерсть, как более прядому, используют как в аппаратном, так и в гребенном прядении.

Осенняя шерсть содержит меньшее количество пуха, она более жесткая и сухая, так как овца в летнее время подвергается воздействию солнца, ветра и резко изменяющихся атмосферных условий. Осенняя шерсть состригается в виде разрозненных клочков - косиц.

Эта шерсть менее прядомая, но обладает хорошей валкоспособностью, поэтому ее используют не только в прядении, но и в валяльно - войлочной промышленности.

Поярковая шерсть (поярок) - это шерсть, состригаемая с ягнят в возрасте до 6 мес. Поярок представляет собой довольно мягкую шерсть, состоящую из пуховых волокон, переходных волокон и тонкой ости.

Поярковую шерсть, как правило, используют в аппаратном прядении. Шерсть неоднородна по своим свойствам даже в руне одной овцы.

Поэтому для более целесообразного промышленного использования шерсть различных пород овец разделяют на разделы, группы, качества или сорта. Система распределения овечьей шерсти на разделы, группы, качества или сорта называется классификацией шерсти.

В России принята научно-техническая классификация нормальной весенней овечьей шерсти, разработанная Центральным научно-исследовательским институтом шерсти (ЦНИИшерсти).

В основу этой классификации положены следующие основные признаки:

- 1) средняя толщина волокон шерсти и ее однородность по толщине;
- 2) средняя длина волокон шерсти и ее однородность по длине;
- 3) прядильная способность;
- 4) валкоспособность.

В соответствии с указанной классификацией вся весенняя нормальная шерсть разделяется на однородную и неоднородную (смешанную).

Шерсть однородная в зависимости от толщины волокон делится на четыре раздела, а внутри раздела на сорта - качества:

- 1) однородная тонкая — 80к, 70к, 64к, 60к - (14,5 - 24,94 мкм)
- 2) однородная полутонкая — 58к, 56к, 50к - (24,95 - 30,99 мкм)
- 3) однородная полугрубая — 48к, 46к, 44к - (31,00 - 36,19 мкм)
- 4) однородная грубая — 40к, 36к, 32к - (36,20 - 40,20 мкм)

Понятие качества шерсти заимствовано из английской классификации или, как ее называют, брадфордской классификации шерсти. Качество шерсти по брадфордской классификации обозначается числом, показывающим число мотков пряжи длиной 560 ярдов, которую можно выработать из одного английского фунта гребенной ленты (1 ярд = 0,9144 м, 1 англ. фунт = 453,6 г).

Качество шерсти в нашей классификации является условным обозначением толщины волокон шерсти и в

какой-то степени связывается с ее прядильной способностью. Чем меньше толщина волокон шерсти, тем выше ее качество и выше прядильная способность.

Неоднородная шерсть в зависимости от степени ее неоднородности делится так-же на четыре раздела:

- 1) смешанную полугрубую и грубую уравненную;
- 2) смешанную полугрубую и грубую менее уравненную;
- 3) смешанную полугрубую и грубую неуравненную;
- 4) смешанную грубую резко неуравненную.

Неоднородная шерсть характеризуется различной степенью неравномерности волокон по толщине и длине. Она состоит из волокон различных типов: пуха, переходного волоса, нормальной ости, мертвого волоса.

В зависимости от степени однородности толщины, длины и состава волокон неоднородная шерсть разделяется на пять сортов: высший, I, II, III, IV.

Чем больше в шерсти содержится пуховых волокон, тем выше ее сорт.

2.6 Семинарское занятие №7 (2 часа).

Тема: «Смушковая продукция овец»

2.6.1 Вопросы к занятию:

5. История создания смушкового овцеводства.
6. Классификация смушковых.
7. Основные правила убоя ягнят на смушки и первичной обработки шкурок.

2.6.2 Краткое описание проводимого занятия:

Продукцией овцеводства являются мясо, шерсть, молоко, смушки, овчина. Разведение овец преобладает в районах и странах, обладающих обширными пастбищами, особенно в пустынных и полупустынных районах субтропического и тропического поясов. Различают следующие основные направления в овцеводстве:

- тонкорунное;
- полутонкорунное;
- полугрубошёрстное;
- грубошерстное.

Последнее подразделяется на смушковое, шубное, мясо-сальное (курдючное), мясо-шёрстное и мясошёрстно-молочное. Развитие того или иного направления в конкретном регионе определяется, прежде всего, его природными условиями. Так, тонкорунное овцеводство встречается в условиях степей и полупустынь. Полутонкорунное и мясошерстное преобладает в районах, которые лучше обеспечены влагой и имеют более мягкий климат. Смушковое овцеводство развито в засушливом полупустынном и пустынном климате. В холодном климате горных территорий разводят овец грубошерстных мясо-сальных и мясошёрстно-молочных пород.

В 1997 году мировое поголовье овец составило 1,1 млрд голов. Наибольшим поголовьем обладал Китай (132,7 млн голов), Австралия (123,3), Индия (56,5), Иран (52,0), Новая Зеландия (47,4), Великобритания (42,5), Турция (33,0), ЮАР (29,2), Судан (24,5 млн голов). От 15 до 24 млн голов насчитывалось также в Испании, в России, в Уругвае, в Бразилии, в Аргентине, в Марокко, в Алжире.

Крупнейшими производителями шерсти являются Австралия, Новая Зеландия, страны СНГ, Китай.

5. Классификация смушковых.

- черный (араби)
- серый (ширази)
- коричневый (комбар)
- розовый (гулигаз)
- золотистый, серебристый (сур)
- белый

Цвет каракульского смушка бывает черный (араби), серый (ширази), коричневый (комбар), розовый (гулигаз), золотистый и серебристый (сур), а также белый. У сокольских овец шкурки имеют серую и черную окраску, у чушки - черную, серую и белую.

Черный цвет зависит от концентрации меланина в шерстинках. Желателен

интенсивно-черный цвет, без пежин или коричневого оттенка. Если встречаются пежины, цвет смушка черно-пестрый. При большой площади пежин ягнят на смушки не убивают. Недостаточно интенсивная черная окраска волоса, характерная для помесных ягнят, снижает ценность смушка. Смушки черной окраски оцениваются главным образом по форме завитка. При оценке цветных смушков форме завитков придают меньшее значение, обращая особое внимание на оттенок, уравнированность в окраске, блеск и шелковистость.

Коричневые смушки имеют небольшое количество пигмента в шерстинках. Встречаются светлые, средние и темные оттенки коричневого цвета.

Серый цвет получается от смешения белых и черных шерстинок, поэтому различают серую, светло-серую, темно-серую, голубоватую, стальную и с сединой окраску.

Розовый цвет создается в результате смешения белых и коричневых шерстинок. Такая, по сути дела, чалая шерсть только условно называется розовой.

Окраска сур характеризуется зональным расположением пигмента и разной окраской волокна. Шерстинки, у которых основание белое, а верхушка коричневая, имеют окраску сур золотистый, если же основание шерстинки коричневое, а верхушка белая, образуется сур серебристый и т.д.

Белый цвет сейчас пользуется спросом в связи с модой на смушки различной искусственной окраски (зеленая, голубая и т.п.).

6. Основные правила убоя ягнят на смушки и первичной обработки шкурок.

Смушки (каракуль) снимают с убитых ягнят в возрасте 1 — 3 суток, для чего оборудуют специальные пункты. Техника забоя ягнят и снятия шкурок такая: продольный разрез кожи на средней линии горла (5 — 7 см), сечение шейных кровеносных сосудов, обескровливания, вдувание воздуха под кожу с помощью компрессорной установки, разрез от анального отверстия по средней линии живота к разрезу на горле, затем разрезы по внутренней стороне задних и передних конечностей — от копыт до разреза на животе и горле. Снимают шкурку сначала с тушки, потом — с конечностей, хвоста и головы. Снятую шкурку очищают, консервируют поваренной солью, через неделю сушат, расправляют, чистят, складывают в штабеля для лежания, после чего сортируют и продают.

Технология первичной обработки каракульских шкурок состоит из многих технологических процессов (доставка ягнят на убойный пункт, убой, вскрытие, снятие, обезжиривание, консервирования, сушки, очистки, улеживания, сортировки и хранения шкурок). Все процессы происходят один за другим в определенной последовательности, неправильное и небрежное проведение хотя бы одного из них приводит к ухудшению качества каракуля, а иногда к его порче. Поэтому соблюдение и правильное проведение всех процессов способствует сохранению и улучшению качества каракуля.

Убой ягнят и снятия шкурок нужно проводить централизованно с привлечением квалифицированных специалистов. Категорически запрещается производить забой ягнят в отарах, так как повышается дефектность каракуля более чем втрое и ухудшается его качество из-за неправильной и несвоевременной первичную обработку шкурок.

Мертворожденные, дохлые и абортированные ягнята часто находятся в отарах длительное время, иногда до двух суток, что вызывает появление теклости волосяного покрова, так как процесс распада начинается по снятию шкурки из ягненка.

Мертворожденных и дохлых ягнят обрабатывают в отарах. Для этого готовят раствор с водной эмульсией креолина и фенола. Основным его компонент — фенол (карболовая кислота), имеет свойство псевдодубления (процесс обратный) и способствует проникновению раствора в более глубокие слои кожной ткани, предотвращая тем самым процесс распада, а креолин содержит нейтральные масла, защищающие поверхность шкурки от окисления.

Раствор готовят непосредственно в отарах в эмалированных или цементируемых емкостях из расчета 3 — 5 л воды на 1 кг массы ягненка. На 1 л воды расходуют 10 г

креолина и 2 — 3 г фенола. Креолин тщательно смешивают с водой, затем в этом растворе растворяют фенол. Труп ягненка должен быть полностью погруженным в раствор. Продолжительность обработки каждой партии ягнят 50 — 60 мин. Дальнейшую обработку шкурок согласно Инструкции по первичной обработке каракульских шкурок. У ягнят, обработанных указанным раствором, начальные признаки теклости волоса оказываются не ранее чем через 4 суток после забоя их, а в необработанных ягнят такие признаки можно обнаружить в первые 24 ч. Обработка мертворожденных, дохлых и абортированных ягнят креолиново-фенольным раствором позволяет в 10 — 12 раз сократить дефектность шкурок. В процессе дальнейшей обработки шкурок выход каракуля с дефектами обычно не превышает 0,3% от общей партии.

Качество и товарные свойства каракульских шкурок значительной степени зависят от способов забоя, снятия и последующей обработки шкурок.

Неправильный разрез живота и головы ягненка при забое и снятии шкурки с тушки ягненка приводят к уменьшению полезной площади и ухудшению внешнего вида каракульских шкурок. Несмотря на это многие хозяйства проводят забой ягнят поперечным сечением горла. В результате получают шкурки с узкой и длинной шеей, что приводит к потере площади шейно-головной части шкурки.

В лаборатории смушководения НИИ «Аскания-Нова» уточнено оптимальные контуры разреза шейно-головной части шкурки каракуля, что позволяет максимально увеличить площадь шейно-головной части шкурок и предотвратить обрыва ее в последующих операциях.

Во время забоя ягненка разрез надо делать без зигзагов по так называемой белой линии живота к рассечению нижней челюсти, с симметричным расположением участков с обеих сторон.

После снятия шкурки, чтобы избежать ее мишкватости, надо дополнительно разрезать головки шкурок от углов рта к глазным отверстиям, надрезав ушные раковины, извлечь хрящи. В результате участок шеи — головы приобретает почти прямоугольной формы, улучшается товарный вид шкурок и увеличивается площадь шейно-головной части вдвое по сравнению со шкурками, снятыми с ягненка ранее принятым способом разреза.

Важным звеном в технологической цепи обработки каракуля является его консервирования. В нашей стране применяется преимущественно сухосольевый способ консервирования каракульских шкурок, поскольку большинство активных микроорганизмов очень чувствительны к повышению осмотического давления (10% -ная концентрация соли подавляет деятельность наиболее устойчивых форм бактерий), а также приводит к обезвоживанию тканей шкурки. Основные процессы консервирования Парни х шкурок — выделение влаги и насыщения кожаной ткани солью.

Обобщение научных данных по консервированию кожаной и пуш но-мехового сырья с применением поваренной соли показало, что наиболее интенсивное выделение влаги (93,4%) из шкурок под действием соли происходит в первые 12 — 15 ч после засолки и прекращается через 84 — 96 ч. После этого отдача незначительной влаги происходит за счет ее ВН испарения с поверхности штабеля. Первые 2 — 3 ч после засолки происходит интенсивное насыщение шкурки солью и меньше влаги, которая активно выделяется через 3 — 5 часов после засолки и через 6 — 8 ч постепенно замедляется. Выделение влаги с каракульских шкурок в зависимости от продолжительности засолки.

Потеря влаги и насыщения шкурок солью зависят от вида сырья. Так, шкурки товстомиздряних сортов, таких, например, как кавказский толстый 1, ребристый толстый 1, жакет толстый, выделяют влаги больше и быстрее насыщаются солью, чем шкурки тонкомиздряних. Это происходит за счет рыхлой строения ткани каракуля товстомиздряних сортов. По рыхлой кожаной ткани соль проникает внутрь шкурки быстрее, что способствует более интенсивному выделению влаги.

Оптимальные затраты соли на консервирование любых каракульских шкур — не более 500 г на одну шкурку.

После засолки в шкурках остается небольшая часть влаги, которая постепенно испаряется во время сушки их.

В парных шкурках содержание влаги составляет около 73%, а в сухозасолках — 47%.

Трехсуточную засолку Парная х каракульских шкур при расходе соли 500 г на одну шкурку обеспечивает нормальное консервирование каракуля и по концентрации соли в кожаной ткани, и по содержанию влаги не отличается от шкур, законсервированных способом действующей технологии в течение 9 суток при расходе соли 100 г шкурку.

Качество каракуля трехсуточного засолки по товарным свойствам не отличается от каракуля девятидобового засолки и соответствует требованиям ГОСТа к сухозасоленого каракуля.

Внедрение в практику хозяйств 3 — 4-суточного засолки каракульских шкур при расходе соли 600 г шкурку позволит уменьшить почти вдвое производственные помещения убойных пунктов, сократить расход соли, сроки первичной обработки каракуля в хозяйствах.

2.7 Семинарское занятие №8 (2 часа).

Тема: «Показатели мясной продуктивности овец»

2.7.1 Вопросы к занятию:

1. Мясная продуктивность овец
2. Показатели мясной продуктивности овец и методы их оценки

2.7.2 Краткое описание проводимого занятия:

1. Мясная продуктивность овец

Мясо взрослых овец называется бараниной, а мясо ягнят, убитых в год их рождения — ягнятиной. Мясо овец имеет ряд отличительных особенностей по сравнению с мясом других сельскохозяйственных животных и пользуется спросом у населения. Мясо получают от овец всех пород, но наиболее высокой мясной продуктивностью обладают породы, специализированные в мясном, мясо-шерстном и мясо-сальном направлениях. Хорошей мясной продуктивностью характеризуются овцы романовской породы, так как они имеют высокую плодовитость.

Мясная продуктивность овец, основные пути дальнейшего увеличения производства баранины осуществляются за счет организации правильного нагула и откорма овец, а также в развитии скороспелого мясо-шерстного овцеводства. Нагул целесообразно проводить на культурных пастбищах, а откорм — на внутрихозяйственных или межхозяйственных откормочных площадках, где используют полноценные кормосмеси, гранулированные корма; раздача корма должна быть механизирована. В специализированных хозяйствах нужно практиковать ранний отъем ягнят, выращивание их на заменителях молока и стартерных смесях, что значительно ускоряет рост животных. Ранний отъем ягнят позволяет интенсивно использовать маток.

Для повышений производительности мясной продукции овцеводства в тонкорунном овцеводстве низкопродуктивных маток скрещивают с баранами мясо-шерстных пород и помесный молодняк сдают на мясо в год рождения. Известно, что более выгодно сдавать ягнят на мясо в возрасте 4—8 месяцев. При правильном выращивании живая масса таких ягнят к 8-месячному возрасту достигает 70—80% живой массы

взрослых овец, причем молодняк значительно лучше оплачивает корм приростами. Например, на 1 кг прироста массы ягнята затрачивают 5—6 кормовых единиц, тогда как взрослые овцы расходуют 10—12 кормовых единиц. При сдаче молодняка на мясо в год его рождения ягнение маток планируют на январь — февраль.

2. Показатели мясной продуктивности овец и методы их оценки

Основными показателями мясной продуктивности овец являются: предубойная живая масса, масса туши, масса внутреннего жира, убойная масса, убойный выход, категория упитанности овец и туши, сортовой и морфологический состав туш, пищевая ценность мяса и др.

Предубойная живая масса определяется путем взвешивания животных после 24-часовой голодной выдержки с точностью до 0,1 кг (молодняк) и 0,5 кг (взрослые овцы).

За период голодной выдержки частично опорожняется желудочно-кишечный тракт и мочевой пузырь, вследствие чего живая масса животных снижается на 2,5-3,5 %. Наряду с этим в это время в мышцах происходит нормализация кислотности и накопление гликогена. Достаточное содержание гликогена необходимо для созревания мяса, так как при его распаде образуются кислоты (молочная, фосфорная), которые не только консервируют мясо, но и препятствуют развитию в нем гнилостных микроорганизмов, ускоряющих порчу мяса.

Категории упитанности овец устанавливают (ГОСТ 5111 — 55 "Овцы и козы для убоя. Определение упитанности") по степени развития мышечной и жировой тканей на холке, спине, пояснице, ребрах и у корня хвоста, а у курдючных и жирнохвостых овец — курдюка или жирного хвоста. В спорных случаях проводят контрольный убой и определяют упитанность по качеству мяса в соответствии с нижеследующими требованиями:

Категория	Овцы	Баранина
Высшая	Мышцы спины и поясницы на ощупь хорошо развиты; остистые отростки спинных и поясничных позвонков не выступают; холка может выступать; отложения подкожного жира хорошо прощупываются на пояснице; на спине и рёбрах отложение жира умеренные. У курдючных овец в курдюке и у жирнохвостых на хвосте значительные отложения жира, курдюк хорошо наполнен	Мышцы развиты хорошо; кости не выступают, за исключением остистых отростков позвонков в области холки
Средняя	Мышцы спины и поясницы на ощупь удовлетворительно; маклоки и остистые отростки поясничных позвонков слегка выступают; на спине и рёбрах жировые отложения незначительны. У курдючных овец в курдюке, а у жирнохвостых на хвосте умеренные жировые отложения, курдюк недостаточно наполнен	Мышцы развиты удовлетворительно; остистые отростки позвонков в области спины и холки выступают; подкожный жир покрывает тушу тонким слоем на спине и слегка на пояснице; на рёбрах, в области крестца и таза допускаются просветы
Нижесредняя	Мышцы на ощупь развито неудовлетворительно; остистые отростки	Мышцы развито неудовлетворительно; кости

	спинных и поясничных позвонков и ребра выступают; отложения подкожного жира не прощупываются. У курдючных овец в курдюке, а у жирнохвостых на хвосте имеются жировые отложения	заметно выступают, на поверхности туши местами имеются незначительные жировые отложения в виде тонкого слоя, но могут и отсутствовать
--	--	---

Масса туши определяется взвешиванием животного с почками и околопочечным жиром, но без кожи, внутренних органов, головы, ног и хвоста (курдюка). Передние ноги отделяют по запястному, задние — по скакательному суставу. Масса туши сразу после убоя и туалета называется парной, а через 24 ч после ее остывания в холодильной камере при температуре 4-6°C — охлажденной. Масса охлажденной туши меньше парной, поскольку при охлаждении происходит потеря влаги. Более жирные туши теряют влаги меньше, чем тощие.

В зависимости от породы, пола, возраста, упитанности туша взрослых овец обычно весит 20-30 кг и более, молодняка до года — 15-20 кг, ягнят — 10-15 кг.

Убойная масса включает в себя массу туши и внутреннего жира (сальникового, желудочного, кишечного и оточного), учитываемых отдельно. В убойную массу у овец мясо-сальных и жирнохвостых пород включают массу курдюка — жирного хвоста, которые при убое отделяются от туши и учитываются отдельно.

Убойный выход — это отношение убойной массы к предубойной живой массе, выраженное в процентах. В зависимости от породы, упитанности, возраста, пола и т.д. этот показатель колеблется в широких пределах — от 35 до 60 % и более.

Категория мяса туш оценивается в соответствии с требованиями ГОСТ 1935-55 "Мясо — баранина и козлятина в тушах".

Категории мяса		характеристика
Баранина	первой	Мышцы развиты удовлетворительно, остистые отростки позвонков в области спины и холки слегка выступают, подкожный жир покрывает тонким слоем тушу на спине и слегка на пояснице; на ребрах, в области крестца и таза допускаются просветы
Баранина	второй	Мышцы развиты слабо, кости заметно выступают, на поверхности туши местами имеются незначительные жировые отложения в виде тонкого слоя, которые могут и отсутствовать

Категория мяса обозначается на туше клеймом. Первая категория обозначается круглым клеймом диаметром 40 мм. На тушу баранины первой категории ставят пять клейм: по одному на лопаточную и бедренную части с обеих сторон туши и одно клеймо на грудинку с правой стороны.

Вторая категория упитанности баранины обозначается квадратным клеймом с длиной стороны 40 мм. На тушу баранины второй категории ставят четыре клейма: по одному на лопаточную и бедренную части с обеих сторон туши.

Баранину, не соответствующую требованиям первой и второй категории, относят к тощей. Такое мясо не реализуется, а используется для промышленной переработки на пищевые цели и маркируется треугольным клеймом размером 45x50x50 мм, которое ставится на лопаточную часть с одной стороны туши. Справа от клейма упитанности должен быть штамп ПП высотой 30 мм.

Сортовой состав мяса (рис. 1) устанавливают на основании разрубки туши в соответствии с ГОСТ 7596-81 (табл. 3).




Рисунок 1. Схема разделки туши на отруба:

1-тазобедренный; 2-поясничный; 3-лопаточно-спинной; 4-зарез; 5-предплечье; 6-задняя голяшка

Таблица 3.

Анатомические границы и характеристика отрубов и сортов мяса (баранины) (ГОСТ 7596-81)

Сорт	Отруб
I	Лопаточно-спинной отруб (включая грудинку и шею): передняя граница — по линии отделения зареза; задняя — между десятым и одиннадцатым ребрами перпендикулярно позвоночнику; нижняя — через плечелоктевой сустав. В отруб входят, пять шейных (с 3-го по 7-й) позвонков, лопаточная и плечевая кости, десять грудных позвонков с соответствующими им ребрами и грудная кость с хрящами. Поясничный отруб: передняя граница — по линии отделения лопаточно-спинного отруба; задняя — между пятым и шестым поясничными позвонками перпендикулярно позвоночнику. В отруб входят: три грудных позвонка и ребра (с 11-го по 13-й), пять поясничных позвонков, часть пашины, а также почки с околопочечным жиром. Тазобедренный отруб: передняя граница — по линии отделения поясничного отруба; задняя — через середину берцовой кости. В отруб входят: один поясничный и все хвостовые позвонки, кости таза (подвздошная, лонная, седалищная), крестцовая и бедренная кости, верхняя половина берцовой кости и часть пашины.
II	Зарез: между вторым и третьим шейными позвонками. В зарез входят: два первых шейных позвонка. Предплечье: граница проходит через плечелоктевой сустав. В предплечье входят: лучевая и локтевая кости и кости запястья. Задняя голяшка отделяется через середину берцовой кости с предварительным отделением ахиллова сухожилия в месте перехода его в мышечную ткань. В заднюю голяшку входят: нижняя половина берцовой кости, кости скакательного сустава и ахиллово сухожилие.

Морфологический состав туши характеризуется соотношением основных ее частей: мышц, жировой ткани, костей. Соотношение этих основных частей туши обуславливает ее пищевую ценность и зависит от породы, возраста, пола и упитанности животных.

Одним из показателей морфологического состава туши является коэффициент мясности, который определяется как отношение массы мякоти (съедобной части) к массе костей. Для его установления производится обвалка туши (отделение мякотной части от костей) или полутуши, взвешивание составных частей и соответствующий расчет. Возможно определение отношения массы мышечной ткани к костной ткани (мышечно-костный коэффициент) или мышечной к жировой ткани (мышечно-жировой коэффициент).

Количество жира и его локализация. С возрастом животных происходят изменения в соотношении мышечной, жировой, костной тканей. Жировая ткань развивается несколько позже. Ее развитие у овец в более раннем возрасте характеризует таких животных как более скороспелых.

Наблюдается определенная последовательность в отложении жира у овец. Сначала откладывается жир на внутренних органах: почках, кишечнике, желудке, затем — подкожный жир (у корня хвоста, на пояснице, грудишке), межмышечный, а потом уже развивается внутримышечная жировая ткань.

Подкожный жир образует так называемый полив туши жировым слоем, предохраняющим ее от высыхания.

Межмышечный жир откладывается в соединительно-тканых прослойках между отдельными мышцами.

У разных пород интенсивность и соотношение в отложении жира на разных участках туловища неодинаковы. У грубошерстных пород, например (тощихвостых, короткохвостых — романовских), большая часть жира приходится на долю околопочечного и кишечного, а наименьшая — на межмышечный и подкожный. Подкожный жир скапливается главным образом на пояснице, а желательно, чтобы он располагался равномерно по туше.

У овец, специализированных в мясном направлении, жир откладывается внутри отдельных мышц, образуя так называемую "мраморность мяса" и придавая ему особую сочность и нежность (В.П.Лушников. 1996).

Характерную локализацию жировых отложений имеют мясо-сальные овцы, у которых основное жиросложение в области ягодиц и верхней части хвоста.

Отложения внутреннего жира начинаются у ягнят в раннем возрасте и зависят от уровня кормления. Так, при хорошем кормлении отложение жира в области почек у ягнят начинается в возрасте трех месяцев, а при умеренном кормлении — значительно позже.

Таким образом, развитие жировой ткани, ее локализация зависят от возраста животных, условий их кормления, породы. Оптимальным считается, если туша массой 16-18 кг содержит не более 25 % жира, из них подкожного — 13, межмышечного — 10 и почечного — 2 %. Желательная толщина жирового слоя над длиннейшей мышцей спины для тушек массой 16 — 18 кг должна составлять 3-3,5 мм, а для тушек массой 20 — 25 кг — 4-5 мм.

Субпродукты подразделяют на: а) мякотные — печень, сердце, легкие, диафрагма, трахея с горлом, почки, селезенка, мясная обрезь, вымя, язык и мозги; б) слизистые — рубец, летошка; в) шерстные — голова. В зависимости от категории установлены следующие нормы выхода субпродуктов (в % к живой массе после голодной выдержки):

I категория: печень — 1, язык — 0,3, мозги — 0,15, мясная обрезь — 0,38, сердце — 0,45, диафрагма — 0,32;

II категория: рубец — 1,4, калтык — 0,15, пикальное мясо — 0,1, легкие — 0,8, селезенка — 0,2, голова без языка и мозгов — 3,6.

Выход обработанных субпродуктов в среднем составляет 9,5 %, в том числе I категории — 3,2 %.


Площадь поперечного сечения длиннейшей мышцы спины ("мышечный глазок") имеет сопряженность с мясностью туши. Так, положительная корреляция между массой мышц в туше и площадью мышечного глазка у мясошерстных ягнят составляет 0,77-0,81.

Поэтому о мясности туши можно судить и по площади поперечного сечения длиннейшей мышцы спины. Площадь поперечного сечения длиннейшей мышцы спины определяют на отобранных для обвалки тушах (Поздняковский В.М. 2001). Длиннейшую мышцу спины осторожно разрезают поперек ножом между последним грудным и первым поясничным позвонками, а чтобы не нарушить размер и структуру мышцы, позвонки распиливают. На полученный поперечный разрез накладывают карандашную кальку (или пергамент) и переносят на нее контуры мышцы, а затем планиметром измеряют площадь (см²) полученного контура.

У скороспелых мясных пород овец площадь мышечного глазка больше, чем, например, у мериносов.

Индекс мясности. Наряду с мышечным глазком для характеристики мясности можно использовать предложенный И.Йетсом (1970) индекс мясности.

Он получен путем соотношения между длиной и массой туши овец и ягнят разных пород и категорий упитанности. В численном выражении индекс общей мясности равен числу килограммов, на которое данная туша тяжелее или легче средней туши такой же длины.



Если туша имеет массу выше среднего показателя, индекс положительный, если ниже — индекс отрицательный, а когда одинаковый со средним — нулевой (рис. 2).

Рисунок 2. Зависимость между длиной и массой туши

Для вычисления индекса мясности берется масса охлажденной туши (или парной, но в этом случае с массы туши сбрасывается 2 %). Длина туш измеряется гибкой стальной мерной лентой или специальной мерной палкой внутри туши по прямой линии, проходящей через брюшную и грудную полости от переднего края лонного сращения до переднего края первого ребра в средней его части.

Индекс общей мясности показывает количество мяса (мышц и жира), которое имеется в туше по отношению к ее длине. Однако этот индекс не показывает, в какой мере развита мышечная ткань и в какой жировая.

Химический состав баранины зависит от породы, пола, возраста, упитанности животных (табл. 4).

Таблица 4. Химический состав мяса молодняка и взрослых овец разных пород

Порода	Влага	Белок	Жир
Валушка 6-7 мес.			
Куйбышевская	62,2	20,8	16,0
Цигайская	63,2	19,8	16,0
Кавказская	63,4	19,2	16,3
Ставропольская	64,5	18,8	15,7

Взрослые матки			
Куйбышевская	56,7	16,1	26,3
Цигайская	61,0	16,5	21,6
Кавказская	60,5	17,2	21,2
Ставропольская	61,4	17,0	20,6

Баранину от говядины отличает большая калорийность, более высокое содержание жира, сухого вещества и меньшее влаги. Свинина превосходит баранину по калорийности и содержанию жира в мясе, но уступает по содержанию белка и влаги.

На химический состав мяса большое влияние оказывает упитанность животных. Калорийность мяса овец высшей упитанности в 1,8-2,0 раза выше, чем нижесредней (В.П.Лушников. 1996).

У взрослых овец, имеющих одинаковый возраст и упитанность, заметных различий по химическому составу мяса в зависимости от происхождения не отмечено.

2.8 Семинарское занятие №9 (2 часа).

Тема: «Побочная продукция овцеводства»

2.8.1 Вопросы к занятию:

1. Понятие побочной продукции в овцеводстве

2. Виды побочной продукции в овцеводстве

2.8.2 Краткое описание проводимого занятия:

Побочная продукция — это продукция, которую получают параллельно с основной продукцией и которая не является целью производства. В животноводстве побочную продукцию получают: - от забоя скота и птицы (субпродукты, шкуры, пух, перо, пр.); - в процессе переработки молока (сливки, сметана, масло, творог и др.); - от павших и вынужденно забитых животных (шкуры, рога, копыта, технические жиры и т. п.)

Например, в шерстном овцеводстве основной продукцией является шерсть и мясо (живой вес), а сопряженной — молоко. Так, если от животных одного вида получают несколько равнозначных видов продукции, то продукция, ради получения которой содержится животное, будет основной, а все остальное — сопряжённой. Деление продукции на основную и сопряжённую имеет большое значение для составления калькуляции себестоимости продукции, поскольку основная масса затрат по содержанию животных должна быть отнесена на основную продукцию.

2. Виды побочной продукции в овцеводстве
В овцеводстве, как во всяком производстве, осуществляется безотходная технология. Кровь идет для приготовления кровяной муки и некоторых препаратов, а субпродукты (мозги, язык, почки, печень, сердце и др.) — в пищу. Из кишок изготавливают музыкальные, теннисные, шерстобитные струны, оболочки для колбас, нити для сшивания ран; из сычуга готовят некоторые лекарства (аболин) и используют в сыроварении; тушки смушковых ягнят идут на приготовление консервов, мясокостной муки; из копыт, рогов готовят костную муку, клей.

Жиропот, выделенный из мочевых вод, идет на изготовление ценного препарата — ланолина, который используется в фармацевтической промышленности. Ткани, обработанные ланолином, защищают от радиации. Состриженная с овчин на меховых фабриках шерсть идет на изготовление фетра, валенок, искусственных овчин.

Овечий навоз — ценное удобрение, в пустынных районах используется как топливо.

2.9 Семинарское занятие №10,11 (4 часа).

Тема: « Племенная работа в овцеводстве»

2.9.1 Вопросы к занятию:

1. Бонитировка овец.

2. Мечение овец и ведение племенного учета

2.9.2 Краткое описание проводимого занятия:

1. Бонитировка овец.

В овцеводстве различают два вида бонитировки: классную и индивидуальную. При *классной бонитировке* животных оценивают по тем же хозяйственно полезным признакам, что и при индивидуальной, но записи в журнале не делают. В романовском овцеводстве классной бонитировке подлежат весь приплод в возрасте 8—9 мес, полученный в неплеменных хозяйствах. *Индивидуальной бонитировке* подлежат бараны-производители (основные, резервные и пробники) во всех категориях хозяйств; весь приплод в возрасте 8—9 мес, полученный в племенных хозяйствах и фермах, а также приплод, полученный от баранов, проверяемых по качеству потомства в пользовательских хозяйствах. Если данные обрабатываются на компьютере, то селекционный признак и степень его выраженности обозначают в журнале в виде условных значков или шифра. Все овцы при бонитировке подразделяются на три класса: элита, I и II. Животных, не отвечающих требованиям этих классов, считают браком. Класс животного устанавливают по комплексу селекционируемых хозяйственно полезных признаков с учетом живой массы, качества овчины в возрасте 8—9 мес и отмечают выщипами на правом ухе: элита — выщип на кончике уха; I класс — один выщип на нижнем крае уха; II класс — два выщипа на нижнем крае уха; брак — отрезается кончик уха. Качество овчины устанавливают после стрижки поярка при бонитировке в 8—9 мес и отмечают на верхнем крае левого уха: овчина I группы — один выщип; II группы — два выщипа; лучше I группы — без выщипа. В тонкорунном и полутонкорунном овцеводстве классная бонитировка проводится с 12-месячного возраста по совокупности оценки всех признаков: в племенных стадах — ярки и баранчики от группы неселекционных племенных и пользовательных маток, а в товарных стадах — все ярки. В зависимости от породных особенностей, уровня шерстной и мясной продуктивности чистопородных овец и помесей делят на три класса: элита, I и II. Животные с ослабленной конституцией, пороками в экстерьере, неудовлетворительной шерстной продуктивностью подлежат выбраковке. Классы отмечают выщипами, как и у романовских овец. Индивидуальной бонитировке подвергаются основные бараны-производители, резервные и пробники; бараны ремонтные; матки и переярки селекционной группы; приплод, полученный от маток селекционной группы и идущий для ее ремонта и реализации на племя; приплод, по которому оценивают баранов по потомству в возрасте 12 мес и старше, по полному ключу; баранчики и ярочки, полученные от маток селекционного ядра. Приплод, по которому оценивают баранов (предварительная оценка), бонитируют индивидуально при отбивке от маток по сокращенному ключу. Бонитировку овец всех направлений продуктивности проводят по специальным инструкциям, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

2. Мечение овец и ведение племенного учета.

Метят овец татуировкой, металлическими или пластмассовыми сережками, с помощью выщипов на ушах и выжигания на рогах. Основным способом мечения овец белой окраски является *татуировка* на бесшерстной поверхности внутренней стороны уха. Татуировка делается мелкой сухой голландской сажей, разведенной на денатурированном спирте до густоты сметаны. Животных с темной мастью метят с помощью *сережек*. Остальные способы мечения являются дополнительными.

На племенных фермах при татуировке новорожденным ягнятам ставят на левом ухе номер матери, на правом — индивидуальный номер самого животного при отбивке от матери. Индивидуальный номер ежегодно начинают с единицы, но перед ним ставят последнюю цифру года рождения. Например, ярка рождения 2006 г. №441, родившаяся от матки № 849, должна

иметь на правом ухе № 6441, а на левом ухе — № 849. Рогатым баранам, кроме того, индивидуальный номер выжигают на правом роге.

В романовском овцеводстве животных метят с помощью металлических или пластмассовых бирок (сережек) с номерами. Бирки ставят на правое и левое ухо ягненка на 2—5-е сутки после рождения и одновременно на левом ухе отмечают, в числе скольких родился ягненок: двойня — два выщипа на нижнем крае уха; тройня — один выщип на нижнем крае уха, четыре и более — выщип на кончике уха. Одинец выщипом не отмечается.

Племенной учет в обязательном порядке ведется во всех племенных стадах овец. Основа такого учета — племенные карточки барана и матки. Карточки составляют и систематически заполняют на всех баранов-производителей, элитных и других маток, с которыми ведется индивидуальная племенная работа.

Данные для заполнения племенных карточек в каждом хозяйстве берут из следующих дополнительных документов: журнала случек и ягнений, книги учета племенного молодняка, журнала индивидуальной бонитировки и продуктивности овец, журнала индивидуального учета живой массы и настрига шерсти.

Записи в журналы ведут в определенном порядке в периоды осеменения и ягнения маток, во время отбивки ягнят, бонитировки молодняка и стрижки овец.

В товарных хозяйствах племенные карточки на маток не заводят, а ведут лишь индивидуальный учет продуктивности баранов-производителей. Основное внимание обращают на организацию группового учета по каждой отаре и отдельной группе овец. Если маточные отары укомплектованы животными одного класса, одинаковыми по типу и продуктивности, то по материалам такого учета делают заключение о племенных и продуктивных качествах маток, а по качеству их потомства судят о правильности подбора к ним баранов для спаривания. На основании этих записей в каждом хозяйстве можно контролировать племенную работу.

2.11 Семинарское занятие №12,13 (2 часа).

Тема: «Организация и техника разведения овец »

1. Воспроизводство стада
2. Половой сезон
3. Подготовка баранов и маток к случке
4. Случка овец

2.11.1 Вопросы к занятию:

2.11.2 Краткое описание проводимого занятия:

1. Воспроизводство стада

Способность сельскохозяйственных животных к размножению — один из основных показателей, определяющих их хозяйственную ценность.

Высокоэффективное воспроизводство — основная составляющая производства всех видов продукции отрасли, увеличения численности поголовья и селекционного совершенствования животных.

Главная задача воспроизводства — получить и вырастить на каждую матку не менее одного, а в романовском овцеводстве — 2-2,5 ягненка.

Чтобы рационально использовать репродуктивный потенциал животных, надо знать физиологию их воспроизводительных функций, биологию размножения, организацию и технику воспроизводства.

Физиология воспроизводительной функции у овец

Половые органы маток состоят из яичников, яйцеводов, матки, влагалища и наружных половых органов (рис. 123). Основной половой железой маток являются яичники.




Рис. 123. Половые органы матки: 1 — широкая маточная связка; 2 — артерии и вены матки; 3 — яичник; 4 — яйцевод; 5 — рог матки; 6 — тело матки; 7 — влагалище; 8 — мочевого пузыря; место впадения мочеиспускательного канала;

10 — половые губы (вульва); 11 — клитор

В фолликулах яичников образуются и созревают яйцеклетки. После разрыва фолликула освободившаяся яйцеклетка из яичника попадает в яйцевод, где проходит ее встреча со сперматозоидами. Яйцеклетка сохраняет в яйцеводе способность к оплодотворению в течение 12 ч. после выделения из фолликула. Однако если оплодотворение яйца произошло, когда после овуляции прошло более 7 ч, то зигота может погибнуть или приплод родится нежизнеспособным. Оплодотворенная яйцеклетка (зигота) вследствие сокращения мускулатуры яйцевода попадает в матку, где и происходит развитие плода.

Яичники не только важный генеративный орган, они, кроме того, выполняют гормональные функции — в них происходит секреция гормонов: фолликулина (эстрадиол, эстрин), стимулирующего наступление охоты, и прогестерона, который блокирует созревание новых яйцеклеток и вызывает изменения в матке, обесценивающие закрепление зиготы и нормальное течение беременности.

Прогестерон выделяется желтым телом, которое образуется на месте лопнувшего фолликула. У оплодотворенных маток желтое тело остается до конца суягности. Если оплодотворения не произошло, то желтое тело через 13-15 дней рассасывается и половой цикл повторяется.

Половой цикл — это период времени между двумя смежными течками. Продолжительность полового цикла у овец составляет в среднем 16-18 суток, однако встречаются животные с длительностью цикла от 8 до 35 суток. Если в период охоты не было спаривания или не произошло оплодотворения, охота повторяется через цикл. Промежутки между циклами и их длительность постоянны.

Половой цикл протекает в такой последовательности взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов: охота, течка и овуляция.

Охота у маток начинается в период созревания фолликулов и заканчивается, как правило, после овуляции. Продолжительность охоты колеблется от 12 ч до 3 суток, а в среднем составляет 38 ч. Она зависит от возраста и породы животных, сезона года и метеорологических условий, общего состояния организма. Признаки охоты: частое блеяние, плохой аппетит, беспокойное поведение, повиливание хвостом. Сходящаяся в охоте матка не убегает от производителя, пытающегося ее покрыть.

По сообщению А. И. Лопырина (1953), у маток с охотой, продолжающейся менее суток, двойная овуляция в яичниках наблюдается гораздо реже, чем у маток, находящихся в состоянии охоты более 24 ч.

Течка отражает сложный комплекс морфологических и физиологических изменений, происходящих в период охоты в родополовых путях матки.

Н. В. Логинова (1966) указывает, что видимые изменения при течке начинаются у овец примерно за сутки до наступления охоты и достигают наибольшего развития к моменту овуляции. В это время отмечается покраснение тканей половых органов, набухание слизистой оболочки и усиленное функционирование желез преддверия влагалища, шейки матки, яйцепроводов. Шейка матки раскрывается и из нее во влагалище, а затем и наружу выделяется слизь. В начале течки слизь бывает прозрачной, затем она становится более мутной, а в конце приобретает вязкую кашицеобразную консистенцию.

Характерные изменения цвета и вязкости влагалищной слизи могут служить достаточно четким показателем стадии течки и срока наступления овуляции.

Овуляция — вскрытие созревшего фолликула и выделение из него яйцеклетки. Обычно овуляция наступает за 4-6 ч до окончания охоты.

Длительное общение маток с баранами в период случки сокращает продолжительность охоты на 10-14 ч и ускоряет овуляцию на 3-4 ч или через 30-32 ч от начала ее проявления.

Если в яичнике имеются два и более фолликулов, отмечается неодновременность их разрыва. Однако если через 3-4 ч после разрыва первого фолликула другие не овулировали, то они теряют способность к этому в связи с быстрым формированием желтого тела в первом овулировавшем фолликуле.

У овец многоплодных пород, например романовской, одновременно могут созреть и овулировать 3-4 и более фолликулов. Видимо, в этом причина того, что у романовских овец овуляция может проходить в период от 12 до 60 ч после начала охоты.

Число фолликулов, овулировавших в одну охоту, с выделением яйцеклеток, принято называть *нормой овуляции*.

Искусственное вызывание охоты и овуляции вне полового сезона. В ряде случаев приходится вызывать охоту и овуляцию во время относительного полового покоя животных. Например, при необходимости проведения весенне-летней случки, при уплотненных ягнениях, при получении осеннего приплода от перегулявших маток, а в каракулеводстве — от маток, приплод которых весной забит на смушек, и т.д.

В настоящее время известны два метода искусственного вызывания полноценной охоты — световой и гормональный. Световой метод основан на том, что для прихода в охоту маткам требуется определенный световой день (около 12 ч). Практическое применение этого метода не получило распространения, что связано с большими организационно-хозяйственными трудностями — требуется сократить продолжительность пастбы и увеличить время содержания животных в помещении, в котором искусственно необходимо создать затемнение, а температуру и влажность приблизить к осеннему периоду.

Для вызывания охоты в анэстральный период применяют гормональные препараты. Например, охоту можно синхронизировать с помощью СЖК (сыворотка жеребых кобыл) и ацетата мегестрола. Ацетат мегестрола дают с кормом (конcentратами) в течение 8 дней из расчета 5 мг на голову в сутки (1 г на 200 гол.). На 10-й день инъектируют СЖК в дозе 1000-1200 м.е.

Для синхронизации охоты можно использовать ацетат мегестрола и без СЖК. В этом случае маткам во влагалище вводят поролоновые pessaries, пропитанные 30 или 40 мг ацетата мегестрола. Pessaries извлекают через 14 дней, но осеменение начинают через один цикл синхронизированной охоты.

Следует отметить, что при искусственной стимуляции половых рефлексов гормонами охота и овуляция, как правило, проявляются у большинства обработанных маток.

Половые органы баранов состоят из семенников с придатками, семяпроводов, добавочных половых желез и наружных половых органов (рис. 124).




Рис. 124. Половые органы барана: 1 - мошонка, 2 — семенник, 3 — головка придатка, 4 — придаток семенника, 5 - связка хвостовой части придатка, 6 - семяпровод, 7 - семейной канатик, 8 - половой член, 9 - препуций, 10 - конечный отрезок мочеиспускательного канала (червеобразный отросток), 11 - мочевой пузырь, 12 - ампула семяпровода, 13 - семенной пузырек, 14 - предстательная железа, 15 — луковичная (кумеровая) железа

Семенники представляют собой парные, округлой формы, половые железы, в которых вырабатываются и развиваются сперматозоиды. У взрослых баранов масса одного семенника с придатком достигает 0,2-0,3 кг, 11 см длины и 6 см ширины.

Непосредственно к семеннику прилегает придаток семенника. Его условно делят на три части: головку, тело и хвост, переходящий в семяпровод. Придаток состоит из тонкого извитого канальца, достигающего у баранов 50-60 м.

Придатки семенников являются хранилищем сперматозоидов. У взрослых баранов в обоих придатках содержится 160-200 млрд. семенных клеток. Здесь происходит их созревание. Оно заключается в том, что семенные клетки приобретают липопротеидную оболочку, предохраняющую их от вредного влияния факторов внешней среды. С наличием этой оболочки связана резистентность сперматозоидов. Кроме того, в придатке они приобретают отрицательный электрический заряд, предотвращающий их склеивание (агглютинацию). Поскольку секрет, заполняющий канал придатка семенника, имеет кислую реакцию, сперматозоиды в процессе созревания становятся устойчивыми к кислой среде.

Сперматогенез и хранение сперматозоидов в придатках семенников у млекопитающих происходят при температуре на 3-4° ниже температуры тела. Такие условия создаются при помощи *мошонки*, мускулатура которой в зависимости от окружающей температуры может сокращаться и расширяться. В жаркую погоду мышцы мошонки и семенного канатика расслабляются, семенники и мошонка опускаются вниз, а кожа через многочисленные потовые железы испаряет много жидкости. В холодную погоду мышцы мошонки сокращаются, кожа сморщивается в складки, а семенники подтягиваются к брюшной полости, что в какой-то мере предохраняет их от

обмораживания и переохлаждения. Пониженная температура и слабокислая реакция тормозят подвижность и обмен веществ сперматозоидов, сохраняя этим их энергию.

Из придатка семенника семенные клетки непрерывно поступают в семяпроводы и накапливаются в их расширенной части — ампулах. Во время эякуляции порция семени выделяется в мочеполовой канал и там разбавляется щелочными секретами добавочных половых желез.

Установлено, что продвижение сперматозоидов по каналу придатка при умеренном половом режиме составляет 4-8 дней, а от начала делений сперматогоний до образования зрелых сперматозоидов проходит 55 дней.

У взрослых баранов сперматогенез идет непрерывно в течение круглого года. Суточная спермопродукция — 1,8-4,6 млрд. сперматозоидов.

Разовое количество спермы, выделяемой при садке, называется *эякулатом* и составляет 1-2 мл. В этом объеме содержится около 5 млрд. сперматозоидов.

Длительность переживания сперматозоидов в половом тракте самки зависит от времени осеменения: при введении семени в самом начале охоты часть спермиев сохраняет активность и оплодотворяющую способность в течение 28-30 ч, а отдельные — до 47 ч. При более позднем осеменении продолжительность переживания сперматозоидов заметно сокращается. У овец, осемененных после окончания охоты, семя

гибнет в цервикальном канале через 2-3 ч. В яйцеводах свежеполученное семя может сохранять активность 12-14 ч.

Одновременно со сперматогенезом в семенниках вырабатывается мужской половой гормон — тестостерон. По мнению многих авторов, он стимулирует развитие вторичных половых признаков, усиливает реактивность половых центров, влияет на обмен веществ и совместно с гипофизарными гормонами регулирует спермиогенез.

Женская половая клетка (яйцо) всегда содержит только X-хромосому, а в хромосомном наборе сперматозоидов может присутствовать как X-, так и Y-хромосома. Оплодотворение яйца спермием с X-хромосомой предопределяет женский, а с Y-хромосомой — мужской пол.

Если в семенниках и **придатках** на несколько суток повысить температуру до 38-40°, то сперматозоиды в придатках будут убиты, а в семенных канальцах прекратится образование новых сперматозоидов.

Встречаются бараны, у которых семенники остались в брюшной полости и не опустились в мошонку (крииторхиды).

Krunto/nitiM может быть одно- и двусторонним. При двустороннем крииторхизме бараны неспособны **оплодотворять маток**. Как одно-, так и двусторонние крииторхиды подлежат выбраковке, так как этот порок является наследственным.

2. Половой сезон

Овцы большинства пород в охоту приходят только в определенное время года. При отсутствии оплодотворения овуляционный цикл у них повторяется в пределах случного сезона, который в нашей стране, как правило, длится с конца лета и до середины зимы. Объясняется это тем, что в процессе формирования вида сохранялись лишь те животные, у которых период расплода совпадал с наиболее благоприятным для жизни приплода сезоном года. Такой сезон в средних широтах приходится на весенне-летние месяцы.

В процессе domestikации эта доминанта закреплялась искусственным отбором, осуществляемым человеком.

Вместе с тем надо отметить, что у разных пород сезонность размножения выражена не одинаково. Так, разводимые в средних широтах романовские овцы могут размножаться в течение круглого года, хотя количество маток, приходящих в охоту в мае-июле, и у них незначительное.

Животных, у которых в течение года половой цикл повторяется в определенном ритме много раз, называют полициклическими. У овец ритмичность половых циклов чаще

всего имеет место в осенний период, а в остальное время года — длительный половой покой. Поэтому овец относят к полициклическим, но с ограниченным половым сезоном.

На проявление полового инстинкта влияет целый ряд факторов внешней среды: свет, условия кормления и содержания, присутствие самца, температура и др. Одним из них принадлежит ведущая роль, другим — второстепенная. К ведущим, обуславливающим половую активность овец, можно отнести продолжительность светового дня, к подчиненным — состав и качество корма, температуру окружающей среды, влажность воздуха и др. Нередко факторы внешней среды действуют не изолированно, а во взаимосвязи друг с другом, чем усиливается торможение или активизация процесса. Высокая внешняя температура и длительное воздействие прямых солнечных лучей тормозят наступление охоты. Массовое ее проявление наблюдается, как правило, через 2-3 месяца после самого длинного светового дня, к этому времени и температура воздуха становится умеренной.

Продолжительность инсоляции действует через сложный механизм, в котором участвуют глаза, нервные пути, проходящие через головной мозг, гипоталамус и **гипофиз**. Конечным результатом является соответствующая регуляция секреции гонадотропинов.

Условия кормления играют важную роль во всех физиологических отправлениях организма, в том числе и при пробуждении или угнетении половой активности животных. Так, хорошим предслучным нагулом можно обеспечить более ранний и дружный приход маток в охоту, а скудное кормление и истощение могут привести к полному торможению репродуктивных свойств животных. Подавление половой функции в условиях недокорма связано с тем, что гипофиз не выделяет в кровь гонадотропины. Это играет защитную роль, поскольку суягность может привести истощенный организм к гибели.

Замечено, что период полового сезона удлиняется во влажные годы и уменьшается в засушливые.

Следует отметить, что сезонность в осуществлении половых рефлексов у баранов выражена гораздо слабее, чем у маток. В летний период бараны при общении с находящимися в охоте матками проявляют половые рефлексы с такой же активностью и силой, как и в осенние месяцы. Однако объем эякулята, концентрация, резистентность и жизнеспособность спермиев характеризуются низкими показателями. Кроме того, в летний период бараны быстрее утомляются и, как правило, способны делать не более 2-3 садок в сутки.

Знание факторов внешней среды, обуславливающих половую активность животных, имеет большое значение при направленном изменении сроков полового сезона.

5. Подготовка баранов и маток к случке

При подготовке маток и баранов к случке необходимо решать следующие основные задачи:

- за 1,5-2 месяца до случки провести отъем ягнят, выбраковать маток, не пригодных к воспроизводству, и сформировать отары;

- в эти же сроки закончить все ветеринарные обработки: профилактическую и лечебную купки, вакцинацию и дегильминтизацию овец и др.;

- обеспечить хороший предслучной нагул животных;
- в оптимальные сроки случного сезона провести осеменение.

Формирование отар. При формировании маточных отар придерживаются следующего принципа: в каждую отару включают животных одной породы, пола, возраста и класса. В крупных овцеводческих хозяйствах в пределах одного класса создают отары по типу складчатости, происхождению, величине животных и т.д. Такое разделение маток облегчает подбор производителей.

В одной отаре нельзя содержать животных с тонкой, полутонкой и особенно с неоднородной шерстью. Совместное их содержание тормозит преобразовательный

процесс и снижает качество шерстяного сырья, поскольку неоднородная шерсть засоряет однородную.

После выбраковки можно доукомплектовывать маточные отары за счет полутороговых ярок. При содержании их вместе с матками облегчается проведение ягнения и выращивание молодняка, поскольку, если молодая матка не принимает свой приплод или у нее мало молока, есть возможность вырастить приплод с помощью полновозрастных и обильно-молочных маток. Недостатком этого метода комплектования отар является то, что старые матки как более сильные «объедают» молодых, которые в результате теряют упитанность, что осложняет работу. Поэтому ярок, идущих в случку в 1,5 года, рекомендуется формировать в отдельные отары. Для пополнения маточных отар чаще всего расформируют отару маток нужного возраста и класса. Такой порядок обеспечивает сравнительную однородность стада по возрасту и классу, что имеет существенное значение в кормлении и содержании животных, облегчает племенную работу.

Когда нет возможности формировать отары из маток одного возраста и класса, их целесообразно формировать из животных смежных классов и близких по продуктивности. Например, маток высших классов (элита, I) формируют в одну отару, а прочих маток — в другую.

Лактация, как правило, задерживает становление регулярных половых циклов и проявление охоты, поэтому отбивку ягнят **необходимо заканчивать не менее чем за 1,5 2 месяца!** до начала случной кампании.

Отбивка ягнят от матерей способствует быстрому восстановлению массы тела маток и приходу их в охоту.

Подготовка маток к случке. Чтобы хорошо подготовить маток к случке, необходимо в предшествующий ей период обеспечить их полноценным кормлением, содержанием и уходом. Для предслучного нагула выделяют пастбища с хорошим травостоем, поят маток не менее двух раз в день, дают им минеральную подкормку, а при необходимости подкармливают концентратами.

Установлено, что на повышение оплодотворяемости и многоплодия маток положительно влияет кормление их в предслучной и случной периоды сочным зеленым кормом.

Чтобы обеспечить маток зеленым кормом в период случки, пастбища, расположенные у пункта осеменения, не стравливают. А в засушливых районах, где летом естественные травы выгорают, для предслучного нагула целесообразно иметь сеяные пастбища. Хорошие результаты также дает использование зеленой подкормки, пастба по стерне зернобобовых культур. В жаркое время года практикуют ночную пастбу маточных отар.

При проведении предслучного нагула, особенно на культурных пастбищах или с использованием зеленой подкормки, следует учитывать, что на воспроизводительную функцию маток существенное влияние оказывает ботанический состав поедаемых ими трав.

В последнее время установлена связь между бесплодием маток и поеданием ими растений, обладающих эстрогенным действием. В частности, при пастбе по клеверному пастбищу в фазе цветения, резко снижается оплодотворяемость и плодовитость маток.

Если к началу случного сезона матки, несмотря на принятые меры, имеют низкую упитанность, целесообразно применить форсированное кормление (флашинг). Суть метода состоит в том, чтобы быстро улучшить упитанность маток перед началом случки. За 2-3 недели до предполагаемого начала и в течение первых трех недель случки маткам ежедневно дополнительно к пастбищу дают по 0,4-0,5 кг на голову концентратов. Особенно хорошее действие оказывают подкормка зерном люпина по 0,2-0,3 кг, другими зернобобовыми. В результате сроки случки сокращаются, оплодотворяемость и

плодовитость (процент двоен) повышается, доля яловых маток снижается. Если перед началом случки овцы имели хорошую упитанность, то флашинг не дает эффекта.

Хорошее стимулирующее действие на приход маток в охоту оказывает пуск в отару вазэктомированных баранов за 3-4 недели до начала случки.

Подготовка баранов к случке. Полноценное кормление, хороший уход и правильное содержание в течение года — главные условия получения ОТ баранов 6-ю количества высококачественного семени. Содержать их следует отдельно от других половозрастных групп, они должны иметь заводскую упитанность.

В теплое время года производителей содержат на пастбище с хорошим травостоем, кроме того, их скармливают корнеплоды (морковь, свеклу), сено и концентрированные корма из расчета 0,5-1 кг на голову в день.

Практика подготовки баранов к случке, особенно в южных районах, показывает, что, находясь в случной период и под палящими лучами солнца даже осенью, они длительное время дают неполноценную сперму. Поэтому на пастбищах устраивают базы-навесы, где животные отдыхают в жару и получают минеральную и концентрированную подкормку.

Период от начала сперматогенеза до созревания сперматозоидов продолжается 45 суток и более. Поэтому подготовку производителей к случке надо начинать за 1,5-2 месяца до ее начала. За 35-40 дней до этого проводят все профилактические и лечебные обработки, затем животных переводят на повышенный рацион кормления. В это время им требуется 2,5-3 корм. ед. на 100 кг живой массы, причем особенно важно, чтобы они получали белковые, витаминные и минеральные корма. В кормовом рационе производителя живой массой 100 кг должно содержаться не менее 400 г переваримого протеина, 65-75 мг каротина и 14-15 г фосфора. Такая норма кормления сохраняется и на период случки.

Хорошим белковым кормом является сено бобовых трав, концентраты, жмых. По содержанию каротина лучшие корма — морковь и хороший кукурузный силос. Корма животного происхождения (рыбная, мясная, мясокостная мука, молоко, куриные яйца и др.) повышают активность производителей, улучшают качество семени и оплодотворяемость маток. Овес, ячмень, просо нужно давать дроблеными, жмых — молотый, соль — в измельченном виде из расчета 10-15 г на 1 корм. ед., а соль-лизунец можно держать в кормушках в качестве страховой добавки.

На период случки рекомендуются следующие (примерные) рационы кормления баранов (табл. 72).

При хорошем уходе и усиленном кормлении, особенно в предслучной и случной периоды, бараны могут делать до пяти-шести садок в день и давать сперму высокого качества.

В течение дня производители должны выпасаться или находиться на прогулке не менее 6 ч. Выпас-мощион проводят в утренние часы и после окончания осеменения. При недостаточном мощионе производители жиреют, становятся вялыми и не делают садок.

В подготовительный период производителей необходимо приучать к садкам в станке на матку и на искусственную вагину. В начале подготовительного периода им дают одну садку в пять дней, перед началом осеменения — через день. Это делается для того, чтобы удалить из половых путей застаревшее маложизненное семя и заменить его свежим, более жизненным, образовавшимся во время усиленной подкормки в подготовительный период. В день получения и оценки спермы барану назначают по две садки на искусственную вагину с промежутком в 10-15 мин. При хорошем кормлении и содержании взрослый баран должен давать эякулят объемом 1-1,5 мл с оценкой не ниже Г-9. Производителей, семя которых оценивается ниже, к осеменению не допускают.

Чтобы удалить старые сперматозоиды, запас которых в придатке семенника достигает 150 млрд. и более, надо получить не менее 25-30 эякулятов, т.е. сделать 25-30 садок.

Заслуживает внимания подготовка баранов-пробников, от половой активности которых зависит своевременное выявление маток в охоте. Пробников выбирают из числа молодых, энергичных баранов не ниже I класса той же породы, что и бараны-производители, поскольку они обычно используются для докрытия маток после окончания искусственного осеменения. Для отары маток в 800-1000 голов требуется 10-12 баранов-пробников, которых подготавливают к случке одновременно с баранами-производителями. Прежде всего улучшают их кормление и содержание. Примерно за 2-3 недели до случки пробников проверяют на половую активность, а у резервных баранов, намеченных для вольного докрытия маток, оценивают и качество спермы.

Пониженная половая активность производителей и методы ее стимулирования. На половую активность производителей и качество спермы большое влияние оказывают температурный и световой режимы. Вредно действует на сперматогенез высокая температура и большая длина светового дня.

Вредное влияние этих факторов на половую активность и качество спермы баранов можно снизить, а нередко и предупредить:

- если в жаркий период дня баранов содержать под навесом или в тени деревьев;
- если препуций и мошонку обливать или погружать в воду комнатной температуры;
 - если мошонку освободить от шерсти (остричь);
 - если на 5-6 недель в предслучной период уменьшить дневную световую норму путем затемнения помещения, в котором содержатся бараны.

Нередко часть производителей отказывается от покрытия маток и в осенний период, что нельзя объяснить неблагоприятным влиянием световых, температурных и других метеорологических факторов. В этом случае снижение или полная утрата половой активности обусловлены другими причинами. Одной из них может быть низкий уровень кормления (недостаточное обеспечение животных энергией и протеином, витаминами А, Е и минеральными веществами). Вполне естественно, что необходимо изменить рацион и обеспечить производителей полноценным кормлением.

В ряде случаев производители, хорошо работающие на искусственном осеменении, вдруг начинают неохотно эякулировать в искусственную вагину. Причиной этого могут быть погрешности в технике получения семени: неправильно смонтирована вагина, очень высокая или слишком низкая температура, неправильное давление и др. Изменение обстановки в манеже, где берется семя, тоже может явиться причиной торможения полового рефлекса. Любую причину, вызывающую угасание или торможение полового рефлекса, надо немедленно устранять, в противном случае производитель может совсем отказаться от садки и тогда трудно будет вернуть его в нормальное состояние.

При длительном совместном содержании у производителей нередко вырабатываются порочные условные рефлексы: они не проявляют либидо в отношении маток, но активно покрывают друг друга. Чтобы предупредить это нежелательное явление, производителей в предслучной период следует изолировать друг от друга. Восстановить нормальные половые рефлексы производителя на самку можно путем помещения его в манеж, где должны быть матки в состоянии охоты.

С особым вниманием и тактом следует разрабатывать молодых, недостаточно активных производителей. Для полового возбуждения к ним подпускают несколько маток с хорошо проявленной охотой. Если и в этом случае они окажутся неактивными, то вместе с матками рекомендуется пускать активных производителей.

Целесообразно при появлении полового возбуждения малоактивным производителям дать возможность произвести садку; затем их приучают к садке в станке: вначале на матку, а потом на искусственную вагину. В отдельных случаях малоактивных производителей пускают в маточную отару на 4-5 ч в течение нескольких дней.

Активность производителей повышается при использовании СЖК. Этот препарат вводится под кожу в бесшерстную область паха в дозе 1500-2000 м.е., если живая масса производителя около 100 кг. Как правило, активность производителей повышается после первой инъекции. Если есть необходимость повторно ввести СЖК, то это делается через 8-10 дней после предыдущего введения в тех же дозах. Применение гормональных препаратов усиливает половые рефлексы, улучшает качество семени производителей и повышает оплодотворяемость маток.

4Случка овец

Половая зрелость и возраст первой случки. Половой зрелости одни животные достигают раньше 7-8 месяцев, другие позже 9-10 месяцев. Это зависит от породы, климата и питания животных, их половое созревание и рост регулируются гормонами, выделяемыми в кровь гипофизом. В молодом возрасте гормоны гипофиза способствуют ускорению роста животного. После того как рост замедляется, гипофиз начинает вырабатывать гормоны, стимулирующие развитие половых органов.

Половая зрелость у овец наступает раньше, чем заканчивается рост, поэтому осеменять их сразу же по достижении половой зрелости нежелательно. Ранняя случка задерживает нормальное развитие животного, поскольку необходимые для его роста питательные вещества идут на развитие плода, а после родов — на образование молока. Слишком позднее спаривание также вредно. В этом случае пища, которая должна пойти на питание плода, идет на образование жира. Отложение жира вокруг яичников отрицательно влияет на воспроизводительные функции самок.

Некоторые племенные хозяйства в зоне тонкорунного овцеводства практикуют первую случку в возрасте 2,5 лет. Овец, идущих в первую случку в таком возрасте, называют переярками. Первая случка в возрасте 2,5 лет оправдана только в том случае, если в первый год жизни из-за недокорма или болезни произошла задержка роста, недоразвития ярок. Во всех других случаях половозрастная группа — переярки — нежелательна.

Ярок всех пород в первую случку рекомендуется пускать в возрасте 12-18 месяцев, при условии, что их живая масса составляет 75-80 % от массы взрослых маток.

Применяют вольную, гаремную, классную, ручную случки и искусственное осеменение.

Вольная случка заключается в том, что маток и производителей содержат в общем стаде в течение 1,5-2 мес. Пришедшие в охоту матки покрываются на протяжении всего случного периода без контроля со стороны человека. При вольной случке производители быстро изнашиваются, в связи с чем срок их племенной службы небольшой. На каждые 100 маток требуется 3-4 производителя. Если в стадо маток пускают сразу несколько баранов, то целесообразно разделить их на две группы и пускать к маткам поочередно, через день. Можно также пускать баранов в стадо ночью, а днем выделять и подкармливать, а если матки содержатся на пастбище, то баранов пускают в отару днем, а ночью подкармливают.

Бесконтрольное спаривание при вольной случке может привести к заражению здоровых животных больными, к тому же **затруднено** покрытие маток с большими отложен **иями** жира на хвосте, что приводит к высокому проценту их яловости. По организации и проведению вольная случка наиболее простая и малотрудоемкая **операция**, но бесконтрольное и нерациональное использование ценных производителей **затрудняет осуществление** племенной работы.

Гаремная случка позволяет контролировать происхождение получаемого потомства. Для ее проведения необходимо для каждой группы маток численностью 30-50 голов иметь огороженный участок пастбища с кормовой емкостью на один месяц. Можно также устроить небольшие загоны по числу групп маток и в течение месяца кормить маток в загоне **привозной** травой и другими кормами. После месячной выдержки с

бараном маток из каждого загона объединяют в одно стадо и заканчивают случку обычным порядком.

Классная случка заключается в том, что на случной период на определенный класс маток назначают определенных производителей. В остальном она мало чем отличается от вольной случки.

Ручная случка контролируется человеком. Это дает возможность осуществлять индивидуальный подбор животных и эффективно вести племенную работу; улучшается использование племенных производителей. Однако при ручной случке ограничено использование лучших племенных производителей, на ее проведение требуются большие трудовые затраты, не устраняется возможность заражения и распространения через производителей заразных заболеваний. Ручная случка применима в хозяйствах с небольшим поголовьем овец, а также при индивидуальном подборе.

При ручной случке выборку маток в охоте проводят с помощью пробников. Маток в охоте спаривают с назначенными для них производителями. Для спаривания матку лучше фиксировать в станке. Матка считается покрытой после того, как производитель сделает садку с характерным толчком. Не следует несколько раз подряд покрывать одну и ту же матку. Для оплодотворения вполне достаточно одной нормальной садки.

После покрытия матки производителя отводят в загон, где он содержится, а матку — в группу слученных животных. Затем также случают следующую матку. В течение дня производителю дают покрыть 3-4 матки, а при усиленном кормлении и хорошем содержании — 5-6, с промежутками между садками не менее 1-2 ч. Один раз в пятидневку проверяют качество спермы.

Если качество спермы низкое, производителя в случку не пускают, а создают ему соответствующие условия: полноценное кормление и хорошее содержание. К случке таких производителей допускают лишь после того, как качество спермы у них восстановится.

Продолжительность случного сезона 1,5-2 мес. Один производитель при ручной случке может покрыть 60-80 маток и более. После окончания ручной случки производителей пускают в отару на 25-30 дней для вольного покрытия маток, оставшихся неоплодотворенными.

Искусственное осеменение считается одним из совершенных способов оплодотворения маток. Преимущество искусственного осеменения в том, что ценных в племенном отношении производителей можно максимально использовать, а это одно из важных условий повышения племенных и продуктивных качеств животных. Этот метод, кроме того, является важным средством борьбы с бесплодием маток, у которых от естественной случки результативность оплодотворения невысокая (курдючные, жирнохвостые). Этот метод профилактирует ряд болезней, передающихся половым путем.

Наряду с этим искусственное осеменение сопряжено с затратами на помещения, покупку инструментов, оборудования, реактивов, требуется дополнительная рабочая сила. Эти затраты не всегда окупаются, особенно при использовании метода на небольших фермах (500-1000 маток).

В последние годы в ряде зон страны получает распространение осеменение овец замороженной спермой. Доставка такой спермы в хозяйства и ее хранение обходятся станциям искусственного осеменения дешевле, чем охлажденной до 0 °С. Однако низкая оплодотворяющая способность спермы после оттаивания влечет за собой удлинение случного периода и прохолост маток.

2.12 Семинарское занятие №14,15 (4 часа).

Тема: «Корма , кормление и содержание овец»

2.12.1 Вопросы к занятию:

- 1 Кормление и содержание овец в стойловый период
- 2.Кормление и содержание овец в пастбищный период.
3. Организация и техника нагула овец

2.12.2 Краткое описание проводимого занятия:

1. Кормление и содержание овец в стойловый период

Кормление в стойловый период должно быть организовано так, чтобы овцы были обеспечены необходимыми кормами без перерыва. При недостаточном кормлении настриг шерсти уменьшается на 20—25 % и более, а шерсть получается с «уступом» или «голодной тониной», слабая, менее упругая и эластичная.

Овцы, являясь жвачными животными, прекрасно используют грубый корм. Основой зимнего кормления овец должно быть хорошего качества сено, особенно бобовое. Гречишную солому овцам скармливать нельзя, так как это вызывает выпадение шерсти. Из концентратов овцам дают плющенный овес, особенно племенным баранам и молодняку, ячмень и кукурузу в виде дерти, жмыхи, отруби, муку из зерен бобовых и проса. Особое внимание надо обратить на кормление овец сочными кормами — силосом и корнеклубнеплодами. Силосом заменяют до 50 % грубого корма. Сочные корма в первую очередь нужно скармливать суягным, подсосным маткам и молодняку.

Для правильного использования кормов в течение зимнего времени должен быть составлен план обеспечения поголовья овец кормами. В хозяйствах обычно овец кормят группами или отарами, поэтому составляют средний рацион на определенную группу овец. При этом руководствуются существующими нормами потребности в питательных веществах для каждой возрастной и половой группы овец. Согласно нормам составляют суточные рационы с учетом живой массы и продуктивности с таким расчетом, чтобы средний суточный рацион по питательности соответствовал потребности овец в питательных веществах, а по объему — их пищеварительной способности. Рационы надо составлять из разнообразных кормов хорошего качества, легкопереваримых и охотно поедаемых животными.

Лучшие корма (сено и другие) на зимний период закрепляют за баранами-производителями, суягными (во второй половине беременности) и подсосными матками и ягнятами (на первую половину зимы). Когда ягнята подрастут и окрепнут, им дается менее ценное сено, С осени овцам скармливают корнеплоды, которые хуже хранятся, а затем силос. Менее ценные корма обычно дают валухам. В зимнее время кормить овец надо на базу из кормушек и яслей, и только в плохую погоду в овчарнях. Грубые корма дают 4—5 раз в сутки, концентраты 1—2 раза после водопоя, а сочные один раз до водопоя. Поят овец один раз после первой дачи сена, а подсосных маток 2 раза (утром и днем). В специальных кормушках необходимо постоянно держать соль-лизунец и мел для минеральной подкормки. Все работы на овчарне должны выполняться по специальному распорядку дня.

Овец нельзя поить ледяной водой и натошак, это вызывает простудные заболевания и поносы.

Содержать овец надо весь день на базу и загонять в кошару только на ночь и в плохую погоду. Периодически овец осматривают, чтобы проверить состояние упитанности, выявить заболевания (чесотку), отрастание копыт. Больных овец выделяют в специальные отары и лечат. Сильно отросшие копыта обрезают, иначе овцы будут хромать. Необходимо следить также за своевременной уборкой подстилки из помещения и заменой ее свежей. Содержание овец на сырой подстилке может привести к заболеванию их копытной гнилью.

Кормление баранов-производителей должно быть организовано таким образом, чтобы в течение всего года поддерживать их в заводских кондициях. В неслучной сезон

достаточна средняя упитанность, а к началу случного сезона бараны должны быть в состоянии вышесредней упитанности.

Из грубых кормов лучшим для баранов будет бобовое сено, из сочных — корнеплоды, особенно морковь и силос из зеленых растений, из зерновых кормов — овес, затем ячмень, кукуруза и просо. За месяц до случки баранам усиливают кормление.

Рацион баранов не должен быть объемистым. В зимний период в среднем им можно дать 2—2,5 кг сена, 1 — 1,5 кг корнеплодов или силоса и 0,5—0,7 кг концентратов. Перед случкой дачу концентратов увеличивают, а количество грубых и сочных кормов уменьшают. В этот период и в течение случного сезона баранам следует скармливать овес и просо.

В период случки баранам, получающим обильные рационы, надо обязательно снизить дачу сена до 1,3—1,4 кг, а при большом количестве садок — до 0,8 кг. После случного периода к обычному кормлению переходят постепенно.

Летом баранов надо содержать на пастбище и подкармливать концентратами — по 100—300 г в сутки на голову.

Минимальная потребность баранов в кальции 6—7 г, в фосфоре 5—6 г на 100 кг массы, соли 15—20 г на голову в сутки. Кроме того, в случной сезон надо дать в кормах 30—40 мг каротина на 100 кг массы животных.

Кормление маток. Ко времени покрытия и при окоте матки должны иметь хорошие кондиции. Суягных маток вышесредней упитанности в первую половину беременности можно кормить по рационам взрослых овец, а во вторую половину суягности рацион должен быть увеличен по общей питательности на 20-40%.

Суягным маткам надо давать 7—8 г кальция и 3,5—4 г фосфора на 1 ЭКЕ и 8—10 г соли на голову в сутки, каротина не менее 15—20 мг на 100 кг массы животного.

Пасти суягных маток следует на лучших участках, а если выпасы плохие, давать подкормку — по 100—200 г концентратов или по 1 кг силоса. От хорошо кормившихся в период суягности маток получают больше двоен, ягнята рождаются здоровыми и крепкими. Хорошее кормление благотворно влияет и на молочность маток.

Основной корм суягных маток — хорошее сено. Во второй половине суягности дачу грубого корма сокращают до 1—2 кг. Из концентратов дают разное зерно, отруби и жмыхи.

После окота матки на ее кормление должно быть обращено особое внимание, так как правильное кормление повышает молочность овец и обеспечивает хорошее развитие ягнят. Самое большое количество молока овца обычно дает в первый месяц после окота, на втором месяце лактации молочность ее несколько снижается и более резко уменьшается на третьем месяце лактации. В первое время после окота кормить маток надо умеренно, постепенно увеличивая дачу. Концентрированные корма начинают давать с 4—5-го дня.

Контролем правильного кормления подсосных маток является их масса: в конце лактации она должна быть такой же, как в начале подсосного периода. Исхудание маток недопустимо. Кормят маток 3 раза в сутки.

Маток с новорожденными ягнятами выделяют в отдельные группы — сакманы, когда ягнята достигнут 2-недельного возраста, сакманы составляют из 50 маток, а к месячному возрасту ягнят — из 200 маток.

В рационе подсосных маток должно быть 4,5—5,3 г кальция и 2,7—3 г фосфора на 1 ЭКЕ, каротина не менее 20—25 мг на 100 кг живой массы и 12—15 г соли в сутки на голову. Во второй период подсоса нормы матке постепенно снижают.

Кормление молодняка. Примерно до 3-недельного возраста ягнята питаются только молоком матери. Далее их начинают приучать к поеданию хорошего бобового сена и к концентратам. С 20-дневного возраста начинают давать по 10—20 г просеянной овсянки и отрубей и хорошего качества бобовое сено. В возрасте 1,5 мес количество концентратов увеличивают до 70—100 г в сутки, а к отбивке от маток — до 400 г на голову. В рацион

ягнят обязательно должны быть введены минеральные вещества: мел или костяная мука по 5—10 г и поваренная соль по 3 г на голову. Хорошо давать также разные корнеплоды, особенно морковь.

В стойловый период молодняк должен получать хорошее злаковое и бобовое сено, сочные корма — силос, корнеплоды и концентраты. При плохом кормлении ягнята слабо растут и дают мало шерсти.

2. Кормление и содержание овец в пастбищный период.

Овцы прекрасно используют пастбище, так как по биологическим особенностям и происхождению они пастбищные животные. Несмотря на хорошую приспособленность овец к пастбищному содержанию не все пастбища в одинаковой степени пригодны для них. На низких, сырых и болотистых пастбищах овцы заражаются гельминтами и заболевают копытной гнилью.

Для пастбы овец используют различные степные, суходольные, горные, полупустынные и искусственные пастбища. Использовать их надо с таким расчетом, чтобы овцы были обеспечены зеленым кормом весь пастбищный сезон. Там, где имеются искусственные выпасы, они обеспечивают овец хорошим питательным кормом на весь пастбищный сезон. Кроме того, на 1 га этих пастбищ можно содержать в 5—10 раз больше овец, чем на 1 га естественных пастбищ.

В овцеводстве надо применять загонную систему пастбы, что позволяет помимо правильного использования пастбищных угодий оздоровить пастбище от гельминтов. Перед выгоном на пастбище овец осматривают и обрезают отросшие копыта. Первыми на пастбище выпускают валухов, затем перезимовавший молодняк, суягных маток и, наконец, с наступлением теплой устойчивой погоды, подсосных маток с ягнятами.

Овцы должны пастись не менее 14—16 ч в сутки. Летом в жаркое время применяют ночную пастбу.

Место для тырла надо выбирать с густой, хорошей травой, чтобы овцы не засоряли во время отдыха шерсть.

В пастбищный период надо строго соблюдать установленный распорядок дня.

Поить овец надо 2 раза в сутки. В прохладную погоду и при пастбе на хороших сочных травах можно поить один раз. Поят овец утром, перед началом пастбы и после дневного перерыва, перед возобновлением пастбы. Водоемы, используемые для водопоя, должны быть прочными, с чистой водой. При поении из стоячих прудов и озер овцы могут заражаться гельминтами. Нельзя допускать длительных перегонов овец к водопою.

В период пастбищного содержания овцы ощущают большую потребность в соли, чем в зимнее время. Лучше всего соль давать в виде лизунца, куски которого раскладывают на тырле, где овцы находятся в дневные перерывы и ночуют.

3. Организация и техника нагула овец

Нагул овец проводят в хозяйствах, где имеется достаточное количество пастбищ. На нагул ставят выбракованных маток сразу после отъема от них ягнят, валухов после стрижки, свехремонтный молодняк текущего года рождения после отъема и стрижки.

Отобранных для нагула овец с учетом пола и возраста формируют в отары и группы размером: взрослых — по 800-900, молодняк — по 700-800 голов.

В хозяйствах, имеющих небольшие овцеводческие фермы, можно формировать нагульные отары и меньших размеров — 200-400 голов, объединяя в них выбракованных маток, ярок, валухов.

Для получения высоких приростов нагульным отарам выделяют хорошие пастбища, организуют минеральную подкормку животных, регулярный водопой.

Суточная потребность взрослой овцы в зеленом корме составляет 1-8 кг, а молодняка живой массой 30 кг и более — 4,5-6 кг. С учетом этой потребности и выделяют пастбищные участки для нагула.

Травостой пастбищ полнее используется при загонной системе пастбы.

Продолжительность стравливания каждого загона должна быть не более 4-6 дней.

На естественных пастбищах при урожае зеленой массы 40 ц/га размер загона для отары взрослых овец численностью 800 голов при пятидневном цикле использования может быть равен 7-8 га, при урожайности 30 ц/га — 10-11 и при урожайности 20 ц/га — 14-15 га.

Во избежание ухудшения ботанического состава и снижения урожайности травостоя необходимо ежегодно менять очередность использования загонов.

Во второй половине лета, когда пастбища выгорают и резко снижается их продуктивность, при недостатке выпасов для нагула овец используют пожнивные остатки после уборки хлебов. В районах интенсивного земледелия выпас овец в это время сочетают с подкормкой отходами растениеводства (свекловичные ботва и жом, измельченные початки кукурузы и корзинки подсолнечника и др.) или концентратами. В таких случаях получают высокий суточный прирост при небольших затратах концентратов.

Время снятия с нагула определяют по живой массе, состоянию упитанности животных и наличию кормовых угодий для продолжения нагула.

При хороших условиях нагула взрослые овцы и молодняк достигают высоких убойных кондиций в течение 75-100 дней.

1. Организация и техника откорма овец.

Откорм овец проводят в хозяйствах с недостаточным количеством пастбищ. В рационы включают различные виды силоса, корнеплоды и другие сочные и зеленые корма, а также сено и концентраты.

В разных зонах страны откорм овец имеет свои особенности. Например, в свеклосеющих районах для откорма овец используют отходы сахарного производства, в зерновых — солому, полосу, зерноотходы и т.д.

В настоящее время откорм овец чаще всего проводят в специально оборудованных помещениях, на фермах-площадках и др.

На откормочных площадках в зимний период можно содержать ремонтный молодняк, чем достигается круглогодичная эксплуатация помещений.

При проведении откорма желательны следующие требования.

На откорм ставят молодняк живой массой не менее 18 кг. Продолжительность откорма свехремонтного молодняка не более 135-150 дней. Живая масса ягнят к моменту реализации должна быть 38-42 кг и более.

В зависимости от конструкции откормочных помещений (площадок) величина групп должна быть до 250 голов в секциях на сплошных полах, до 120 — на решетчатых. Разница в живой массе молодняка в секции не должна превышать 3 кг, взрослых овец — 5 кг.

Размещают животных для откорма на площадках упрощенного типа из расчета 5-8 м² площади база на 1 животное, на фермах-площадках круглогодичного использования при откорме взрослых овец — 3 м, молодняка текущего года рождения до 8-месячного возраста — 2 м².

Под навесами и в овчарнях в летнее время площадь пола должна составлять 0,3 м² на 1 голову. На площадках с решетчатыми полами при постоянном наличии кормов в кормушках и свободном водопое на 0,4 м² пола размещается 1 ягненок в возрасте до 8 мес. При откорме взрослых животных на 1 овцу должно приходиться не менее 35 см кормового фронта, молодняка — 25-30 см. При кормлении овец гранулированными или сухими сыпучими кормосмесями из самокормушек и свободном доступе к корму в течение суток фронт кормления 10-12 см.

Для контроля за ходом откорма еженедельно взвешивают контрольные группы овец (не менее 25 голов из группы) и определяют расход кормов на полученный прирост живой массы.

При составлении рационов и расчета потребности в кормах руководствуются

нормами кормления (табл. 6.16).

В сутки скармливают: взрослым животным до 6 кг зеленой массы, 0,5 кг концентрированных кормов; молодняку в первый период откорма (до 6-месячного возраста) соответственно 3 и 0,3, во второй период 4 и 0,4.

Состав кормосмесей при откорме может быть следующим (табл. 6.17).

Среднесуточный расход гранулированных кормосмесей за весь период составляет в среднем: при откорме взрослых овец — 2,5-2,7 кг, молодняка с 3 до 5-месячного возраста — 1,2-1,4, с 5-ти до 8-месячного возраста — 1,8-2,0 кг на 1 голову. Диаметр гранул для овец должен находиться в пределах 4-14 мм.

Нормированное скармливание животным зеленой массы, рассыпных и гранулированных кормосмесей на фермах-площадках производится из кормушек ясельного типа. Для кормления овец гранулами вволю используют бункерные круглые или прямоугольные самокормушки, объем которых позволяет создать запас гранул в самокормушке на 5-7 дней.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

3.1 Лабораторная работа №1 (2 часа).

Тема: «Породы овец и коз»

3.1.1 Цель работы: Используя лекционный и литературный материал, описать и характеризовать основные породы овец.

3.1.2 Задачи работы:

Изучить ведущие породы овец различного направления продуктивности, особенно имеющие значение для Казахстана. Описание записать в таблицу 2.1.3.

Таблица 2.1.3 - Характеристика пород овец, коз

Порода	Как и где выведена порода овец	классификация		Густота шерсти	Средняя наибольшая длина шерсти, см	Средний и рекордный настриг шерсти, кг
		зоологический тип				
1	2	3	4	5	6	7

Продолжение таблицы

Средняя и рекордная масса, кг	Толщина шерсти, мкм	Выход мытой шерсти, %	Плодовитость маток	Биологические и хозяйственные особенности и породы	Зона распространения по породному районированию	Лучшие хозяйства	Мероприятия по дальнейшему совершенствованию породы
8	9	10	11	12	13	14	15

3.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

Муляжи овец, демонстрационный материал

3.1.4 Описание (ход) работы:

Породы овец классифицируют в зависимости от конкретных задач по одной из двух систем: зоологической или производственной.

Зоологическая классификация построена не по признакам различий черепа, как у других сельскохозяйственных животных, а по форме хвоста и его длине. Такая классификация объясняется тем, что на размерах и форме хвоста в гораздо большей степени, чем на черепе, отразились различия между группами овец по комплексу биологических особенностей. Длина хвоста, согласно данной классификации, учитывается не в абсолютных линейных величинах, а по тому, достигает ли кончик хвоста скакательных суставов или опускается ниже. Форма хвоста характеризуется степенью развития жировых отложений вдоль хвостовых позвонков и внешним видом этих отложений.

Академик П.С. Паллас предложил всех овец делить по форме и размеру хвоста на пять групп: короткохвостых, длиннохвостых, курдючных, жирнохвостых и африканских гривистых. В дальнейшем эта классификация подверглась изменениям и дополнениям со стороны Г. Натузиуса, Н.П. Чирвинского, М.Ф. Иванова.

По уточненной зоологической классификации все породы овец в зависимости от длины и формы хвоста делятся на пять групп: короткощехвостые, длиннощехвостые, короткожирнохвостые, длинножирнохвостые и курдючные.

В США (штат Южная Дакота) выведена бесхвостая порода овец, которая в эту классификацию не вписывается. Видимо, требуется дополнение этой классификации шестой группой — бесхвостые овцы (табл. 2.1.1).

Таблица 2.1.1 Зоологическая классификация овец

Группа овец	Форма и длина хвоста	Принадлежащие к данной группе породы и породные группы овец
1	2	3
Коротко-тощехвостые	Хвост короткий, не достигающий концом скакательных суставов. Число позвонков 10—12. Видимые снаружи отложения жира отсутствуют	Романовская, северная короткохвостая
Длинно-тощехвостые	Хвост длинный, опускающийся ниже скакательных суставов, тощий, без видимых отложений жира. Число позвонков 22—24	Все тонкорунные и полутонкорунные породы, скороспелые мясные (английские) овцы
Коротко-жирно-хвостые	Хвост короткий, в естественном положении не достигает скакательных суставов. Жировые отложения в виде небольшой подушки у корня хвоста. Число позвонков 10—12	Бурятская, тувинская, авасси
Длинно-жирно-хвостые	Хвост длинный, с хорошо выраженными жировыми отложениями. В естественном положении иногда не достигает скакательных суставов, чаще же находится на этом уровне или немного ниже его. Жировые отложения в виде округлого образования (подушка, иногда две подушки) или равномерно сужающейся клинообразной фигуры. Нижняя часть хвоста лишена жировых отложений, прямая или	Каракульская, кучугуровская

	изогнутая, чаще в виде буквы S, как, например, у каракульских овец. Число позвонков 22-24	
Курдючные	При корне хвоста на крупе имеется курдюк, то есть жировое образование в виде подушки, свисающей по направлению к скакательным суставам. Хвоста не видно, он сильно недоразвит и очень короткий, скрытый в курдюке. Число хвостовых позвонков 5—6	Едильбаевская, гиссарская, казахская курдючная грубошерстная, сарыаркинская, казахская курдючная полугрубошерстная, дегересская мясошерстная с полутонкой кроссбредной и полугрубой ковровой шерстью, атырауская курдючно-смушковая, джайдара, алайская, сараджинская
Бесхвостые	Хвост отсутствует	Овцы этой группы имеются в штате Южная Дакота (США)

Следует отметить, что форма, длина и размеры жировых отложений на хвосте имеют большую вариабельность. Поэтому по данной классификации не всегда можно достаточно четко установить разницу между овцами разных пород, а тем более между различными помесями. Тем не менее зоологическая классификация имеет научное значение, так как она позволяет судить о степени биологического сходства или различия между овцами разных пород. А это необходимо учитывать в практике использования пород, при районировании их и выборе для скрещиваний. Однако в одной и той же зоологической группе нередко оказываются породы, весьма различные по направлению продуктивности. Например, в группу длиннотощехвостых овец входят и тонкорунные породы, и мясные, и некоторые смушковые, и различные другие грубошерстные. Поэтому для производственных целей одной зоологической классификации недостаточно. Ее дополняют производственной (хозяйственной) классификацией.

Производственная классификация, предложенная М.Ф. Ивановым, отражает направление продуктивности овец. Эта классификация более удобная для производства, но она имеет некоторую условность. Дело в том, что иногда овец одной породы в разных регионах разводят для разных целей. Например, овец цигайской породы в странах Балканского полуострова используют как молочно-шерстных животных. Молочная продукция цигайских овец играет там существенную роль в питании населения. Однако у большинства пород основное направление продуктивности выражено достаточно четко. Поэтому производственная классификация успешно применяется и в настоящее время с вносимыми в нее дополнениями и изменениями, соответствует развитию овцеводства, созданию новых и совершенствованию имеющихся пород.

В Казахстане разводят свыше 20 пород овец, в т.ч. 3 российских (кавказская, волгоградская, алтайская), что обусловлено большим разнообразием природных и экономических условий республики. В республике овцы шерстного направления

продуктивности не разводятся, хотя в свое время шерстный тип южноказахских меринов «приаральский» был создан (Маллицкий, Якушкина и др., 1966). Овцы разных пород в той или иной степени различаются между собой по продуктивно-биологическим качествам. С учетом этих особенностей породы овец, разводимых в стране, делят на следующие группы (табл. 2.1.2).

Таблица 2.1.2 Производственная классификация овец Республики Казахстан

Породы овец		Название породы
по типу шерстного покрова	по направлению продуктивности	
1	2	3
Тонкорунные	Шерстно-мясные	Североказахский меринос, бескарагайский и сулукольский внутripородные типы Южноказахский меринос, меркенский и куюкский внутripородные типы
	Мясо-шерстные	Казахский архаромеринос. Казахская тонкорунная
Полутонкорунные	Мясо-шерстные длинношерстные	Казахская полутонкорунная с кросс-бредной шерстью, восточный и юго-восточный зональные типы. Казахская мясо-шерстная, калченгильский, аксенгерский и шуский внутripородные типы Акжайкская мясо-шерстная Дегересская мясо-шерстная с полутонкой шерстью. Группа казахских многоплодных
	Мясо-шерстные короткошерстные	Типа гемпшир
	Шерстно-мясные	Казахский внутripородный тип цигайских овец
Полугрубошерстные	Мясо-сальные	Казахская полугрубошерстная, внутripородные типы каргалы, актобе, байыс
		Дегересская мясо-шерстная с полугрубой ковровой шерстью
Грубошерстные	Смушковые	Каракульская Атырауская курдючно-смушковая
	Мясо-сальные	Едильбаевская. Казахская курдючная грубошерстная. Сарыаркинская

Производственная классификация овец основана на степени выраженности наиболее важных хозяйственно полезных признаков. По характеру шерстного покрова разводимых в нашей стране овец делят на тонкорунных, полутонкорунных и грубошерстных.

3.2 Лабораторная работа №2 (2 часа).

Тема: «Понятие о шерсти. Формирование шерстной продуктивности»

3.2.1 Цель работы: Ознакомится с методами учета и приобрести навыки по оценке шерстной продуктивности овец, изучить физико-механические, технологические свойства шерсти овец.

3.2.2 Задачи работы: Изучить методы учета шерстной продуктивности

3.2.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

Образцы тонкой, полутонкой, полугрубой и грубой шерсти овец и других животных; образцы немытой и мытой шерсти разной тонины; образцы шерсти с различной извитостью, прочностью; документы первичного зоотехнического учета.

3.1.4 Описание (ход) работы:

По данным ЦНИИ шерсти минимальная доля потребления шерсти в России составляет 725 г на душу населения в год. При этом для нужд шерстеобрабатывающей промышленности страны в общем объеме производства тонкая шерсть должна составлять 75-76%, полутонкая (кроссбредная) – 11-13%, полугрубая (ковровая) – 4-5 % и грубая 9-10%.

Шерсть – волосяной покров животных, обладающий прядильной способностью или свойлачиваемостью.

Различают шерсть однородную и неоднородную.

Однородная шерсть включает:

- *тонкую шерсть*, состоящую из сильноизвитых, сравнительно коротких (3-10 см), мягких, эластичных волокон пуха толщиной от 10 до 25 мкм. Шерсть очень густая, содержит много жиропота.

- *полутонкую шерсть*, состоящую из менее извитых волнистых длинных волокон (9-18 см) или из смеси грубого пуха (21-40 мкм) и тонкого переходного волоса. В полутонкой шерсти жиропота как правило меньше, чем в тонкой.

- *полугрубую шерсть*.

Неоднородная шерсть включает:

- *полугрубую и грубую шерсть*. Грубая шерсть неуравненная по длине и тонине волокон, состоит из пуха, ости и переходного волоса, иногда содержит разновидность очень грубой ости – мертвый волос.

Шерсть по своим физическим свойствам является весьма сложным волокнистым материалом. В шерстяных волокнах выделяют три основных слоя: наружный – чешуйчатый, расположенный под ним корковый и сердцевинный (в центральной части волокна). *Чешуйчатый слой* – оболочка шерстного волокна, которая состоит из ороговевших клеток в форме чешуек различного вида (кольцевидные у пуховых и черепицеобразные у ости и переходного волоса). Чешуйчатый слой составляет 2-3% от массы волокна. Его функции – защита от атмосферных, световых и механических воздействий. Чешуйки играют большую роль в процессе прядения и валки.

Корковый слой – средний слой шерстного волокна, состоящий из веретенообразных клеток, расположенных под чешуйчатым слоем. Внутри коркового слоя, у пигментированных волокон, находятся гранулы пигмента меланина, определяющие его окраску. У пуховых волокон корковый слой составляет до 90% от массы всего волокна, у мертвого волоса – до 10%.

Сердцевинный слой – сплошной в остевых, или прерывистый в переходных волокнах слой, находящийся в центральной части шерстинки. Его содержание составляет от 15% до 90% от массы волокна.

Причем чешуйчатый и корковый слой имеются во всех типах волокон, а сердцевинный только в некоторых. Чешуйчатый и корковый слои – носители наиболее ценных свойств шерсти, а сердцевинный слой состоит из пористых, рыхлых клеток и не является плотной тканью. Разная степень развития основных структурных элементов шерсти вызывает разнообразие типов волокон по внешнему виду и физическим свойствам.

По внешнему виду и техническим свойствам различают следующие типы шерстяных волокон:

Пуховые волокна – тонкие, имеющие мелкую извитость, относительно короткие волокна. Состоят из чешуйчатого и коркового слоев. Чешуйки кольцевидные. Руно тонкорунных овец состоит целиком из пуха. У грубошерстных овец (за исключением романовских) пуховые волокна короче ости и образуют обычно нижний, более короткий ярус шерстяного покрова. Толщина пуха колеблется от 10 до 25 мкм, длина от 5 до 12 см. По техническим свойствам – пух самое ценное волокно.

Переходный волос – тип шерстных волокон, занимающий промежуточное положение между остью и пухом. Волокна крупноизвитые, толщиной 26-65 мкм, длиной от 10 до 40 см. Состоит из чешуйчатого, коркового и сердцевинного слоев. Последний развит слабо или отсутствует. Переходный волос можно отличить по кольцевидно-сетевидному расположению чешуек чешуйчатого слоя. Переходный волос в смеси с остью и пухом входят в состав шерсти полугрубошерстных и грубошерстных пород овец. Шерстяной покров полутонкорунных и некоторых полугрубошерстных пород овец целиком состоит из переходных волокон.

Остевое волокно – прямые шерстные волокна, состоящие из чешуйчатого, коркового и сердцевинного слоев, сердцевинный слой непрерывный. Толщина от 52 до 75 мкм, длина до 40 см. Ость входит в состав шерстных волокон грубошерстных и полугрубошерстных пород овец. Чем тоньше ость, тем ценнее по своим технологическим качествам шерсть.

Сухой волос – грубая ость, характеризующаяся сухостью, жесткостью и ломкостью наружных концов волокон. В технологическом отношении сухой волос занимает промежуточное положение между остью и мертвым волосом. Встречается в шерсти большинства грубошерстных пород овец.

Мертвый волос – разновидность ости. Волокна короткие и толстые, тониной более 75 мкм, прямые, ломкие, не поддаются окрашиванию. Состоят в основном из чешуйчатого и сильно развитого сердцевинного слоев. При сгибании не образует дуги, а надламывается. В шерстяных изделиях плохо удерживается, быстро разрушается и сильно понижает качество ткани, резко ухудшает технологические свойства шерсти. Встречается в шерсти некоторых грубошерстных пород (курдючных).

Кроющий волос – прямой, короткий (3-4 см), очень жесткий, с сильным блеском. По тонине он близок к ости, обычно иначе окрашен, чем руно. вследствие наклонного расположения корней в коже кроющие волосы образуют на ее поверхности своеобразное покрытие – один волос прикрывает другой подобно плиткам черепицы на крыше. Отсюда и название – «кроющий волос». Кроющий волос не состригается. Растет на морде, конечностях, иногда на хвосте.

Песига – шерстяные волокна, встречаются в шерсти тонкорунных и полутонкорунных ягнят. Песига отличается большей длиной, огрубленностью и меньшей извитостью. В течение первого года жизни песига заменяется обычными волокнами, типичными для данной породы.

Защитный волос – остевое волокно, растущее на веках овец.

Осязательный волос – остевое волокно, растущее на кончике морды овцы. Осязательный волос связан с окончаниями нервов, важен для животных при ориентации на пастбище, пользовании кормушками, водопойными корытами и т.д. Состригать осязательный волос нельзя.

Кемп – огрубленные волокна типа ости, белого цвета, не окрашивающиеся, ломкие. Встречаются в шерсти тонкорунных и полутонкорунных пород овец, передаются по наследству, что необходимо учитывать в селекционном процессе.

3.3 Лабораторная работа №3,4 (4 часа).

Тема: « Классификация отечественной шерсти. Группы и виды шерсти.

3.3.1 Цель работы: Ознакомиться с видами натурального шерстяного сырья и химическими волокнами, научиться определять различные типы шерстных волокон

3.3.2 Задачи работы:

Изучить виды натурального волокна

Изучить типы шерстных волокон

3.3.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

Образцы оригинальной тонкой, полутонкой, полугрубой и грубой овечьей шерсти, образцы козьей, коровьей, конской, верблюжьей, образцы химических и растительных волокон, щелочи, кислоты, чистые пробирки, стеклянные палочки, пинцет, листы черной бумаги, торсионные весы

3.3.4 Описание (ход) работы:

Необходимо выполнить задание

Задание 1. Установите действие на натуральную шерсть, искусственные и синтетические волокна химических реагентов и пламени.

Задание 2. В предложенных образцах выделите пух, ость, переходный, мертвый и сухой волос. Сделайте препараты для изучения различных типов шерстинок, зарисуйте их строение в тетрадь и дайте характеристику.

3.4 Лабораторная работа №5 (2 часа).

Тема: « Организация стрижки овец. Факторы влияющие на шерстную продуктивность»

3.4.1 Цель работы: приобрести практические навыки организации и проведения механизированной стрижки овец.

3.4.2 Задачи работы:

- 1) освоить технику подготовки механизмов, расстановки их;
- 2) ознакомиться с приемами механизированной стрижки овец, техническими характеристиками электростригательных агрегатов, безопасностью труда при их использовании.

3.4.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

Набор демонстрационного оборудования

3.4.4 Описание (ход) работы:

Стрижка – одна из самых трудоемких работ и весьма важный производственный процесс в овцеводстве всех направлений продуктивности, особенно в тонкорунном и полутонкорунном, где шерсть служит основным видом продукции. По своей значимости стрижка овец равна сбору урожая в полеводстве, и поэтому результаты ее в значительной мере определяют экономическую эффективность отрасли. При правильно организованной стрижки и хорошо выполненной работе сохраняются все технологические свойства шерсти, при нарушении же элементарных правил стрижки неизбежны потери и снижение ее качества. Взрослых овец тонкорунных и полутонкорунных пород стригут один раз в год – весной. Молодняк таких овец весеннего ягнения стригут весной следующего года, а зимнего ягнения (декабрь-февраль) можно остричь в год его рождения.

Сроки весенней стрижки устанавливают в каждом хозяйстве в зависимости от погодных условий, состояния овец и их шерстного покрова. Грубошерстных и полугрубошерстных овец стригут весной и осенью, два раза в год.

Стрижка успешно может проведена при условии своевременной подготовки помещения, стригального агрегата и необходимого инвентаря. Если в помещении нет деревянного пола, то из досок устраивают сплошные настилы из расчета 1,7...2 м длины и 1,2...1,4 м ширины на одного стригальщика. Высококвалифицированный стригальщик на стрижку одной овцы затрачивает 3...4 минуты. Поэтому в хозяйствах, имеющих опытных стригальщиков, овец стригут в короткие сроки за 10...20 рабочих дней. Например, в хозяйстве 5 тыс. овец, чтобы закончить стрижку в течение 20 дней (агрегат на 12 машинок) дневная выработка на стригальщика 25 овец.

Перед стрижкой овец ставят на голодную выдержку (12-14 часов), так-как накормленные овцы плохо переносят стрижку и нередко бывают случаи заворота кишок, заканчивающихся гибелью животных. Отары овец пригоняют на пункт к вечеру накануне дня стрижки.

При разработке графика подачи отар на стрижку необходимо учитывать ветеринарно-санитарное состояние поголовья.

Неблагоприятные по каким-либо заболеваниям отары стригут в последнюю очередь, чтоб не заразить других животных.

Сначала стригут менее ценных животных и предназначенных для последующего откорма и сдачи на мясокомбинат, на которых стригали приобретают навыки, а затем взрослых валухов, маток и баранов-производителей.

Племенных баранов целесообразно стричь ежегодно в одни и те же дни.

Если отары смешанные, перед стрижкой следует выделить овец с неоднородной шерстью, разделить их на белых и цветных. В первую очередь овец стригут с однородной белой шерстью, потом белых с неоднородной или цветной шерстью, очищают помещение, классировочные столы и все оборудование. Стригут овец только с сухой шерстью.

3.5 Лабораторная работа №6 (2 часа).

Тема: « Меховые, шубные и кожевенные овчины»

3.5.1 Цель работы: Ознакомиться с основными видами и свойствами мехового сырья, принципами его зоотехнической оценки.

3.5.2 Задачи работы:

Задание. Провести оценку смушковых по площади, цвету, качеству мездры и результаты записать в тетрадь.

3.5.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

Набор демонстрационного оборудования

3.5.4 Описание (ход) работы:

Овчины – шкуры, снятые с убитых овец в возрасте не моложе пяти месяцев. Если шкуры сняты с более молодых животных, они носят название мерлушки. Овчины подразделяют на шубные, меховые и кожевенные. Шубные овчины получают от грубошерстных овец. Шубные овчины, используемые для пошива полушубков, должны иметь ворс от 2,5 до 6 см. К их мездры предъявляют повышенные требования, поскольку изделия носят мездрой наружу. Из овчин, ворс которых длиннее 6 см шьют тулупы.

Лучшие шубные овчины дают романовские овцы, особенно ягнята в возрасте 5-6 месяцев. Романовские овчины по легкости, носкости и красоте являются лучшими в мире.

Русские овчины получают от овец грубошерстных пород, кроме курдючных и смушковых, от которых получают степные овчины.

Меховые овчины получают от тонкорунных, полутонкорунных и полугрубошерстных пород овец. Изделия из меховых овчин носят мехом наружу, а мездрой внутрь.

К меховым овчинам относят шкуры тонкорунных, полутонкорунных и грубошерстных овец с длиной ворса от 2 до 5 см. Часто эти овчины используют на выделку меха, имитирующего натуральные меха выдры, котика и другие.

Кожевенные овчины – это шубные или меховые овчины, имеющие крупные недостатки в состоянии шерстного покрова или с очень короткой шерстью и непригодны для выработки шубных или меховых изделий. Они поступают на кожевенные заводы для выделки кожи.

3.6 Лабораторная работа №7 (2 часа).

Тема: «Смушковая продукция овец »

3.6.1 Цель работы: Ознакомиться с основными видами каракуля и научиться различать участки шкурки каракуля.

3.6.2 Задачи работы:

Задание 1. Изучить топографию каракулево-смушковой шкурки, зарисовать различные участки.

Контрольные вопросы.

1. Что такое каракуль?
2. Объясните термины: каракульча, голяк.
3. Дайте характеристику различным формам завиткам каракуля

3.6.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

Набор демонстрационного оборудования

3.6.4 Описание (ход) работы:

Смушек – это шкурка ягненка каракульской породы, убитого на 1-3 день после рождения. В торговле эти шкурки идут под названием «каракуль». Ценность смушка определяется его цветом, формой завитков, толщиной мездры и площадью шкурки.

Самой распространенной у каракульских овец является черная окраска (араби). Черных смушков получают до 90%. Наиболее ценятся смушки интенсивной иссиня-черной окраски, менее – имеющие слегка буроватый оттенок. Если на шкурке имеются белые отметины (пегость), такие смушки при фабричной обработке подкрашиваются в черный цвет.

Окраска коричневых смушков (камбар) варьирует от светло-рыжеватой до темно-коричневой. Серая окраска смушков (ширази) образуется от смешивания белых и черных волосков. Для окраски сур характерно посветление кончиков волос при любом цвете шкурки. Особенно красивы смушки, у которых основание волоса почти черное, а верхняя треть или четверть светлее.

Форма завитков смушка различна. Наиболее красив вальковатый завиток Вальки могут быть длинными (40 и более мм), средними (20-40мм) и короткими (12-20 мм). Если валек еще короче, его называют бобом. Вальковатый и бобастый завитки являются желательными. Кольчатые и полукольчатые допустимы только для серого каракуля.

Участки смушков, покрытые неизвитым, прижатым к коже волосом, называют ласами. Ласы, расположенные по краям смушка, не снижают его ценности.

Иногда от каракульских овец получают не смушки, а каракульчу и голяк (в результате аборт, травм, вынужденного убоя маток). Каракульча – шкурка плода 4,5-месячного возраста. Не до конца сформировавшиеся завитки чередуются с ласами, создавая на шкурке красивый муаровый рисунок.

Шкурки каракульчи ценятся высоко. Голяк – шкурки плода в 3-4 месячном возрасте. Они имеют гладкий волос без завитков и рисунка. Голяк – малоценный товар

3.7 Лабораторная работа №8 (2 часа).

Тема: «Методы разведения овец »

3.7.1 Цель работы: Освоить принципы группового и индивидуального подбора.

3.7.2 Задачи работы:

Задание 1. Произвести групповой подбор тонкорунных овец.

3.7.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

Набор демонстрационного оборудования

3.7.4 Описание (ход) работы:

Подбор — система спаривания животных, которая ведет к образованию новых генотипов.

Учитывая, что большинство хозяйственно полезных признаков у овец наследуется промежуточно, непременным условием успешного подбора является превосходство баранов-производителей над матками по всему продуктивно-конституциональному комплексу.

Подбор может быть гомогенный (однородный), гетерогенный (разнородный), индивидуальный, групповой (классный). Решение вопроса о применении того или другого метода подбора зависит от конкретных условий племенной работы, целей и задач селекции.

Гомогенный подбор. Это подбор однотипных по основным конституциональным особенностям и показателям продуктивности маток и баранов. Однородность в подборе не означает полного тождества по всем признакам и свойствам между матками и баранами, поскольку практически почти невозможно найти двух животных-аналогов по всем признакам. Поэтому при составлении плана подбора родительских пар обычно учитывают один—два признака, например длину и тонину шерсти. При этом по другим признакам большого сходства может и не быть.

Подбор можно считать однородным, если спариваемые животные по данному признаку отклоняются от среднепопуляционного не более чем на Уг стандартного отклонения (с).

В гомогенном подборе известны два правила: 1) «подобное с подобным дает подобное» и 2) «лучшее с лучшим дает лучшее». Вместе с тем гомогенным подбором уверенно, хотя и медленно добиваются сдвигов средней величины признака в направлении проводимого отбора. Наряду с этим в популяции повышается гомозиготность и частота (концентрация) желательных аллелей, что обеспечивает наследственную консолидацию признаков отбора. Поэтому однородный подбор и особенно крайнюю его форму — инбридинг — нередко используют для получения племенных животных с устойчивой наследственностью.

Недостаток гомогенного подбора состоит в том, что при длительном его применении в ряде поколений (4—5 и более) может наступить снижение генетической изменчивости, замедление роста среднепопуляционного уровня и даже общая депрессия

животных. Для снятия этих явлений прибегают к гетерогенному подбору и освежению крови.

Гетерогенный подбор применяется весьма широко как в племенных, так и особенно в товарных стадах. Этим, подбором, как отмечает НА. Кравченко (1954), можно решать целый ряд задач:

- 1) выведения стада из состояния застоя (депрессии) путем повышения изменчивости и других показателей;
- 2) исправления неудовлетворительных признаков и свойств;
- 3) соединения ценных качеств;
- 4) создания промежуточных форм (типов).

Основная формула гетерогенного подбора — «худшее с лучшим улучшается».

Гетерогенным подбором, как правило, предусматривается устранение недостатков, присущих животным данного стада или целой породы. В отличие от маток производитель должен быть не только свободен от каких-либо недостатков, но и обладать ярко выраженными положительными качествами по тем признакам и свойствам, которые предстоит улучшить в данном стаде. В отдельных случаях при гетерогенном подборе может иметь место получение потомства с новыми свойствами.

Гетерогенный подбор достаточно широко используют в товарных стадах, где маток, например, с признаками нежной конституции и короткой шерстью случают с длинношерстными баранами крепкой или уклоняющейся в сторону грубой конституции.

Крайнюю степень гетерогенного подбора представляет собой скрещивание с использованием баранов другой породы, имеющих хорошее развитие того признака, который у улучшаемых овец развит недостаточно или отсутствует. Наряду с этим при скрещивании имеет место получение потомства со свойствами, отсутствующими у родительских форм. Надо иметь в виду так же то, что племенная ценность потомства, полученного от разнородного подбора, обычно невысокая. Племенную ценность баранов, которые на основании проверки по качеству потомства признаны лучшими, уточняют и контролируют оценкой ежегодно получаемого от них потомства.

Индивидуальный подбор. В хозяйствах и на фермах племенного назначения в лучшей селекционной части маточного стада, выделенной для углубленной селекционной работы и получения высококлассных племенных животных, особенно баранов, применяют индивидуальный подбор. При индивидуальном подборе важно хорошо знать продуктивность, экстерьерно-конституциональные особенности и происхождение каждой матки и барана, результаты их подбора в предшествующих спариваниях. Учет и использование при подборе этих и других характеристик, индивидуальных особенностей животных повышают вероятность получения приплода желательного качества.

Для получения высококлассного и ценного в племенном отношении потомства к высокопродуктивным маткам, отвечающим желательному типу, подбирают баранов, по возможности более сходных с матками по типу, имеющих максимальную выраженность основных селекционируемых признаков («лучшее с лучшим»). Индивидуальный подбор должен быть широко применен и при разведении по линиям.

Подбор по принципу «лучшее с лучшим» — основной в работе по типизации стада. К маткам, уклоняющимся от желательного типа, но имеющим одно или несколько ценных качеств, подбирают баранов с максимальной выраженностью тех признаков, которые недостаточно развиты у маток. Такой подбор (корректирующий) обеспечивает получение потомства, удачно сочетающего ценные качества родителей.

Для повторения удачных спариваний можно использовать и сыновей барана, от которого был получен предыдущий приплод, если они имеют хорошо выраженный желательный тип (сходный с типом отца) и проверены по качеству потомства.

Групповой подбор проводят с учетом суммарной характеристики того или иного класса маток. К маткам определенного класса подбирают таких производителей, от спаривания с которыми возможно получение желательного потомства. Индивидуальные

особенности маток при групповом (классном) подборе не учитываются. Например, к маткам II класса, отличающихся короткой шерстью, назначают длинношерстных элитных баранов для улучшения у приплода длины шерсти и одновременно повышения других селекционируемых признаков. Обычно на отару маток определенного класса назначают одного основного и одного резервного барана. Последнего используют в период массового прихода маток в охоту, когда основной производитель не в состоянии их всех осеменить или во время его болезни.

Классный подбор применяют на товарных фермах, а также в племенных хозяйствах на поголовье, где не практикуют индивидуальный подбор.

Основными принципами подбора являются следующие: целенаправленность - превосходство производителя над матками, с которыми его спаривают; максимальное использование лучших производителей; закрепление в потомстве достоинств родителей при помощи гомогенного подбора; получение потомства с желательными признаками и свойствами путем гетерогенного подбора; определение сочетаемости признаков и свойств; регулирование степени родства для избежания инбредной депрессии или сохранения типа родоначальника; предотвращение родства между спариваемыми животными, когда в ней нет необходимости; разведение по линиям и семействам.

При однородном подборе стараются решить следующие основные задачи:

- 1) Удержать в потомстве спариваемых животных те достоинства, которыми обладали оба родителя;
- 2) Создать более устойчивую наследственность желательного типа или желательных качеств;
- 3) Добиться в потомстве еще большего развития (выраженности) ценных качеств, по которому ведется подбор;
- 4) Увеличить количество животных ценными признаками и свойствами.

При разнородном подборе стараются решить следующие основные задачи:

- 1) Исправить недостатки животных, т. е. получить потомство, отвечающих требованиям животных желательного типа;
- 2) Спариванием разнородных животных обогащать у потомства наследственность;
- 3) Увеличить генетическое разнообразие животных.

Если отбором мы решаем судьбу особи, определяем, какое животное оставлять для воспроизводства, то подбор решает судьбу его использования и определяет качество будущего потомства.

Общее требование при применении однородного подбора соответствие животных к требованиям желательного типа, т. е. к элите и I классу. При однородном подборе определяется тип спаривания. К родственному спариванию допускаются те животные, которые по уровню продуктивности отвечают разработанным для каждого конкретного стада минимальным требованиям с учетом уровня селекционно-племенной работы.

Поскольку при однородном подборе произойдет закрепление наследственности у потомства, то при индивидуальном подборе следует учесть не только уровень продуктивности и выраженности основных селекционируемых признаков, но и характер их взаимосвязи, так как при родственном спаривании из-за отрицательной корреляции с усилением одного признака может произойти ослабление другого признака, которые при однородном подборе, усиливая устойчивость наследственности этих признаков, отрицательно влияют на племенные достоинства потомства, а в целом на совершенствование стада. Например, нам известно, что у тонкорунных овец величина животных и длина шерсти отрицательно коррелируются густотой руна. Поэтому при индивидуальном подборе по величине животных и длине шерсти при родственном спаривании подбираемые пары должны отличаться очень густой шерстью (ММ), при этом баран должен быть улучшателем данного признака по результатам проверки его по качеству потомства. В противном случае может произойти у потомства снижение густоты руна, что приведет к снижению настрига. При этом следует помнить, что хорошая

плотность руна является тем свойством, которое обеспечивает наряду с другими признаками сохранность руна от нежелательных воздействий внешних факторов и чистоту шерсти от различных видов засорителей. В таком случае прибегают к неродственным спариваниям при разнородном подборе по тем признакам, которые недостаточно развиты.

Гетерогенный подбор расшатывает наследственную устойчивость, консерватизм наследственности. Животные, получаемые от разнородного подбора с расшатанной наследственностью, более пластичны, более податливы к воздействию внешних условий. Они обладают повышенной изменчивостью.

Одной из главных задач разнородного подбора является получение потомства, лишенного недостатков, свойственных их матерям. Для этого маток, имеющих недостатки экстерьерно-конституционного или же другого порядка, спаривают с производителями, лишенными этих недостатков, являющимся улучшателем по этим признакам. В основном разнородный подбор применяется при групповом назначении баранов к маткам, в частности, на матках низших классов.

Наибольший эффект достигается в том случае, если матки, особенно низших классов, с недостатком лишь одного признака сформированы в одну отдельную отару. При таком подходе к формированию маточных отар наряду с учетом результатов комплексной оценки (класса животных) учитывается выраженность того признака, который слабо развит в данной группе овец, облегчается подбор и повышается его результативность.